

Comme potions calmantes, on peut donner :

1 ^o Bromure de potassium.....	1 gr.
Musc.....	0 ^{gr} ,20
Hydrolat de tilleul.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 50 gr.
— de fleurs d'oranger.....	
Sirop simple.....	20 —

Une cuillerée à café tous les quarts d'heure (J. Simon).

2 ^o Bromure de potassium.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 1 gr.
— de sodium.....	
— d'ammonium.....	
— de strontium.....	
Sirop de fleurs d'oranger.....	30 —
Eau de tilleul.....	100 —

Une cuillerée à café d'heure en heure.

Monteuvis conseille les bottes mouillées : mouchoirs ou compresses trempés dans l'eau froide aiguisée d'eau de Cologne ou de vinaigre, entourant les jambes avec maillot de laine par-dessus (renouveler toutes les heures ou toutes les demi-heures). Si l'on soupçonne la syphilis, faire des frictions quotidiennes avec la pommade :

1 ^o Axonge benzoïnée.....	20 gr.
Onguent napolitain.....	10 —
Iodure de potassium.....	4 —
Extrait de belladone.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 0 ^{gr} ,50
— de jusquiame.....	

2^o Donner en même temps une cuillerée à café par heure de la potion :

Iodure de potassium.....	1 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	30 —
Eau de tilleul.....	70 —

Si l'on soupçonne les vers intestinaux, donner la san-tonine, etc.

Si le paludisme est à craindre, injections sous-cutanées de quinine :

Bichlorhydrate de quinine.....	1 gr.
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

On peut encore donner la quinine en lavement ou en suppositoire :

Bromhydrate de quinine.....	0 ^{gr} ,20
Beurre de cacao.....	2 gr.

L'hygiène thérapeutique consiste dans une bonne alimentation, la vie au grand air, les bains tièdes ; pas de boissons alcooliques ; si l'enfant est au sein, penser à l'alcoolisme de la nourrice.

Coqueluche.

Dans la coqueluche, à la période des quintes, chez des enfants résistants, non déprimés, on peut donner un vomitif : ipéca (10 centigr. par année d'âge), émétique (1/2 centigr.), sulfate de cuivre (25 centigr. dans 100 gr. d'eau). Le vomitif peut être répété une ou deux fois par semaine.

Netter (de Nancy) s'est bien trouvé de l'oxymel scillitique pur, de bonne qualité, donné entre cinq et six heures du soir, par cuillerées à café (quatre ou cinq entre deux et trois ans, six au-dessus de cet âge).

Albrecht a conseillé la pilocarpine :

Chlorhydrate de pilocarpine.....	0 ^{gr} ,25
Cognac.....	5 gr.
Sirop d'écorces d'oranges.....	25 —
Eau.....	70 —

Une cuillerée à café après chaque quinte.

La belladone est un des meilleurs médicaments à opposer à la coqueluche (Trousseau) ; on peut formuler :

Extrait de belladone.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 5 milligr.
Poudre de belladone.....	
Excipient avec glycérine.....	Q. S.

Pour une pilule (trois à six par jour mêlées à du sirop, confiture, etc.)

On prescrit plus volontiers la teinture de belladone

(Il gouttes par année d'âge pour commencer, puis on augmente tous les jours jusqu'à effet).

J. Goodhart a pu donner X gouttes trois fois par jour à cinq mois sans mydriase. Holloperter conseille autant de gouttes que l'enfant a de mois, en augmentant jusqu'à effet.

On peut associer la teinture de belladone à d'autres teintures ou alcoolatures :

1° Teinture de belladone.....	} aa	5 gr.
Alcoolature de racines d'aconit.....		

Prendre V à X gouttes trois fois par jour en augmentant ensuite.

2° Teinture de belladone.....	} aa	2 gr.
— de drosera.....		
— grindelia robusta.....		
— lobelia inflata.....		

Prendre X, XX, XXX gouttes trois fois par jour.

3° Teinture de belladone.....	5 gr.
— de digitale.....	2 —

Prendre X à XX gouttes trois fois par jour.

Le sirop de belladone (75 centigr. de teinture par 10 gr.) s'emploie par cuillerées à café. C. de Gassicourt conseille :

Sirop de belladone.....	50 gr.
— de Tolu.....	150 —

Deux demi-cuillerées à café par jour, puis augmenter progressivement de une demi-cuillerée à café jusqu'à sédation.

H. Roger prescrivait l'association suivante :

Sirop de belladone.....	} aa	25 —
— de valériane.....		
— de digitale.....		

Une à six cuillerées à café par jour.

L'atropine peut remplacer la belladone :

Sulfate d'atropine.....	0sr,01
Eau distillée.....	10 gr.

Donner II gouttes quatre fois par jour, et augmenter tous les jours d'une goutte par prise jusqu'à dilatation de la pupille.

Le bromure de potassium a été souvent prescrit seul ou associé :

1° Bromure de potassium.....	10 gr.
Sirop d'écorces d'oranges.....	200 —

Une cuillerée à café de deux en deux heures.

2° Bromure de potassium.....	3 gr.
Musc.....	0sr,20
Eau de laurier-cerise.....	6 gr.
Sirop d'éther.....	15 —
— de fleurs d'oranger.....	45 —

Prendre cinq à six cuillerées à café par jour (G. de Mussy).

Le chloral est également un bon sédatif :

Hydrate de chloral.....	5 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	50 —
Eau distillée.....	100 —

Deux à cinq cuillerées à café.

Je me suis bien trouvé de la poudre de Dower (0sr,05 par année d'âge) :

Poudre de Dower.....	0sr,05
Sucre blanc.....	0sr,50

Pour un paquet, n° 5 ; à prendre toutes les deux heures dans une cuillerée d'eau ou de lait (enfant de cinq ans).

Un autre calmant très efficace est l'antipyrine, donnée à doses fortes non fractionnées, deux, trois, quatre fois par jour :

Antipyrine.....	0sr,25
-----------------	--------

Pour un paquet, à prendre dans une cuillerée d'eau sucrée ; répéter cette dose plusieurs fois dans la journée (ne pas dépasser 50 centigrammes d'antipyrine par année d'âge).

Demme a donné l'antispasmine (combinaison de narcéine sodique et de salicylate de soude) :

Antispasmine.....	1 gr.
Eau de laurier-cerise.....	10 —

Prendre X à XV gouttes dans un peu d'eau sucrée.

Laborde a prescrit la narcéine en potion :

Narcéine.....	08 ^r .12
Acide acétique.....	Q. S.
Infusion de café.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 125 gr.
Sirop simple.....	

Prendre trois cuillerées à café par jour.

Le chlorhydrate d'héroïne (5 à 6 milligr. par jour) est un bon calmant des accès.

H. Roger a prescrit le chloroforme en potion :

Chloroforme.....	VI gouttes.
Julep gommeux.....	60 gr.

Augmenter de II gouttes par jour jusqu'à XXX et XL.

Le bromoforme a été très recommandé depuis quelques années :

Bromoforme.....	L gouttes.
Looch huileux.....	120 gr.

Agiter avant de s'en servir; donner une cuillerée à café par année d'âge; augmenter d'une cuillerée à café par jour jusqu'à effet.

Le tannate de quinine (Binz) et les autres sels de quinine ne semblent pas avoir grand effet.

Le café convient aux coqueluches compliquées de vomissements (deux ou trois cuillerées à café d'infusion de café noir après chaque quinte). On peut remplacer le café par la caféine :

1 ^o Valérianate de caféine.....	15 ^r .50
Eau-de-vie.....	20 gr.
Sirop de café.....	250 —

Deux à quatre cuillerées à café par jour.

2 ^o Caféine.....	2 gr.
Benzoate de soude.....	3 —
Extrait ou jus de réglisse.....	10 —
Sirop de Tolu.....	20 —
Eau.....	70 —

Une cuillerée à dessert après chaque quinte.

West a employée l'acide chlorhydrique contre les vomissements:

Acide chlorhydrique fumant.....	} $\bar{a}\bar{a}$ V gouttes
Teinture d'opium.....	
Sirop de limon.....	20 gr.
Eau distillée.....	40 —

Une cuillerée à café, après la quinte, trois ou quatre fois par jour.

Les pulvérisations à vapeur d'eau phéniquée, salicylée, boriquée, bromurée, naphtholée, sont recommandables, plutôt pour nettoyer les premières voies que pour calmer les quintes. Le séjour dans les salles d'épuration des usines à gaz, les vapeurs de térébenthine, de naphthaline, de soufre, d'eau oxygénée, ozone, ont été essayés avec des succès divers.

L'air comprimé est recommandé par Schliep.

Les badigeonnages de la gorge avec la cocaïne (1 p.50, 1 p.20), avec la résorcine (1 p.50), l'asaprol (1 p.100), etc., ont été préconisés de divers côtés.

Les insufflations nasales, vantées par Michaël, puis par Moizard, se font avec :

1 ^o Benjoin pulvérisé.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 5 gr.
Salicylate de bismuth.....	
Sulfate de quinine.....	1 —
2 ^o Acide borique.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 5 gr.
Poudre de café torréfié.....	

Les bains tièdes répétés conviennent aux coqueluches des enfants en bas âge; la vaccination, vantée en Italie par plusieurs médecins, ne m'a rien donné. Le changement d'air vaut mieux dans les cas graves et compliqués.

Les suites de coqueluche seront traitées par l'air de la campagne, de la mer, une cure au Mont-Dore, à la Bourboule, à Luchon, etc.

Hygiène thérapeutique. — Chambre vaste (50 m. c.), très aérée, bien exposée (sud, sud-est, sud-ouest), chambre de jour et chambre de nuit si possible,

atmosphère chaude (18° à 20°) et humide (vaporisations). L'enfant ne doit pas sortir pendant la période aiguë. Isolement absolu des coquelucheux. Vêtements chauds et légers, ne serrant pas le cou ni le thorax. Alimentation liquide (lait ou purées de viandes et légumes, œufs, œufs au lait).

Corps étrangers des fosses nasales.

Irrigation forte dans le côté sain pendant que la narine du côté malade est bouchée, puis débouchage brusque de cette narine. Bougie fine introduite d'avant en arrière, avec tampon d'ouate attachée à son extrémité, puis écouvillonnage d'arrière en avant. Provoquer des étternuements avec :

Poudre de feuilles d'asarum.....	} aa
— — de bétouine.....	
— — de marjolaine.....	
— de fleurs de muguet.....	

Le procédé de choix consiste à éclairer les fosses nasales avec le spéculum et le miroir, et à déplacer le corps étranger avec un stylet courbe ou une pince. Après l'extraction, gaze salolée.

Corps étrangers de l'œil.

Le corps étranger de la conjonctive sera facilement enlevé avec un objet mince et propre. On extraira le corps étranger de la cornée avec la pointe d'une aiguille flambée, avec un aimant ; lavages antiseptiques. S'il y a phlegmon de l'œil, énucléation.

Corps étrangers de l'œsophage.

Ingestion de farineux épais, cure de pommes de terre. Cathétérisme avec le panier de de Graefe. OEsophago-

tomie externe, après s'être assuré par la radiographie de la présence du corps étranger et de son siège.

Corps étrangers de l'oreille.

Ne pas insister sur l'extraction directe avec pinces ou stylets ; irrigations d'eau tiède, d'eau savonneuse, d'huile stérilisée. Tremper le bout d'une baguette dans le baume du Pérou, l'alun fondu, le collodion, la colle forte, et essayer l'extraction par adhérence. En cas d'impossibilité, décoller le pavillon de l'oreille en arrière et cueillir le corps étranger.

Corps étrangers des voies aériennes.

Tête en bas. En cas d'insuccès, trachéotomie avec écarteur, pince recourbée pour saisir le corps, s'il ne sort pas de lui-même.

Coryza aigu.

A l'intérieur, sulfate d'atropine (1 milligr.), reniflement de jus de citron, inhalations de teinture d'iode, de camphre dans eau bouillante, d'ammoniaque, d'eau de Cologne, inspiration de quelques gouttes sur un mouchoir du mélange :

Acide phénique.....	} aa	1 gr.
Ammoniaque.....		
Eau.....	} aa	15 —
Alcool à 90°.....		

Fumigations de fleurs de tilleul ou sureau, pulvérisations de cocaïne à 1 p. 100. A l'intérieur, essayer X gouttes le soir de : extrait fluide de *gelsemium sempervirens*, d'alcoolature d'*anémone pulsatile*, 5 à 10 centigrammes d'hydrate de terpine, etc.

Poudre à priser (3 à 6 pincées par jour après s'être mouché) :

1 ^o Sous-nitrate de bismuth.....	ãã	6 gr.
Benjoin pulvérisé.....		4 —
Acide borique.....		0 ^{sr} ,20
Menthol.....		
2 ^o Acide borique.....	ãã	1 gr.
Camphre pulvérisé.....		0 ^{sr} ,50
Poudre de belladone.....		
3 ^o Poudre d'amidon.....		5 gr.
Acide borique.....		1 —
Salicylate de bismuth.....		0 ^{sr} ,50
Sulfate de quinine.....	ãã	0 ^{sr} ,50
4 ^o Naphtol p.....		3 gr.
Acide borique.....		4 —
Camphre.....		1 —
Essence de roses.....		0 ^{sr} ,10
— de patchouly.....	ãã	0 ^{sr} ,10

On peut introduire, dans les narines, une pommade :

1 ^o Vaseline.....		10 gr.
Chlorhydrate de cocaine.....		0 ^{sr} ,50
2 ^o Vaseline.....	ãã	10 gr.
Sous-nitrate de bismuth.....		
3 ^o Vaseline.....		10 —
Acide borique.....		1 —

Coryza des nouveau-nés.

Injections d'huile stérilisée dans les narines, ou des liquides suivants :

1 ^o Huile d'olives stérilisée.....		25 gr.
Résorcine.....		1 —
2 ^o Glycérine.....		15 gr.
Chlorhydrate de cocaine.....		1 —
3 ^o Nitrate d'argent.....		0 ^{sr} ,20
Eau distillée.....		20 gr.
4 ^o Sulfate de zinc.....		0 ^{sr} ,10
Eau.....		15 gr.

Lermoyez conseille la douche sèche, avec une poire à air de Politzer, puis une instillation de quelques gouttes d'huile mentholée à 1 p.40 toutes les deux heures. Si la sécrétion est très abondante, lavage du nez à l'eau boriquée et insufflation de :

1 ^o Acide borique.....	ãã	10 gr.
Sucre de lait.....		5 —
Résorcine.....		
2 ^o Acide borique.....		12 gr.
Benjoin.....	ãã	3 —
Sous-nitrate de bismuth.....		
Iodol.....		1 —

3^o En cas de rhinite blennorrhagique :

Nitrate d'argent fondu pulvérisé.....		0 ^{sr} ,20
Talc.....		10 gr.

On peut encore badigeonner avec une solution argentine à 1 p. 100.

En cas de syphilis, introduire dans le nez la pommade suivante :

Calomel.....		1 gr.
Vaseline.....		10 —

Faire en même temps des frictions mercurielles.

Coryza chronique.

Le précédent traitement est applicable au coryza chronique syphilitique. Si la syphilis est ancienne, on donnera en même temps l'iodeure de potassium ou le sirop iodo-tannique. Si la scrofule est en cause, donner l'huile de foie de morue, les bains de mer, les eaux chlorurées ou sulfureuses.

Localement, injections de sublimé à 1 p. 5 000, de permanganate de potasse à 1 p. 1000.

Moure fait une irrigation avec 50 grammes par litre de sel marin, bicarbonate de soude ou chlorate de po-

tasse, puis il complète par une irrigation de 500 grammes d'eau tiède contenant une cuillerée à soupe de :

Acide phénique.....	20 gr.
Alcool à 90°.....	50 —
Glycérine.....	100 —
Eau.....	350 —

Au bout de huit à dix jours, il remplace l'irrigation avec une cuillerée à café par litre de :

Créoline.....	1 gr.
Alcool.....	120 —

On peut encore employer l'eau chloralée à 1 p. 100, l'eau naphtolée saturée et l'eau salicylée à 2 p. 1000. Les badigeonnages suivants sont conseillés :

1° Naphtol.....	10 gr.
Camphre.....	20 —
Glycérine.....	30 —
2° Menthol.....	2 gr.
Huile d'olive.....	50 —
3° Menthol.....	} <i>aa</i> 2 gr.
Camphre.....	
Huile.....	

Trousseau faisait des injections avec les liquides suivants et insufflait ensuite les poudres indiquées plus bas :

1° Chlorate de potasse.....	4 gr.
Eau.....	200 —
2° Nitrate d'argent.....	0 ^{sr} .05
Eau distillée.....	100 gr.
3° Sulfate de cuivre ou zinc.....	0 ^{sr} .05
Eau.....	100 gr.
4° Sous-nitrate de bismuth.....	} <i>aa</i> 15 gr.
Talc de Venise.....	
5° Chlorate de potasse.....	2 gr.
Sucre porphyrisé.....	16 —
6° Précipité blanc ou rouge.....	0 ^{sr} .25
Sucre en poudre.....	15 gr.

On a proposé de rétrécir la cavité nasale à l'aide de bourdonnets d'ouate imbibés de glycérine diluée à 1 p. 3, etc.

Ajouter à ces traitements topiques les cures à Uriage, Mont-Dore, Causerets, Luchon, Allevard, etc.

Couperose (Voy. ACNÉ).

Coup de chaleur.

Contre l'hyperthermie et le collapsus donner des bains à 28°, 25°, le drap mouillé, les injections de sérum artificiel, les lavements froids, les inhalations d'oxygène, les injections sous-cutanées de strychnine.

Coxa vara.

Repos absolu, bains salés, bains de mer, glycéro-phosphates; parfois la résection ou l'ostéotomie ont semblé nécessaires.

Coxalgie hystérique.

Electrisation par les courants faradiques, suggestion à l'état de veille, aimants.

Craniotabes.

Traitement général comme dans le rachitisme (phosphate de chaux, bains salés), cure marine, donner une cuillerée à café le matin de :

Phosphore.....	0 ^{sr} .01
Huile d'amandes douces.....	100 gr.

Localement, rien à faire, ou protéger les surfaces par un bonnet rembourré.

Crevasse des mains.

Outre le port des gants, on fera des onctions matin et soir avec :

1° Menthol.....	1 gr.
Salol.....	2 —
Huile d'olive.....	10 —
Lanoline.....	30 —
2° Potasse caustique.....	0 ^{sr} ,50
Glycérine.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 20 gr.
Alcool.....	
Eau distillée.....	60 —
3° Beurre de cacao.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 5 gr.
Huile d'amandes douces.....	
Oxyde de zinc.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 0 ^{sr} ,10
Borax.....	
Essence de bergamote.....	V gouttes.

Croissance.

Repos, sommeil prolongé, vie à la campagne, alimentation de convalescents (lait et laitages, œufs, poissons, purées de viandes et légumes), bains salés ou sulfureux, drap mouillé, frictions sèches. Pas de surmenage cérébral. En cas de palpitations, une cuillerée matin et soir de :

Iodure de potassium.....	5 gr.
Bromure de potassium.....	10 —
Eau distillée.....	Q. S.
Sirop d'écorce d'oranges.....	300 gr.

S'il y a anémie, donner le protoxalate de fer (10 à 20 centigr. par jour), les eaux de Spa, Orezza, etc. Bains de mer, eaux chlorurées sodiques.

Croup.

Le sérum de Roux est le vrai traitement général du croup; il doit être employé en injections sous-cutanées

à la dose de 20 ou 30 centimètres cubes qu'on pourra répéter au bout de vingt-quatre heures. A défaut de sérum, on peut donner les balsamiques :

1° Extrait oléo-résineux de cubèbe.....	10 gr.
Sucre.....	90 —

Deux grammes par jour dans du lait.

2° Extrait alcoolique liquide de cubèbe.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 300 gr.
Sirop simple.....	

Trois cuillerées à soupe par jour.

3° Cubèbe.....	30 gr.
Copahu.....	60 —
Sous-carbonate de fer.....	4 —
Sous-nitrate de bismuth.....	Q. S. p. solidifier.

A prendre par bols.

4° Extrait de cubèbe.....	2 gr.
Carbonate d'ammoniaque.....	0 ^{sr} ,60
Sirop de polygala.....	30 gr.
Looch blanc.....	60 —

Par cuillerées à café d'heure en heure (d'Espine et Picot).

5° Pilocarpine.....	0 ^{sr} ,02
Chlorhydrate de potasse.....	3 gr.
Carbonate d'ammoniaque.....	—
Cognac.....	20 —
Sirop de polygala.....	30 —
Eau.....	130 —

Une cuillerée toutes les heures jusqu'à sudation (Gilbert).

6° Créosote.....	10 gr.
Rhum.....	100 —
Glycérine.....	500 —

Deux à quatre cuillerées par jour (Legroux).

Ne pas oublier les vaporisations ou pulvérisations à vapeur (chambre de vapeur) qui sont très efficaces pour rompre le spasme et faciliter le décollement des fausses membranes.

Pour calmer le spasme glottique, on a conseillé encore le bromure de potassium, le sirop de codéine, et les enveloppements froids du thorax.

Le Dr Delthil a préconisé jadis les vapeurs goudronnées et térébenthinées; on fait brûler dans la chambre le mélange suivant :

Goudron de houille.....	} ã 40 gr.
Essence de térébenthine	

Quand on n'a pu prévenir l'asphyxie, il faut trachéotomiser ou tuber l'enfant.

Dans les hôpitaux, le tubage a presque partout remplacé la trachéotomie.

Cyanose.

Repos, pas de fatigues, d'émotions, de froid.

Frictions sèches ou stimulantes, massages et mouvements passifs; vêtements chauds, inhalations d'oxygène. En cas d'asystolie ou de menaces d'asystolie, donner X gouttes du mélange suivant pendant plusieurs jours :

Teinture de digitale.....	} ã 5 gr.
— de scille.....	

Dans l'intervalle des crises, iodure de potassium (25 à 50 centigr. par jour).

Ventouses sèches, bains d'air comprimé, huile de foie de morue.

Cystite.

Repos au lit, cataplasmes laudanisés sur le ventre, boissons aqueuses, tisanes émoullientes et diurétiques (chiendent, orge, graines de lin, queues de cerises).

Prendre par cuillerées de deux en deux heures.

Benzoate de soude.....	4 gr.
Extrait ou jus de réglisse.....	10 —
Eau distillée.....	100 —

On a conseillé le salol à l'intérieur (15 à 20 centigr.

trois à quatre fois par jour). S'il y a du pus, lavages de la vessie à l'eau bouillie boricuée, au lysol (1 p. 400), au permanganate (1 p. 1000). Bains tièdes prolongés. Dans la cystite tuberculeuse, Rochet a fait la cystotomie rétro-pubienne avec curettage.

D

Dacryocystite.

Essayer les instillations astringentes (sulfate de zinc, nitrate d'argent à 1 p. 100), puis le cathétérisme du canal lacrymal avec ou sans débridement, lavages avec la seringue d'Anel.

Chez les enfants grandets, débrider largement, cathétériser, laver, curetter, cautériser et même extirper la cavité. Huile de morue, iode à l'intérieur; si la syphilis est en cause, frictions mercurielles.

Danse de Saint-Guy (Voy. CHORÉE).

Dentition.

La scarification des gencives est inutile. Contre le prurit des gencives, on peut donner un hochet en bois ou racine de guimauve, ou faire des frictions avec un sirop de dentition :

1° Safran.....	3 gr.
Tamarin.....	30 —
Eau.....	100 —
Miel.....	200 —
(Sirop Delabarre).	
2° Teinture de vanille.....	} ã 5 gr.
— de coca.....	
— de myrrhe.....	
— de safran.....	} ã 20 —
Miel de mercuriale.....	
Miel rosat.....	60 —
(Yvon).	