

Le Dr Delthil a préconisé jadis les vapeurs goudronnées et térébenthinées; on fait brûler dans la chambre le mélange suivant :

Goudron de houille.....	} ã 40 gr.
Essence de térébenthine	

Quand on n'a pu prévenir l'asphyxie, il faut trachéotomiser ou tuber l'enfant.

Dans les hôpitaux, le tubage a presque partout remplacé la trachéotomie.

Cyanose.

Repos, pas de fatigues, d'émotions, de froid.

Frictions sèches ou stimulantes, massages et mouvements passifs; vêtements chauds, inhalations d'oxygène. En cas d'asystolie ou de menaces d'asystolie, donner X gouttes du mélange suivant pendant plusieurs jours :

Teinture de digitale.....	} ã 5 gr.
— de scille.....	

Dans l'intervalle des crises, iodure de potassium (25 à 50 centigr. par jour).

Ventouses sèches, bains d'air comprimé, huile de foie de morue.

Cystite.

Repos au lit, cataplasmes laudanisés sur le ventre, boissons aqueuses, tisanes émoullientes et diurétiques (chiendent, orge, graines de lin, queues de cerises).

Prendre par cuillerées de deux en deux heures.

Benzoate de soude.....	4 gr.
Extrait ou jus de réglisse.....	10 —
Eau distillée.....	100 —

On a conseillé le salol à l'intérieur (15 à 20 centigr.

trois à quatre fois par jour). S'il y a du pus, lavages de la vessie à l'eau bouillie boricuée, au lysol (1 p. 400), au permanganate (1 p. 1000). Bains tièdes prolongés. Dans la cystite tuberculeuse, Rochet a fait la cystotomie rétro-pubienne avec curettage.

D

Dacryocystite.

Essayer les instillations astringentes (sulfate de zinc, nitrate d'argent à 1 p. 100), puis le cathétérisme du canal lacrymal avec ou sans débridement, lavages avec la seringue d'Anel.

Chez les enfants grandets, débrider largement, cathétériser, laver, curetter, cautériser et même extirper la cavité. Huile de morue, iode à l'intérieur; si la syphilis est en cause, frictions mercurielles.

Danse de Saint-Guy (Voy. CHORÉE).

Dentition.

La scarification des gencives est inutile. Contre le prurit des gencives, on peut donner un hochet en bois ou racine de guimauve, ou faire des frictions avec un sirop de dentition :

1° Safran.....	3 gr.
Tamarin.....	30 —
Eau.....	100 —
Miel.....	200 —
(Sirop Delabarre).	
2° Teinture de vanille.....	} ã 5 gr.
— de coca.....	
— de myrrhe.....	
— de safran.....	} ã 20 —
Miel de mercuriale.....	
Miel rosat.....	60 —
(Yvon).	

3° Chlorhydrate de cocaïne.....	0 ^{gr} ,10
Borax.....	1 gr.
Sirop diacode.....	5 —
— simple.....	20 —
4° Chlorhydrate de cocaïne.....	0 ^{gr} ,05
Eau de laurier-cerise.....	5 gr.
Sirop simple.....	20 —
5° Chloroforme.....	X gouttes.
Miel blanc.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 10 gr.
Glycérine.....	
6° Teinture de belladone.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ X gouttes.
Chloroforme.....	
Sirop de miel.....	
— de fleurs d'oranger.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 10 gr.

En cas d'agitation et d'insomnie, bains de tilleul, petites doses de bromure de potassium (10 à 20 centigr.).

Dermatite exfoliatrice des nouveau-nés.

Pansement sec avec talc et acide borique, bains de sublimé à 1 p. 10000.

Bon allaitement au sein.

Desquamation linguale.

Traitement peu efficace ; lavages de la bouche à l'eau de Vichy, à l'eau boriquée ou boratée à 4 p. 100, onctions deux fois par jour avec :

1° Chlorhydrate de cocaïne.....	0 ^{gr} ,05
Baume du Pérou.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 1 gr.
Acide borique.....	
Vaseline.....	
	40 —
	(Besnier).
2° Hyposulfite de soude.....	4 gr.
Glycérine.....	50 —

Diabète.

Agir sur la peau par les bains, les frictions.

Quand l'enfant est sevré, le soumettre au régime : pain de gluten ou de Soja, pommes de terre bouillies (trois ou quatre par jour), œufs, fromages, viandes, poissons, légumes verts, beurre et graisse, vin rouge coupé d'eau alcaline. Supprimer les féculents, pâtisseries, aliments sucrés, le lait, les fruits doux. Permettre les fruits huileux (amandes, noisettes, noix, pistaches, olives). Conseiller l'exercice, la promenade, la gymnastique.

Parmi les médicaments, essayer l'arsenic, le bicarbonate de soude, l'opium, le bromure :

1° Arséniate de soude.....	0 ^{gr} ,05
Eau distillée.....	150 gr.

Une cuillerée à café deux ou trois fois par jour pendant quinze jours ; attendre huit jours avant de recommencer.

2° Bicarbonate de soude..... 1 gr.
Pour un paquet ; en donner deux ou trois par jour dans un peu d'eau ou de vin.

3° Poudre d'opium.....	0 ^{gr} ,02
Magnésie calcinée.....	0 ^{gr} ,20

Pour un paquet ; trois à quatre par jour.

4° Bromure de potassium.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 10 gr.
Eau de fleurs d'oranger.....	
Glycérine.....	
Eau distillée.....	

Deux à quatre cuillerées à café par jour.

Begbie a guéri un enfant de treize ans par le bromure et l'huile de morue.

5° L'antipyrine a donné quelques succès :

Antipyrine.....	10 gr.
Eau de menthe.....	20 —
Glycérine.....	30 —
Eau distillée.....	100 —

En prendre deux à trois cuillerées à soupe par jour.

On sucre les boissons et les potions avec la glycérine ou avec la saccharine associée au bicarbonate de soude :

Saccharine.....	} aa	3 gr.	
Bicarbonate de soude.....			
Mannite.....			50 —
Mucilage.....			Q. S.

Pour 100 pastilles; chaque pastille représente un morceau de sucre de 10 gr.

L'opothérapie (ingestion de pancréas, injections sous-cutanées, lavements d'extrait de foie) n'a rien donné.

Les eaux minérales à recommander sont : Vichy, Vals, Pougues, la Bourboule et les chlorurées sodiques fortes.

Diarrhée.

Enfants au sein. — Pas de diarrhées graves, régler les tétées, surveiller le régime de la nourrice.

Enfants allaités artificiellement. — Remplacer le biberon à tube par le biberon sans tube, le lait ordinaire par le lait stérilisé; couper le lait avec de l'eau bouillie sucrée s'il n'est pas digéré pur; le remplacer au besoin par le lait d'ânesse, par le lait humanisé ou peptonisé, etc. Essayer l'eau de Vichy, l'eau de chaux (60 gr. par litre).

En cas de diarrhée grave, diète aqueuse pendant six, douze, vingt-quatre heures : eau pure, eau d'Évian, eau de Soultzmat. La décoction de céréales, la décoction blanche de Sydenham, l'eau de riz peuvent servir à réaliser la diète hydrique. Comme remède, Hayem a préconisé l'acide lactique :

Acide lactique.....	2 gr.
Sirop de framboises.....	30 —
Eau distillée.....	100 —

Par cuillerées à café dans les vingt-quatre heures.

On donne de la même façon les potions suivantes :

1° Acide chlorhydrique.....	os ^r ,25
Sirop de gomme.....	30 gr.
Eau distillée.....	100 —
2° Salicylate de bismuth.....	2 gr.
Sirop de grande consoude.....	30 —
Eau de chaux.....	60 —

Agiter avant de s'en servir.

3° Extrait de ratanhia.....	1 gr.
Elixir parégorique.....	X gouttes.
Sirop de coings.....	20 gr.
Décoction de riz.....	60 —
4° Extrait de bois de campêche.....	4 gr.
Teinture de cachou.....	8 —
Sirop simple.....	10 —
Eau de fenouil.....	35 —

Une cuillerée à café trois fois par jour (West).

5° Sous-nitrate de bismuth.....	2 gr.
Laudanum de Sydenham.....	I goutte.
Cognac.....	10 gr.
Sirop de coings.....	20 —
Eau bouillie.....	50 —

Agiter avant de s'en servir.

6° Laudanum de Sydenham.....	I goutte.
Sirop de cachou.....	25 gr.
Eau de chaux.....	20 —
— de menthe.....	40 —

(Archambault).

Le Dr Saint-Philippe a vanté l'antipyrine :

Antipyrine.....	os ^r ,50
Sirop de fleurs d'oranger.....	} aa 50 gr.
Eau de tilleul.....	

Cinq à six cuillerées à café par jour.

On peut encore donner le dermatol, le salol, le bétol, le benzonaphtol, le calomel à doses fractionnées, le tannigène, la tannalbine, etc.

1° Dermatol.....	os ^r ,25
Julep gommeux.....	60 gr.

Une cuillerée à café toutes les heures.

2 ^o Salol.....	0 ^{sr} ,50
Sucre en poudre.....	5 gr.

Faire dix paquets, un toutes les heures, dans une cuillerée à café de lait.

3 ^o Tannigène ou tannalbine.....	0 ^{sr} ,25
---	---------------------

Pour un paquet, en donner trois à quatre par jour dans une cuillerée de lait, d'eau sucrée, de miel, de sirop, etc.

On peut prescrire un lavement à garder ainsi composé :

Laudanum.....	I goutte.
Eau de chaux.....	10 gr.
Décoction de riz.....	40 —

S'il y a tendance au collapsus et à l'algidité, frictions stimulantes, bains chauds sinapisés, grog, thé au rhum, injections sous-cutanées de sérum artificiel (50, 100 gr. à la fois).

On isolera les enfants atteints de diarrhée infectieuse et on désinfectera leurs selles.

Quand la diarrhée présente les caractères du choléra infantile, il faut tout de suite instituer la diète hydrique et les injections de sérum. L'eau bouillie, la décoction blanche de Sydenham, l'eau albumineuse fraîche, le bouillon dégraissé, la potion de Rivière peuvent être donnés, mais il faut s'abstenir de lait. On peut faire le lavage de l'estomac avec une sonde de Nélaton en cas de vomissements.

Barthel et Rilliet ont employé avec succès le nitrate d'argent :

Nitrate d'argent.....	0 ^{sr} ,03
Eau distillée.....	60 gr.

Par cuillerées à café d'heure en heure.

Les lavements d'eau salée (1 gr. de chlorure de sodium pour 200 gr. d'eau bouillie) sont à essayer. Inhalations d'oxygène.

Bien d'autres médicaments ont encore été préconisés :

1 ^o Naphtaline très pure.....	0 ^{sr} ,20
Mucilage de gomme.....	} aa 40 gr.
Eau de camomille.....	

Agiter avant de s'en servir, une cuillerée à café toutes les deux heures (Bongers).

2 ^o Résorcine.....	0 ^{sr} ,20
Sirop de coings.....	20 gr.
Eau distillée.....	40 —

Par cuillerées à café d'heure en heure.

Le Dr Cayla (Bordeaux) donne le lait coupé d'eau de chaux, les lavements amidonnés, l'eau albumineuse, et alternativement d'heure en heure une cuillerée à café des deux potions suivantes :

1 ^o Teinture de noix vomique.....	III gouttes.
Sirop de ratanhia.....	} aa 15 gr.
— de coings.....	
Eau distillée.....	40 —
2 ^o Bromure de potassium.....	0 ^{sr} ,50
Sirop de belladone.....	} aa 15 gr.
— de menthe.....	
Eau distillée.....	40 —

Dans quelques cas, le lait fermenté (Kéfir ou Koumys), réussit à arrêter certaines diarrhées.

Dans les diarrhées chroniques, c'est un médicament à employer. On peut donner en même temps :

Racine de bistorte.....	10 gr.
Infuser dans eau bouillante.....	500 —
Sirop de coings.....	50 —

A prendre par demi-tasses dans la journée.

Les lavements de nitrate d'argent, de créosote, de perchlorure de fer, sont encore à essayer contre les diarrhées chroniques :

1 ^o Nitrate d'argent.....	0 ^{sr} ,05
Eau distillée.....	100 gr.

Pour un lavement.

2 ^o Perchlorure de fer.....	X gouttes.
Eau distillée.....	100 gr.

Pour un lavement.

3 ^o Créosote de hêtre.....	1 gr.
Jaune d'œuf.....	N ^o 1.
Huile d'olives.....	60 gr.

Pour un lavement à garder.

Je me suis bien trouvé, dans toutes les formes de diarrhée, de l'association suivante :

Salicylate neutre de bismuth.....	} aa 08 ^r ,20
Benzonaphtol.....	
Phosphate de chaux tribasique.....	

Pour un paquet, en prendre quatre ou cinq semblables par jour dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée.

La poudre de talc, conseillée par Debove, est recommandable dans les diarrhées chroniques (50 à 100 gr. délayés dans du lait).

La viande crue hachée ou pulpée a rendu service dans certaines diarrhées rebelles.

A ces remèdes, il faut ajouter une bonne hygiène générale, le grand air, le séjour à la campagne, une cure à Plombières.

Dilatation de l'estomac.

Réglementer les repas (trois à quatre par jour suivant l'âge), rationner les liquides (un verre d'eau ou de lait par repas), interdire tout aliment ou toute boisson dans l'intervalle des repas.

Recommander le pain grillé ou la biscotte, les potages épais, les œufs, œufs au lait, purées de légumes secs, poissons frais, viandes blanches, tendres ou hachées, fromages frais, fruits cuits. Interdire la charcuterie, les viandes faisandées, les choux, les crustacés, les aliments trop épicés, les sucreries, les crudités et acidités, les sauces trop grasses, le vin pur.

Promenades au grand air, exercices modérés, massage du ventre; frictions sèches ou alcooliques sur le corps, bains salés ou sulfureux, drap mouillé.

Combattre la constipation à l'aide des lavements de glycérine pure ou des glycéricônes, en même temps donner les médicaments laxatifs, eupeptiques et toniques.

Pendant une semaine prendre avant chacun des deux principaux repas, dans une cuillerée à café d'eau sucrée, un paquet contenant :

Bicarbonate de soude.....	} aa 08 ^r ,20
Magnésie calcinée.....	
Pepsine.....	
Poudre de noix vomique.....	

Pour un paquet, n^o 14 (enfant de trois à quatre ans). Suspendre pendant une semaine avant de recommencer.

Quand il y a du tympanisme, des gaz intestinaux, on donnera la poudre d'anis ou le carbonate de magnésie (15 à 20 centigr. par paquet).

S'il y avait de la diarrhée au lieu de la constipation qui est habituelle, on remplacerait la magnésie par le bismuth. Comme cure thermale, on conseillera Châtel-Guyon pour les constipés, Plombières pour les diarrhéiques. Mais bien souvent le séjour à la campagne ou au bord de la mer sera plus efficace.

Le lavage de l'estomac n'est que rarement indiqué; il sera réservé pour les cas graves.

Diphthérie.

Traitement local. — A la peau, à la vulve, aux lèvres, les badigeonnages de teinture d'iode m'ont semblé très efficaces. S'il s'agit d'une plaie étendue diphthérisée, l'iodoforme en poudre, le salol, l'aristol, le dermatol, le phénol sulfuriciné, le stérésol sont à conseiller.

Pour la diphthérie oculaire, irrigations avec la liqueur

de Labarraque (5 p. 100), ou l'eau naphtholée, sans négliger la sérothérapie.

Quand les fosses nasales sont envahies, pulvérisations et irrigations répétées avec eau phéniquée (1 p. 200), eau chloralée (1 p. 100), eau salicylée (1 à 2 p. 1000).

Pour la diphtérie pharyngée, on se borne, quand on a du sérum, à faire la toilette de la gorge, en irriguant une solution de liqueur de Labarraque (50 gr. par litre) trois ou quatre fois par jour.

Il convient de rappeler cependant les divers topiques qui ont été tour à tour mis en œuvre.

Collutoires phéniqués (Soulez, Gaucher) :

1° Acide phénique.....	} aa	9 gr.
Alcool à 90°.....		25 —
Camphre.....		35 —
2° Camphre.....		20 —
Huile de ricin.....		15 —
Alcool à 90°.....		10 —
Acide phénique.....		5 —
— tartrique.....		1 —

Après enlèvement des fausses membranes avec écouvillon d'ouate ou de molleton, on touche la surface dénudée toutes les trois ou quatre heures avec ce collutoire. Berlioz, Ruault touchent sans violence avec :

Acide phénique.....	20 gr.
Sulfo-ricinate de soude.....	80 —

Dans l'intervalle, irrigations phéniquées (1 p. 100), boriquées (3 p. 100), salicylées (1 à 2 p. 1000), etc.

On a encore employé le naphthol camphré, le naphthol sulfuriciné, le stérésol, le sublimé, le perchlorure de fer (Watelet), l'acide salicylique, le jus de citron, le pétrole, l'eau de chaux, etc. Mais à quoi bon rappeler tous ces topiques quand, avec 20 centimètres cubes de sérum de Roux injecté sous la peau du flanc, on obtient presque sûrement la guérison ?

Si, au bout de vingt-quatre heures, l'amélioration ne s'est pas déclarée, on réitère l'injection.

S'il y a du croup, on double la dose.

Si, malgré l'emploi du sérum, l'asphyxie se déclare, on fait la trachéotomie ou le tubage (Voir, dans la seconde partie du volume, les articles *Sérum*, *Trachéotomie*, *Tubage*).

Il est superflu d'insister sur l'hygiène générale qui convient au diphtérique, sur l'isolement, la désinfection des objets et des locaux, la quarantaine à imposer aux enfants atteints.

Sur ce dernier point, il est impossible de fixer un chiffre. On examinera la gorge, les mucosités du nez, on fera des cultures, et tant, qu'il y aura des bacilles virulents, l'enfant ne devra pas reprendre la vie commune.

Dysenterie.

Diète lactée, puis œufs, potages, viande crue, viandes blanches cuites. Bains tièdes émollients (son, tilleul), cataplasmes de farine de lin arrosés de laudanum sur le ventre.

Comme remèdes, ipéca à la mode brésilienne :

Ipéca concassé.....	2 gr.
Eau bouillante.....	120 —
Passez et ajoutez sirop de polygala.....	30 —

Par cuillerées de deux en deux heures (enfant de cinq à dix ans).

Après trois ou quatre jours de cette potion, on peut terminer par le calomel en une dose (20 à 30 centigr.), ou par fractions (5 centigr. de deux en deux heures).

Contre les douleurs et le ténesme, lavement avec II à V gouttes de laudanum suivant l'âge (cinq à dix ans), ou potion avec :

Sirop diacode.....	10 gr.
— de fleurs d'oranger.....	20 —
Eau distillée.....	60 —

On peut donner la poudre de Dower (5 centigr. par année d'âge en trois ou quatre doses). On peut encore associer le calomel à l'ipéca et à l'opium :

Poudre d'ipéca.....	} aa	0sr,10
Calomel.....		
Extrait thébaïque.....		

Faire cinq doses; une toutes les deux heures.

A conseiller encore les lavements astringents :

1° Cachou.....	8 gr.
Extrait de feuilles de noyer.....	2 —
— de bois de campêche.....	3 gr.
Eau.....	200 —

(J. Simon).

2° Mucilage de pépins de coings.....	250 gr.	
Sous-nitrate de bismuth.....	} aa	5 —
Salicylate de bismuth.....		

(L. Revilliod).

On peut donner le tanin (1 gr.), le ratanhia (2 à 4 gr.) en lavement, de même que le nitrate d'argent, l'iode, le sublimé, l'eau naphtolée :

1° Nitrate d'argent.....	0sr,10
Eau distillée.....	100 gr.
Pour un lavement.	
2° Iode.....	0sr,25
Iodure de potassium.....	1 gr.
Eau distillée.....	100 —
3° Sublimé.....	0sr,05
Sel marin.....	2 gr.
Eau distillée.....	250 —
4° Naphtaline.....	1 gr.
Huile d'olive.....	50 —

La naphtaline peut se donner en suppositoire :

Naphtaline.....	0sr,20
Beurre de cacao.....	3 gr.

Un médecin américain a recommandé les petits suppositoires de glace.

En même temps on donnera des antiseptiques intestinaux :

Benzonaphtol.....	} aa	0sr,20
Magnésie calcinée.....		

Pour un paquet; en prendre quatre à six par jour dans une cuillerée à café de lait ou d'eau sucrée.

En cas d'affaiblissement de l'enfant, on donnera une potion tonique :

Extrait mou de quinquina.....	2 gr.
Teinture de cannelle.....	1 —
Cognac.....	20 —
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 —
Eau.....	60 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

On peut aussi faire des injections de sérum artificiel.

Les petites doses de sulfate de soude (5 à 10 gr.) tous les matins dans un verre d'eau réussissent bien.

Dans les formes chroniques, cure à Plombières.

Pour la prophylaxie, il faut isoler les malades, désinfecter leurs selles et les objets souillés.

Dysidrose.

Lotions tièdes et émoullientes, eau amidonnée, eau de son, eau de graines de lin, puis poudrage avec talc ou lycopode. Si les démangeaisons sont vives, glycérolé tartrique à 1 p. 50. Rationner les liquides, éviter les grattages.

Dysostose cléido-cranienne.

Même traitement que pour le rachitisme (voy. ce mot), mais sans résultats aussi manifestes.

Dyspepsie.

Nourrissons. — Rectifier l'hygiène alimentaire, régler les tétées, changer de nourriture, donner des alcalins

(eau de chaux, Vichy, Vals), ou des acides quand les premiers n'auront pas réussi :

Acide chlorhydrique.....	I goutte.
Sirop simple.....	10 gr.
Eau distillée.....	20 —

Une demi-cuillerée à café après la tétée.

S'il y a des selles mal digérées, fétides, donner dans une cuillerée à café de lait 5 à 6 paquets par jour contenant chacun :

Benzonaphtol.....	} aa 0gr,05
Salicylate neutre de bismuth.....	
Bicarbonate de soude.....	

S'il y a constipation, remplacer les paquets précédents par les suivants :

Magnésie.....	0gr,05
Sucré en poudre.....	0gr,25

Pour un paquet ; un toutes les deux heures dans une cuillerée de lait.

S'il y a des coliques, cataplasmes sur le ventre, onctions avec l'huile de camomille camphrée, le baume tranquille, couche d'ouate.

Tordeus a conseillé une cuillerée à dessert avant ou après la tétée de la potion suivante :

Acide chlorhydrique dilué.....	III à IV gouttes.
Pepsine.....	0gr,50
Sirop de gingembre.....	10 gr.
Eau distillée.....	50 —

Toussaint a prescrit la papaine :

Papaine pure.....	0gr,50
Acide lactique.....	2 gr.
Sirop simple.....	50 —
Eau distillée.....	150 —
Teinture de vanille.....	Q. S.

Une cuillerée à café après le repas.

Contre les vomissements, potion de Rivière.
Contre les coliques douloureuses, donner, avant chaque tétée, une goutte du mélange :

Teinture de belladone.....	} aa 2 gr.
Elixir parégorique.....	

Seconde enfance. — (Voy. DILATATION DE L'ESTOMAC.)

E

Eclampsie (Voy. CONVULSIONS).

Ecroelles (Voy. ADÉNOPATHIES).

Ecthyma.

Supprimer les poux ou les acares, si ces parasites existent. Bains de sublimé à 1 p. 10 000, compresses salicylés à 1 p. 1000 ; pansements occlusifs avec rondelles d'emplâtre de Vigo ou minium de Vidal :

Minium.....	5 gr.
Cinabre.....	3 —
Emplâtre diachylon.....	52 —

Si, à la suite des pustules, le derme s'ulcère, se creuse, pansement sec avec l'iodoforme ou un mélange antiseptique, tel que :

Acide borique.....	} aa
Salol.....	
Poudre de talc.....	
Lycopode.....	

Contre la tendance à refaire des poussées d'ecthyma, donner la levure de bière.