

(eau de chaux, Vichy, Vals), ou des acides quand les premiers n'auront pas réussi :

Acide chlorhydrique.....	I goutte.
Sirop simple.....	10 gr.
Eau distillée.....	20 —

Une demi-cuillerée à café après la tétée.

S'il y a des selles mal digérées, fétides, donner dans une cuillerée à café de lait 5 à 6 paquets par jour contenant chacun :

Benzonaphtol.....	} aa 0gr,05
Salicylate neutre de bismuth.....	
Bicarbonate de soude.....	

S'il y a constipation, remplacer les paquets précédents par les suivants :

Magnésie.....	0gr,05
Sucré en poudre.....	0gr,25

Pour un paquet ; un toutes les deux heures dans une cuillerée de lait.

S'il y a des coliques, cataplasmes sur le ventre, onctions avec l'huile de camomille camphrée, le baume tranquille, couche d'ouate.

Tordeus a conseillé une cuillerée à dessert avant ou après la tétée de la potion suivante :

Acide chlorhydrique dilué.....	III à IV gouttes.
Pepsine.....	0gr,50
Sirop de gingembre.....	10 gr.
Eau distillée.....	50 —

Toussaint a prescrit la papaine :

Papaine pure.....	0gr,50
Acide lactique.....	2 gr.
Sirop simple.....	50 —
Eau distillée.....	150 —
Teinture de vanille.....	Q. S.

Une cuillerée à café après le repas.

Contre les vomissements, potion de Rivière.
Contre les coliques douloureuses, donner, avant chaque tétée, une goutte du mélange :

Teinture de belladone.....	} aa 2 gr.
Elixir parégorique.....	

Seconde enfance. — (Voy. DILATATION DE L'ESTOMAC.)

E

Eclampsie (Voy. CONVULSIONS).

Ecroelles (Voy. ADÉNOPATHIES).

Ecthyma.

Supprimer les poux ou les acares, si ces parasites existent. Bains de sublimé à 1 p. 10 000, compresses salicylés à 1 p. 1000 ; pansements occlusifs avec rondelles d'emplâtre de Vigo ou minium de Vidal :

Minium.....	5 gr.
Cinabre.....	3 —
Emplâtre diachylon.....	52 —

Si, à la suite des pustules, le derme s'ulcère, se creuse, pansement sec avec l'iodoforme ou un mélange antiseptique, tel que :

Acide borique.....	} aa
Salol.....	
Poudre de talc.....	
Lycopode.....	

Contre la tendance à refaire des poussées d'ecthyma, donner la levure de bière.

Eczéma.

Essayer d'abord les pommades anodines, non irritantes, appliquées matin et soir :

1 ^o Glycérolé d'amidon.....	30 gr.
Oxyde de zinc.....	4 —
2 ^o Vaseline.....	30 gr.
Acide borique.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 4 —
Oxyde de zinc.....	
3 ^o Vaseline.....	30 gr.
Salol.....	3 —
4 ^o Vaseline.....	50 gr.
Oxyde de zinc.....	20 —
Acide salicylique.....	1 —
5 ^o Vaseline.....	40 gr.
Lanoline.....	20 —
Alumol.....	10 —
6 ^o Vaseline.....	20 gr.
Lanoline.....	10 —
Dermatol.....	4 —
7 ^o Axonge benzoïnée.....	30 gr.
Baume du Pérou.....	40 —
Calomel.....	2 —
8 ^o Baume du Commandeur.....	20 gr.
Glycérine.....	2 —
Appliquer au pinceau dans l'eczéma suintant (Gallois).	
9 ^o Vaseline.....	30 gr.
Acide lactique.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 3 —
Calomel.....	
Recommandé par Gaucher dans l'eczéma impétigineux.	
10 ^o Vaseline.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 15 gr.
Oxyde de zinc.....	
Talc.....	

Outre cette pâte on emploie quelquefois des colles faites avec la gélatine (Unna) :

Gélatine.....	15 gr.
Glycérine.....	25 —
Eau.....	45 —
Oxyde de zinc.....	15 —

On fait fondre au bain-marie la gélatine blanche dans le double de son poids d'eau en agitant constamment, on ajoute l'oxyde de zinc et on laisse refroidir sans cesser d'agiter. Étendre au pinceau sur les surfaces eczématisées. Dans les cas rebelles et torpides, on a recours aux pommades plus irritantes :

1 ^o Glycérolé d'amidon.....	30 gr.
Goudron.....	2 —
2 ^o Vaseline.....	30 gr.
Huile de cade.....	10 —
3 ^o Vaseline.....	40 gr.
Acide tartrique.....	1 —

Quand l'eczéma est très suintant, on panse à sec avec les poudres suivantes :

1 ^o Amidon.....	40 gr.
Oxyde de zinc.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 10 —
Acide borique.....	
2 ^o Talc de Venise.....	40 gr.
Alumol.....	10 —
3 ^o Amidon.....	40 gr.
Talc.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 10 —
Dermatol.....	

Si l'eczéma siège au cuir chevelu, on coupe les cheveux ras et s'il y a des croûtes épaisses on les fait tomber avec un cataplasme d'amidon refroidi ou avec des compresses boriquées humides.

Pour l'eczéma des narines, E. Besnier introduit des boulettes d'ouate imbibées de :

Huile d'amandes douces.....	25 gr.
Acide salicylique.....	25r,50

Je ne donne pas de bains dans l'eczéma infantile. Dans certains cas, il faut penser à des répercussions viscérales et ne pas traiter en bloc une surface trop étendue d'eczéma facial. Surtout il ne faut pas manquer d'associer aux topiques le traitement général.

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Aux scrofuleux, on donne l'huile de morue à haute dose, ou bien les sirops iodés (iodotannique, antiscorbutique, etc.). On prescrit également l'arsenic ou l'eau de la Bourboule. Gaucher conseille :

Sirop iodo-tannique.....	300 gr.
Biphosphate de chaux.....	15 —
Liqueur de Pearson.....	10 —

En prendre deux cuillerées par jour.

On peut formuler encore :

Sirop de quinquina.....	200 gr.
Arséniate de soude.....	0sr,05

Une cuillerée à café matin et soir.

Les préparations arsenicales ne seront pas continuées indéfiniment; on suspendra pendant huit à dix jours tous les quinze jours ou tous les mois. Aux enfants arthritiques, on conseillera le bicarbonate de soude, les eaux de Vichy, Vals, Royat, Uriage, Saint-Gervais. Aux dyspeptiques et constipés on donnera des laxatifs et purgatifs, aux diarrhéiques des astringents et anti-septiques :

Salicylate de bismuth.....	} ãã 0sr,20
Benzonaphtol.....	

Pour un paquet, en prendre cinq à six par jour dans une cuillerée de lait.

Le régime a une très grande importance. Chez les nourrissons, tétées régulières, bonne hygiène de la nourrice. Dans la seconde enfance, supprimer l'alcool, les épices, la charcuterie, la salade, les choux, les poissons de mer et crustacés, les fromages faits, le gibier, les sauces épaisses et grasses, les acidités, etc. On donnera le lait, le pain, les soupes, les œufs, les légumes secs, les viandes blanches, les fruits cuits, etc.

Eléphantiasis.

Compression élastique avec la bande de caoutchouc, massage, électrisation, iodure de potassium. Les rayons Röntgen ont donné un succès au D^r Sorel.

Embarras gastrique.

Donner l'ipéca ou le tartre stibié, ou les deux à la fois.

Poudre d'ipéca.....	0sr,20
Emétique.....	0sr,01

Pour un paquet, n° 2.

A prendre à cinq minutes de distance dans une cuillerée d'eau sucrée (enfant de quatre à cinq ans). Boire un peu de thé léger ou tilleul avant et après les prises.

Le purgatif peut remplacer le vomitif :

Sulfate de soude.....	} ãã 20 gr.
Sirop de groseilles.....	
Eau.....	

Prendre le matin à jeun (enfant de huit à dix ans).

Après les évacuants, on continuera quelques jours par l'antiseptie intestinale :

Bétol.....	0sr,10
Magnésie.....	0sr,15
Sucre en poudre.....	0sr,50

Pour un paquet, n° 15; en prendre cinq dans la journée.

Benzonaphtol.....	0sr,20
Bicarbonate de soude.....	0sr,15
Sucre en poudre.....	0sr,50

Mettre l'enfant au lit, à la diète lactée, et ne reprendre l'alimentation qu'avec prudence et progression.

Emphysème pulmonaire.

Contre les exacerbations aiguës, ventouses sèches, inhalations d'oxygène, vomitifs, potions calmantes :

Teinture de belladone.....	X gouttes.
Sirop de codéine.....	10 gr.
— de Tolu.....	20 —
Eau de fleurs d'oranger.....	60 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

Les bains d'air comprimé sont très utiles.

En dehors des crises de dyspnée, il faut conseiller l'arsenic et l'iodure qu'on peut alterner de quinzaine en quinzaine :

Arséniate de soude.....	0 ^{sr} ,05
Eau distillée.....	200 gr.

Une cuillerée à café matin et soir (quinze jours par mois).

Iodure de potassium ou sodium.....	10 gr.
Eau distillée.....	Q. S.
Sirop d'écorces d'oranges.....	200 gr.

Une cuillerée à café matin et soir pendant les quinze jours suivants.

Cure au Mont-Dore, à Alleverd, aux Eaux-Bonnes.

Emphysème sous-cutané.

Frictions et massages légers, ponctions capillaires aseptiques. Pour prévenir l'emphysème, combattre la toux, s'il s'agit d'une affection des voies respiratoires à paroxysmes, faire la trachéotomie avec dextérité s'il s'agit d'un croup opéré.

Empoisonnements.

Provoquer des vomissements, laver l'estomac et l'intestin, faire boire du lait ou de l'eau, neutraliser le poison, réchauffer l'enfant, faire des injections de sé-

rum artificiel, des tractions rythmées de la langue, l'électrisation, etc. Pour les indications spéciales, il faut envisager successivement divers poisons.

Acides caustiques. — Eau de chaux, magnésie calcinée, eau de Vichy, Vals, eau savonneuse, lait, huile, blanes d'œufs battus dans l'eau, etc.

Alcalis caustiques. — Eau vinaigrée, limonade citrique ou tartrique, jus de citron, d'orange, de grenade.

Alcool. — Café, lavement, frictions cutanées, ammoniaque liquide (V à X gouttes dans un peu de café ou de thé).

Aconit. — Café, vin, alcool, éther, injections de caféine, de sérum artificiel, d'apomorphine (1 centigr. par gr.).

Arsenic. — Ingestion rapide de sesquioxyde de fer hydraté. On traite 50 grammes de perchlorure de fer liquide par 40 grammes de carbonate de soude dissous dans trois litres d'eau. On passe à travers un linge et on recueille la poudre humide qui reste sur le filtre. Cette poudre se donne dans l'eau chaude.

On donne encore :

Magnésie calcinée.....	12 gr.
Sulfate de fer.....	30 —
Eau.....	200 —

Une cuillerée à soupe de quart d'heure en quart d'heure.

Belladone et atropine. — Lavement purgatif, café, frictions stimulantes, opium (5 milligr. de chlorhydrate de morphine en injections sous-cutanées toutes les deux ou trois heures), respiration artificielle, tractions rythmées de la langue.

Botulisme, champignons, etc. — Vomitifs et purgatifs, lait, eau albumineuse, grog, café, frictions cutanées, injections de sérum artificiel.

Cocaïne. — Frictions énergiques sur tout le corps, bain sinapisé, lavement purgatif, boissons chaudes,

injections d'éther, respiration artificielle. Chez un enfant de neuf mois, le Dr Pacaud a prescrit :

Bromure de potassium.....	} aa	0sr,50
Chloral.....		
Julep gommeux.....		

Une cuillerée à café de quart d'heure en quart d'heure.

Digitale. — Café, potion de Todd, frictions, lavement purgatif, décubitus dorsal.

Nitrate d'argent. — Boire de l'eau salée, du lait, de l'eau albumineuse.

Opium. — Café, alcool, frictions, oxygène, respiration artificielle.

Permanganate de potasse (5 centigr. toutes les heures dans un demi-verre d'eau).

Oxyde de carbone. — Inhalations d'oxygène, tractions rythmées de la langue, respiration artificielle, frictions sèches ou térébenthinées, électrisation, bains sinapisés, l'injections d'éther, de caféine.

Phénol. — Sulfate de soude (10 à 15 gr. dans un verre d'eau), sulfate de magnésie, huile de ricin, huile d'olive, blancs d'œufs, eau de savon. Boules d'eau chaude, électricité, nitrite d'amyle.

Phosphore. — On prescrit par gorgées, de cinq en cinq minutes, l'émulsion suivante :

Essence de térébenthine.....	10 gr.
Eau albumineuse sucrée.....	250 —

On peut donner aussi :

Sulfate de cuivre.....	0sr,30
Eau sucrée.....	100 gr.

Lait en abondance.

Plomb. — Limonade sulfurique, sulfate de zinc (1 gr. dans un verre d'eau sucrée). Sulfate de magnésie (10 à 15 gr. dans un verre d'eau sucrée) ; lait, boissons émollientes. Dans l'empoisonnement chronique, bains sulfureux, iodure de potassium.

Santonine. — Lavements purgatifs, alcool, café, sinapismes, inhalations d'éther ou de chloroforme.

Strychnine et noix vomique. — Tanin (1 à 2 gr.) et autres astringents, puis narcotiques (bromure de potassium, chloral, opium, chloroforme, éther).

Encéphalocèle.

Compression méthodique et continue, ponctions aseptiques (méningocèle), extirpation comme pour le spina-bifida.

Endocardite.

Révulsion au début (vésicatoire, pointes de feu, ventouses scarifiées), onctions calmantes avec :

Baume tranquille.....	20 gr.
Chloroforme.....	5 —

On donne en même temps la digitale (II gouttes par année d'âge, 2 centigrammes de poudre de feuilles en infusion) :

1° Teinture de digitale.....	X gouttes.
Julep gommeux.....	60 gr.

Par cuillerées à dessert dans la journée.

2° Poudre de feuilles de digitale.....	0sr,10
Infuser dans eau bouillante.....	100 gr.
Ajouter sirop.....	20 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

Si la digitale ne paraît pas efficace, on peut donner le strophantus (1 à 3 granules d'un milligr. d'extrait par jour), la caféine, le muguet :

1° Caféine.....	0sr,50
Benzoate de soude.....	1 gr.
Sirop des cinq racines.....	20 —
— de framboises.....	20 —
Eau distillée.....	80 —

Par cuillerées de deux en deux heures (enfant de cinq à dix ans).

2° Extrait de muguet.....	1 gr.
Sirop de digitale.....	10 —
— de cerises.....	10 —
Eau distillée.....	80 —

On peut aussi donner la théobromine par paquets de 25 centigrammes (3 à 4 par jour dans une cuillerée de lait).

Mais tous ces médicaments ne sont indiqués que dans les cas de lésions non compensées, avec affaiblissement de la systole cardiaque.

Quand la lésion est tolérée, on prescrit l'iodure de potassium à titre résolutif:

Iodure de potassium.....	10 gr.
Eau.....	Q. S.
Sirop d'écorces d'oranges.....	200 gr.

Une cuillerée à café matin et soir.

Si l'enfant est pâle, anémié, on peut aussi donner un peu de fer, d'arsenic, de quinquina.

Hygiène thérapeutique. — La lésion est acquise et nous sommes en présence d'une endocardite chronique; il faut préserver l'enfant du froid, de l'humidité, de la fatigue, des émotions fortes, des excès de table. On prescrira des vêtements chauds (flanelle), l'habitation dans un climat sec et tempéré, l'exercice modéré ou le repos à l'air, un régime surtout végétarien avec beaucoup de lait. On interdira la mer, les bains froids, les cures thermales, le vin pur, les excès de table, les soirées, les fatigues de la vie mondaine.

Endocardite ulcéreuse.

Révuision énergique, pas de digitale qui favoriserait les embolies; café, alcool, spartéine, oxygène, régime lacté.

Engelures.

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Huile de foie de morue, sirop iodo-tannique, quinine et vaso-constricteurs:

1° Sulfate de quinine.....	} ãã	0gr,50
Poudre d'ergot de seigle.....		
Extrait de ratanhia.....		1 gr.
Glycérine et excipient.....		Q. S.

Pour quinze pilules; une le matin.

2° Sulfate de quinine.....	} ãã	0gr,50
Ergotine.....		
Poudre de digitale.....	} ãã	0gr,10
Extrait de belladone.....		

Pour dix pilules; deux par jour.

TRAITEMENT LOCAL. — Protéger les surfaces exposées (gants, bas de laine, foulards), lavages à l'eau tiède, à la décoction de feuilles de noyer, frictions à l'eau-de-vie camphrée, poudrer avec:

Amidon.....	9 parties.
Salicylate de bismuth.....	1 partie.

Badigeonnages à la teinture d'iode pure ou mitigée:

Glycérine.....	20 gr.
Teinture d'iode.....	10 —

Etendre tous les soirs au pinceau sur les parties malades.

E. Besnier conseille, pour calmer les démangeaisons vespérales, les onctions avec:

Glycérine.....	} ãã	50 gr.
Eau de roses.....		
Tanin.....		0gr,10

On peut encore badigeonner avec:

1° Nitrate d'argent.....	0gr,15
Eau distillée.....	30 gr.

2 ^o Ammoniaque.....	1 gr.
Essence de cannelle.....	0 ^{sr} ,25
Eau-de-vie camphrée.....	60 gr.
3 ^o Extrait de saturne.....	20 gr.
Eau-de-vie camphrée.....	40 —

Quand les engelures sont ulcérées, on panse avec :

1 ^o Vaseline.....	30 gr.
Borax.....	5 —
Onctions matin et soir.	
2 ^o Huile camphrée.....	2 gr.
Lanoline.....	30 —
3 ^o Nitrate d'argent.....	0 ^{sr} ,10
Pommade rosat.....	15 gr.
4 ^o Sous-acétate de plomb.....	1 gr.
Extrait thébaïque.....	0 ^{sr} ,10
Axonge benzoïnée.....	40 gr.
5 ^o Baume du Pérou.....	10 gr.
— nerval.....	20 —
Eau de Cologne.....	30 —
6 ^o Oxyde de zinc.....	4 gr.
Tanin.....	2 —
Glycérine.....	20 —
Baume du Pérou.....	5 —

Pour empêcher les crevasses de suppurer, le Dr Pilatte prescrit les onctions avec :

Teinture de digitale.....	0 ^{sr} ,60
Thymol cristallisé.....	0 ^{sr} ,30
Alcool à 70°.....	} aa 15 gr.
Glycérine.....	

On peut aussi appliquer les collodions suivants :

1 ^o Huile de ricin.....	5 gr.
Térébenthine de Venise.....	10 —
Collodion.....	30 —
2 ^o Iode métallique.....	0 ^{sr} ,50
Collodion.....	30 gr.
3 ^o Iodoforme.....	1 gr.
Collodion.....	30 —

Engorgement des mamelles (Voy. ABCÈS DE LA MAMELLE).

Entérite muco-membraneuse.

PROPHYLAXIE. — Allaitement naturel bien réglé, lait stérilisé, sevrage graduel et tardif, rationnement des liquides, pas d'excès de viande, de crudités, etc.

TRAITEMENT. — Pendant les crises aiguës, diète sévère (lait pur ou coupé en faible quantité), diète hydrique s'il y a des vomissements, lait d'ânesse parfois. Dans l'intervalle des crises, aliments choisis, laitages, farinoux, purées de légumes, poissons frais, œufs. Repas rares, pas d'excès, pas de crudités, de sauces épicées, pas de vin pur. Flanelle autour du ventre, massages légers, frictions sèches.

Bains tièdes à 34° ou 35°, cataplasmes sur le ventre, affusions froides. Combattre la constipation par les purgatifs doux (huile de ricin : une cuillerée à café, à dessert ou à potage suivant l'âge); le calomel peut être prescrit à la dose de 5 centigrammes par année d'âge. On donnera les fruits cuits, les pruneaux avec follicules de séné, les graines de lin, de psyllium, de moutarde blanche. Les suppositoires creux au beurre de cacao contenant 1 à 2 grammes de glycérine sont excellents contre la constipation; de même les petits lavements de glycérine pure (4 à 5 gr.) donnés avec une petite seringue de cette capacité.

Quand l'enfant rend des fausses membranes, des mucosités, etc., il faut faire de grands lavages de l'intestin avec la sonde de Nélaton (n° 20), en faisant passer un demi à un litre d'eau bouillie additionnée de :

Borate de soude.....	2 gr.
----------------------	-------

Pour assurer l'antisepsie du tube digestif, on donnera en même temps le calomel à doses fractionnées (1 à 2 cen-

tigr. quatre à cinq fois par jour), ou les paquets suivants :

Bicarbonate de soude.....	osr,20
Magnésie calcinée.....	osr,15
Benzonaphtol.....	osr,10
Poudre de noix vomique.....	osr,01

Pour un paquet, n° 20 ; à prendre matin et soir avant le repas, dans une cuillerée à café de lait ou d'eau sucrée.

Le Dr Saint-Philippe conseille la macération de poudre de guarana (50 centigr. dans 60 gr. d'eau bouillie jusqu'à deux ans, par cuillerées à café de deux en deux heures ; 1 à 2 gr. dans 100 gr. d'eau bouillie au-dessus de deux ans).

Dans les formes aiguës dysentériques, Aviragnet s'est bien trouvé des petites doses de sulfate de soude (5 gr.) répétées tous les jours pendant huit jours : le médicament est pris dans un verre d'eau en trois ou quatre fois à une heure d'intervalle.

Eaux minérales à conseiller : Plombières, Châtel-Guyon, Miers, Kissingen, Hombourg, Carlsbad.

Épilepsie.

Desserrer les vêtements au moment de l'attaque, placer l'enfant sur un matelas, essayer la compression des carotides. Quand il y a une aura périphérique, on peut parfois, par une constriction énergique au-dessus, prévenir ou atténuer l'accès.

Pitres a réussi avec des vésicatoires en bracelet.

Dans l'épilepsie vermineuse, commencer par un anthelminthique. Si la syphilis est soupçonnée, frictions mercurielles, iodure de potassium.

Dans l'épilepsie essentielle, le traitement est palliatif. On prescrit le bromure de potassium à doses fortes :

Bromure de potassium.....	25 gr.
Eau distillée.....	Q. S.
Sirop d'écorces d'oranges.....	500 —

Prendre deux, trois, puis quatre cuillerées par jour pendant quinze jours ; s'arrêter huit jours, recommencer, etc.

On peut associer les différents bromures :

Bromure de potassium.....	} aa	2 gr.
— de sodium.....		
— d'ammonium.....		
— de strontium.....		
Sirop d'écorces d'oranges.....		50 —
Eau distillée.....		150 —

Prendre deux à quatre cuillerées par jour.

Le bromure d'or a été conseillé par Goubert (2 à 5 milligr. en granules).

Le bromure d'éthylène mêlé à l'huile (5 p. 100) a été prescrit à la dose de XXX gouttes deux fois par jour dans l'eau sucrée.

D'autres bromures ont été prescrits :

1° Bromure d'ammonium et rubidium.....	2 gr.	
Sirop de fleurs d'oranger.....	} aa	30 —
Eau de tilleul.....		

En deux doses, matin et soir.

2° Bromure de zinc ou de nickel.....	5 gr.
Sirop de belladone.....	60 —
— d'écorces d'oranges.....	200 —

Une cuillerée à soupe matin et soir.

Contre le vertige épileptique, Bourneville a conseillé le bromure de camphre (capsules de 10 centigr. ; deux à huit par jour).

Un régime pauvre en chlorure de sodium (Richet et Toulouse) augmente l'action des bromures et permet de donner des doses moindres. Donc pas de sel dans les aliments.

Le borax a été conseillé, à la dose de 1, 2, 3 et 4 grammes par jour.

Trousseau employait l'extrait de belladone :

1° Extrait de belladone.....	} aa	osr,01
Poudre de belladone.....		
Excipient avec glycérine.....		Q. S.

Pour une pilule (une à quatre par jour).

2 ^o Extrait de belladone.....	0 ^{sr} ,10
Oxyde de zinc.....	1 gr.

Pour dix pilules, une matin et soir.

D'après Pierret, l'extrait de belladone ramènerait les attaques, mais en améliorant le caractère et l'intelligence.

Beaucoup d'autres médicaments ont été prescrits :

1 ^o Antipyrine.....	1 gr.
--------------------------------	-------

Pour un paquet; trois par jour à prendre dans un peu d'eau sucrée.

2 ^o Poudre de racines d'armoise.....	50 gr.
Sucre en poudre.....	200 —

Quatre cuillerées à café par jour.

3 ^o Sulfate de cuivre ammoniacal.....	1 gr.
Eau distillée.....	20 —

III à V gouttes par jour.

On a donné le valérianate d'ammoniaque à la dose de une à deux cuillerées à café par jour, le sulfonal ou le trional (50 centigr. le soir), l'hydrastine (5 centigr.).

A ajouter l'hydrothérapie froide (douches, drap mouillé), la vie au grand air, le repos moral, une bonne alimentation, un bon climat (Bagnères-de-Bigorre).

Épistaxis.

Élever le bras correspondant à la narine qui saigne, eau fraîche à la figure, trousseau de clefs dans le dos, injection d'eau chaude, de jus de citron, de perchlorure de fer dilué, tige d'amadou ou d'ouate trempée dans le perchlorure de fer, eau de Tisserand, de Léchelle, de Pagliari, de Brocchieri, eau oxygénée, insufflation d'alun, de tanin, d'antipyrine, cautérisation au nitrate d'argent (solution à 1 p. 50), atouchements à la cocaïne (1 p. 10), à l'antipyrine (1 p. 3), à la ferropyrine (1 p. 10).

On peut faire dans les narines une injection avec :

Chlorure de calcium.....	1 gr.
Gélatine.....	5 —
Eau.....	100 —

On fait dissoudre à chaud la gélatine dans l'eau et on ajoute le chlorure; la solution est employée tiède (à 37°). On peut faire des injections sous-cutanées de sérum gélatineux à 2 p. 100 (25 à 100 gr.). Contre la répétition des épistaxis, on prescrira l'hamamelis virginica (X gouttes trois à quatre fois par jour), l'ergotine :

Ergotine.....	0 ^{sr} ,50
Teinture d'hamamelis.....	XXX gouttes.
Sirop de ratanhia.....	20 gr.
Eau distillée de mélisse.....	60 —

A prendre dans les vingt-quatre heures.

On donnera la quinine, surtout dans les pays palustres.

Ne pas oublier les douches ou le drap mouillé, les bains salés ou sulfureux, le fer, si l'enfant est pâle et amaigri.

Le tamponnement avec la sonde de Belloc se fait très rarement; on préfère aujourd'hui soit le tamponnement antérieur, soit les cautérisations directes du point qui donne le sang avec le nitrate d'argent ou l'acide chromique porté au bout d'un stylet.

Épithélioma.

Chlorate de potasse en poudre ou aristol, emplâtre au pyrogallol à 40 p. 100, grattage et curetage parfois.

Érysipèle.

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — On prescrit les toniques, une bonne alimentation (lait surtout), la quinine, l'antipyrine ou l'acide salicylique quand la fièvre est forte. Le sérum antistreptococcique, qu'on peut injecter à la dose de 10 à 20 centimètres cubes, n'a jusqu'à présent rien donné de certain.

TRAITEMENT LOCAL. — Onctions avec une pommade

antiseptique ou applications de compresses humides antiseptiques (acide salicylique, acide borique, sublimé).

1 ^o Créoline.....	1 gr.
Iodoforme.....	4 —
Lanoline.....	20 —
Appliquer au pinceau.	
2 ^o Ichtyol.....	} aa 20 gr.
Lanoline.....	
Eau.....	
3 ^o Éther sulfurique.....	} aa 50 gr.
Camphre pulvérisé.....	
4 ^o Tanin.....	} aa 2 gr.
Camphre.....	
Éther.....	

S'il s'agit d'un membre, on le plonge dans un bain de sublimé à 1 p. 2000.

P. Gallois conseille une gelée d'agar au sublimé :

Sublimé.....	} aa 0gr,10
Acide tartrique.....	
Gélose.....	} 1 gr.
Eau.....	

Faire prendre en gelée dans un pot de pommade; on étend avec le doigt sur les parties malades.

Personnellement je me sers volontiers d'une pommade à l'ichtyol à 1 p. 10 ou d'une solution à 1 p. 20.

La prophylaxie consiste à panser avec soin toute plaie ou solution de continuité présentée par l'enfant. Chez les nouveau-nés, c'est la plaie ombilicale qu'il faut surtout viser.

Érythème induré.

Compression ouatée, repos horizontal, massage. A l'intérieur, huile de foie de morue ou sirop antiscorbutique.

Érythèmes infantiles.

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Bon allaitement, bon régime de la nourrice, veiller au bon fonctionnement de l'intestin.

TRAITEMENT LOCAL. — Pansement sec de préférence (poudrages abondants), ne laver qu'en cas de nécessité et avec de l'eau bouillie. Voici les poudres à employer :

1 ^o Poudre d'amidon.....	100 gr.
Craie préparée.....	40 —
Alun.....	} aa 5 —
Acide borique.....	
2 ^o Talc.....	50 gr.
Magnésie.....	25 —
Acide salicylique.....	} aa 5 —
— borique.....	
Essence de lavande.....	XX gouttes.
3 ^o Lycopode.....	} aa 20 gr.
Talc.....	
Amidon.....	
Acide borique.....	

En cas d'ulcération, on pansera avec l'aristol, l'iodoforme, le salol, le dermatol, le traumatol, le bétol, le bismuth, etc.

Érythèmes infectieux.

Prophylaxie par le nettoyage des cavités accessibles (nez, bouche, gorge, etc.). Bains de sublimé à 1 p. 10000. Isolement.

Érythème noueux.

Repos au lit, enveloppement des membres atteints après onction au baume tranquille, purgatif, quinine, iodure de potassium.

Érythème pernion (Voy. ENGELURES).

Érythème polymorphe.

Repos, diète lactée, purgatifs et antiseptiques de l'intestin, poudrage des surfaces malades.

Excitation cérébrale.

TRAITEMENT HYGIÉNIQUE. — Hygiène alimentaire bien réglée, vie au grand air, bains de tilleul, affusions froides, drap mouillé, pas d'excitation provoquée par les jeux, la conversation, les veillées. Vie à la campagne, cure à Bagnères-de-Bigorre, pas de surmenage. En cas d'insomnie, donner le soir un peu de bromure, de chloral, de trional (20 à 25 centigr.).

Exostoses.

Traitement chirurgical en cas de douleurs, de gêne notable, d'inflammation des bourses séreuses.

F**Faiblesse congénitale.**

Couveuse à 30°, 35°, 37°; gavage avec sonde par le nez, ou allaitement nasal avec la cuiller; bains sinapisés, inhalations d'oxygène, lait d'ânesse quand le lait féminin fait défaut.

Favus.

Couper ras les cheveux, cataplasmes de fécule pour faire tomber les croûtes, ou toile de caoutchouc. Lavages ultérieurs avec liqueur de van Swieten, eau oxygénée, solution iodo-iodurée :

Iode métallique.....	1 gr.
Iodure de potassium.....	2 —
Eau.....	1000 —

La tête étant nettoyée, épilation autour des foyers, onctions parasitiques ;

1° Vaseline.....	30 gr.
Turbith minéral.....	1 —
2° Naphtol β.....	5 gr.
Baume du Pérou.....	osr,50
Vaseline.....	50 gr.
3° Vaseline.....	30 gr.
Huile de cade.....	5 —
Précipité jaune.....	osr,25

Après avoir appliqué la pommade le soir, on frictionne le lendemain matin avec :

Teinture d'iode.....	20 gr.
Alcool à 60°.....	100 —

On fait un badigeonnage avec un écouvillon d'ouate imbibé de :

Essence de cannelle de Chine.....	10 gr.
Ether sulfurique faiblement alcoolisé.....	30 —

Sabouraud conseille les badigeonnages de teinture d'iode avant et après l'épilation qui doit être faite tous les mois.

Si le favus siège sur une partie glabre, on décape avec cataplasme, on curette et on badigeonne avec la teinture d'iode.

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Huile de morue, sirop iodotannique, cure thermale sulfureuse, saline, cure maritime. Isolement.

Fentes du crâne.

Protéger les surfaces à l'aide de bandages, de calottes métalliques ou autres; ponction aseptique quand il y a tumeur.

Fièvre de croissance (Voy. CROISSANCE).