

Érythème polymorphe.

Repos, diète lactée, purgatifs et antiseptiques de l'intestin, poudrage des surfaces malades.

Excitation cérébrale.

TRAITEMENT HYGIÉNIQUE. — Hygiène alimentaire bien réglée, vie au grand air, bains de tilleul, affusions froides, drap mouillé, pas d'excitation provoquée par les jeux, la conversation, les veillées. Vie à la campagne, cure à Bagnères-de-Bigorre, pas de surmenage. En cas d'insomnie, donner le soir un peu de bromure, de chloral, de trional (20 à 25 centigr.).

Exostoses.

Traitement chirurgical en cas de douleurs, de gêne notable, d'inflammation des bourses séreuses.

F**Faiblesse congénitale.**

Couveuse à 30°, 35°, 37°; gavage avec sonde par le nez, ou allaitement nasal avec la cuiller; bains sinapisés, inhalations d'oxygène, lait d'ânesse quand le lait féminin fait défaut.

Favus.

Couper ras les cheveux, cataplasmes de fécule pour faire tomber les croûtes, ou toile de caoutchouc. Lavages ultérieurs avec liqueur de van Swieten, eau oxygénée, solution iodo-iodurée :

Iode métallique.....	1 gr.
Iodure de potassium.....	2 —
Eau.....	1000 —

La tête étant nettoyée, épilation autour des foyers, onctions parasitiques ;

1° Vaseline.....	30 gr.
Turbith minéral.....	1 —
2° Naphtol β.....	5 gr.
Baume du Pérou.....	osr,50
Vaseline.....	50 gr.
3° Vaseline.....	30 gr.
Huile de cade.....	5 —
Précipité jaune.....	osr,25

Après avoir appliqué la pommade le soir, on frictionne le lendemain matin avec :

Teinture d'iode.....	20 gr.
Alcool à 60°.....	100 —

On fait un badigeonnage avec un écouvillon d'ouate imbibé de :

Essence de cannelle de Chine.....	10 gr.
Ether sulfurique faiblement alcoolisé.....	30 —

Sabouraud conseille les badigeonnages de teinture d'iode avant et après l'épilation qui doit être faite tous les mois.

Si le favus siège sur une partie glabre, on décape avec cataplasme, on curette et on badigeonne avec la teinture d'iode.

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Huile de morue, sirop iodotannique, cure thermale sulfureuse, saline, cure maritime. Isolement.

Fentes du crâne.

Protéger les surfaces à l'aide de bandages, de calottes métalliques ou autres; ponction aseptique quand il y a tumeur.

Fièvre de croissance (Voy. CROISSANCE).

Fièvre de digestion.

Régime alimentaire. — Pas de vin, ni mets excitants ou échauffants, sauces épicées, acidités, sucreries, pâtisserie, charcuterie, viandes faisandées, pas de crudités; régime surtout végétarien, pain grillé, panades et potages épais, purées de légumes, œufs, fruits cuits, poissons frais, viandes blanches; nombre limité de repas (trois par jour); rationnement des liquides (un verre de lait ou d'eau par repas).

Médicaments. — Combattre la constipation par les laxatifs (magnésie, rhubarbe, etc.) :

Bicarbonate de soude.....	} aa	0 ^{gr} ,20
Magnésie calcinée.....		
Benzonaphtol.....		
Pepsine.....		0 ^{gr} ,10
Poudre de noix vomique.....		0 ^{gr} ,01

Pour un paquet; en prendre deux ou trois par jour, avant le repas, dans une cuillerée à café de lait ou d'eau sucrée.

S'il y a de la diarrhée, on remplace la magnésie par le bismuth.

Quand l'enfant a nettement un état saburral, on donne le calomel :

Calomel à la vapeur.....	0 ^{gr} ,02
Sucre de lait.....	0 ^{gr} ,50

Pour un paquet; en prendre quatre ou cinq dans la journée à une heure d'intervalle.

On luttera encore contre la constipation à l'aide des suppositoires glycéринés ou des petits lavements de glycérine pure.

Fièvre éphémère.

Donner la quinine en suppositoire, à la dose de 10 centigrammes par année d'âge :

Bromhydrate de quinine.....	0 ^{gr} ,20
Beurre de cacao.....	2 gr.

Pour un suppositoire, n° 4; un tous les soirs.

Purger l'enfant avec huile de ricin (5, 10, 15 gr. suivant l'âge), ou la poudre de scammonée (5 centigr. par année d'âge).

Fièvre ganglionnaire.

Onctions quotidiennes sur la tuméfaction ganglionnaire avec :

1° Baume tranquille.....	30 gr.
Chloroforme.....	4 —
Laudanum.....	3 —
2° Vaseline.....	30 gr.
Iodure de potassium.....	3 —

Les badigeonnages de teinture d'iode sont également bons. De même l'onguent napolitain.

On donnera la quinine en suppositoire :

Bichlorhydrate de quinine.....	0 ^{gr} ,15
Beurre de cacao.....	2 gr.

Pour un suppositoire.

Pulvérisations à vapeur pour nettoyer la gorge, combattre la constipation.

S'il y a suppuration, ouvrir l'abcès.

Fièvre herpétique (Voy. FIÈVRE ÉPHÉMÈRE).**Fièvre intermittente (Voy. PALUDISME).****Fièvre jaune.**

Injections sous-cutanées de chlorhydrate de quinine :

Bichlorhydrate de quinine.....	2 gr.
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Chaque seringue de Pravaz contient 20 centigrammes de sel quinique.

Lavages de l'intestin, injections de caféine, d'éther, de spartéine, de sérum artificiel, inhalations d'oxygène; lait, champagne, potion de Rivière. On est sur la voie du sérum antiamaril (Sanarelli) et des inoculations préventives. Isolement, désinfection, quarantaines.

Fièvre récurrente.

Calomel à doses fractionnées : 1 à 2 centigrammes toutes les deux heures. Contre l'hyperthermie, bains tièdes ou frais (30° 28°, 25°), drap mouillé, quinine. Vessie de glace sur la rate quand elle est très grosse. Contre le collapsus cardiaque, faire des injections matin et soir avec 1 centimètre cube de la solution :

Sulfate de spartéine.....	0 ^{sr} ,20
— de strychnine.....	0 ^{sr} ,01
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Régime lacté, potion de Todd, inhalations d'oxygène. Isolement, désinfection.

Fièvre typhoïde.

Donner, quand le thermomètre atteint ou dépasse 39°, un bain toutes les quatre heures.

Ce bain sera de dix minutes, à 30° pour commencer, puis à 28°, 25° et même 20° si l'enfant réagit bien.

Lavement d'eau bouillie froide, matin et soir. Lavages méthodiques de la bouche, de la gorge, des narines avec eau de Vichy ou eau boriquée trois à quatre fois par jour (pulvérisations à vapeur).

Boissons abondantes : lait, limonade vineuse, bouillon dégraissé.

La quinine n'a pas d'action.

Si le pouls est petit, fréquent, le cœur faible, on donnera :

Teinture de digitale.....	XX gouttes.
Cognac.....	20 gr.
Teinture de cannelle.....	1 —
Sirop de quinquina.....	20 —
Eau.....	60 —

Une cuillerée à dessert toutes les deux heures.

S'il y a insomnie, agitation, ataxie, adynamie, Jules Simon conseille :

Hydrate de chloral.....	0 ^{sr} ,50
Teinture de musc.....	XX gouttes.
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 gr.
Eau de tilleul.....	80 —

Contre le collapsus, on agira par les injections de caféine :

Caféine.....	2 gr.
Benzoate de soude.....	2 ^{sr} ,50
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Une seringue de Pravaz deux ou trois fois par jour.

Les injections de sérum artificiel (50, 100, 200 gr. d'eau salée à 7 p. 1000) sous la peau du ventre (une à trois fois par jour) rendront service dans beaucoup de cas.

S'il y a de la congestion pulmonaire, ventouses sèches, cataplasmes sinapisés ou compresses froides, inhalations d'oxygène.

En cas d'hémorragie intestinale, suspendre les bains, mettre une vessie de glace sur le ventre, donner de la limonade sulfurique ou du perchlorure de fer (XX gouttes dans l'eau sucrée), des boissons glacées, injecter sous la peau le sérum gélatineux à 2 p. 100. En cas de perforation intestinale, laparotomie immédiate, suture de la plaie, etc.

Pour favoriser la convalescence et le retour des forces, changement d'air, vie à la campagne.

PROPHYLAXIE. — Tous les aliments stérilisés par la chaleur, désinfection des déjections et linges souillés; ne pas faire usage d'eau de rivière et de légumes ni fruits crus ayant pu être contaminés par cette eau.

Filet.

On sectionne le frein trop court de la langue avec une sonde cannelée et la pointe de ciseaux préalablement stérilisés.

Fissure à l'anus.

Toucher légèrement avec un crayon de sulfate de cuivre ou de nitrate d'argent mitigé; suppositoire avec :

1 ^o Extrait de ratanhia.....	0 ^{sr} ,50
Beurre de cacao.....	2 gr.
2 ^o Euophène ou aristol.....	0 ^{sr} ,20
Beurre de cacao.....	2 gr.

On peut encore faire des onctions intra-anales avec :

1 ^o Extrait de ratanhia.....	1 gr.
Vaseline.....	15 —
2 ^o Chlorhydrate de cocaïne.....	0 ^{sr} ,20
Vaseline.....	10 gr.

Si ces moyens échouent, on aura recours à la dilatation forcée avec le doigt.

Fissures des lèvres (Voy. HYPERTROPHIE DE LA LÈVRE).

Fistules à l'anus.

S'abstenir en cas de tuberculose pulmonaire avancée. Faire une large incision de la peau et de la muqueuse

pour avoir une plaie à ciel ouvert qu'on panse à plat. Se servir du bistouri ou du thermocautère.

Quelques chirurgiens font une véritable excision et terminent par des sutures au catgut.

Folie.

Isolement, internement de l'enfant. S'il y a de la manie, du délire aigu, on prescrit les bains tièdes prolongés (trois à six heures), les purgatifs (deux par semaine), le chloral en potion ou en lavement, pour calmer et faire dormir le malade.

Puis douches, drap mouillé, grand air, exercice et jeux, promenades, distractions.

Fongus ombilical.

Lavage à l'eau bouillie boriquée, poudrage avec salol, aristol, traumatol, iodoforme, couche d'ouate et bande. S'il y a un granulome, il faut cautériser au nitrate d'argent. S'il y a un véritable adénome, c'est l'excision qu'il faut faire avec les précautions antiseptiques les plus rigoureuses.

Furoncles.

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Huile de morue, liqueur de Fowler (V à X gouttes), antiseptie intestinale, levure de bière (deux à trois cuillerées à café par jour dans l'eau ou la bière). S'abstenir d'aliments gras, épicés, de viande de porc, de gibier faisandé, de poissons de mer, de fromages faits, de vin pur.

TRAITEMENT LOCAL. — Faire des frictions avec un tampon d'ouate imbibé de benzine, d'éther, de teinture d'iode, d'alcool camphré. On a proposé des injections de II à III gouttes de liqueur de van Swieten pour stériliser le foyer. Les pulvérisations d'eau boriquée, ou phéniquée (1 p. 100) sont très recommandables.

On peut isoler chaque furoncle avec une rondelle d'emplâtre de Vigo ou d'emplâtre rouge de Vidal.

Si le furoncle est intra-nasal, faire priser de l'acide borique.

S'il est labial, facial, il faut le stériliser avec la pointe du thermocautère. Contre le furoncle du conduit auditif on introduira un suppositoire ainsi composé :

Cocaine.....	0 ^{sr} .02
Salol.....	0 ^{sr} .10
Beurre de cacao.....	1 gr.

Si le furoncle siège aux paupières (orgelet), on appliquera la pommade suivante, matin et soir :

Précipité jaune.....	0 ^{sr} .20
Vaseline.....	10 gr.

G

Gale.

Frictions tous les soirs avec :

Essence de menthe.....	1 gr.
Baume styrax liquide.....	20 —
Huile de camomille camphrée.....	100 —

Le lendemain matin, laver à l'eau tiède et poudrer avec amidon.

Onctions pendant huit à dix jours avec :

1 ^o Naphtol β.....	5 gr.
Vaseline.....	95 —
2 ^o Naphtol β.....	5 gr.
Craie préparée.....	10 —
Savon noir.....	40 —
Axonge.....	90 —

Les onctions avec le baume du Pérou sont très efficaces :

Baume du Pérou.....	} ãã 30 gr.
Glycérolé d'amidon.....	

On étend sur les parties malades et on enveloppe de linge.

Chez le nouveau-né, les onctions matin et soir avec l'onguent styrax mitigé sont suffisantes :

Onguent styrax.....	} ãã 20 gr.
Huile d'amandes douces.....	

C. Paul faisait savonner tous les jours avec :

Pétrole.....	30 gr.
Alcool à 90°.....	50 —
Cire.....	40 —
Savon de Marseille.....	100 —

Dans la seconde enfance, on peut donner des bains savonneux avec frotte et enduire avec la pommade soufrée :

Soufre sublimé.....	10 gr.
Carbonate de potasse.....	1 —
Huile d'amandes douces.....	} ãã 5 —
Eau.....	
Axonge.....	50 —

Les vêtements, draps, couvertures doivent être passés à l'étuve.

Gangrène de la bouche (Voy. NOMA).

Gangrène de la peau.

Panser à sec avec les poudres d'iodoforme, salol, aristol, etc., bains de sublimé à 1 p. 10 000. Soutenir les forces par une bonne alimentation et des toniques (alcool, quinquina).

Gangrène pulmonaire.

Inhalations phéniquées ou térébenthinées, oxygénées, eucalyptées :

Essence d'eucalyptus.....	10 gr.
Eau.....	50 —