

On peut isoler chaque furoncle avec une rondelle d'emplâtre de Vigo ou d'emplâtre rouge de Vidal.

Si le furoncle est intra-nasal, faire priser de l'acide borique.

S'il est labial, facial, il faut le stériliser avec la pointe du thermocautère. Contre le furoncle du conduit auditif on introduira un suppositoire ainsi composé :

Cocaine.....	08 ^r .02
Salol.....	08 ^r .10
Beurre de cacao.....	1 gr.

Si le furoncle siège aux paupières (orgelet), on appliquera la pommade suivante, matin et soir :

Précipité jaune.....	08 ^r .20
Vaseline.....	10 gr.

G

Gale.

Frictions tous les soirs avec :

Essence de menthe.....	1 gr.
Baume styrax liquide.....	20 —
Huile de camomille camphrée.....	100 —

Le lendemain matin, laver à l'eau tiède et poudrer avec amidon.

Onctions pendant huit à dix jours avec :

1 ^o Naphtol β.....	5 gr.
Vaseline.....	95 —
2 ^o Naphtol β.....	5 gr.
Craie préparée.....	10 —
Savon noir.....	40 —
Axonge.....	90 —

Les onctions avec le baume du Pérou sont très efficaces :

Baume du Pérou.....	} ãã 30 gr.
Glycérolé d'amidon.....	

On étend sur les parties malades et on enveloppe de linge.

Chez le nouveau-né, les onctions matin et soir avec l'onguent styrax mitigé sont suffisantes :

Onguent styrax.....	} ãã 20 gr.
Huile d'amandes douces.....	

C. Paul faisait savonner tous les jours avec :

Pétrole.....	30 gr.
Alcool à 90°.....	50 —
Cire.....	40 —
Savon de Marseille.....	100 —

Dans la seconde enfance, on peut donner des bains savonneux avec frotte et enduire avec la pommade soufrée :

Soufre sublimé.....	10 gr.
Carbonate de potasse.....	1 —
Huile d'amandes douces.....	} ãã 5 —
Eau.....	
Axonge.....	50 —

Les vêtements, draps, couvertures doivent être passés à l'étuve.

Gangrène de la bouche (Voy. NOMA).

Gangrène de la peau.

Panser à sec avec les poudres d'iodoforme, salol, aristol, etc., bains de sublimé à 1 p. 10 000. Soutenir les forces par une bonne alimentation et des toniques (alcool, quinquina).

Gangrène pulmonaire.

Inhalations phéniquées ou térébenthinées, oxygénées, eucalyptées :

Essence d'eucalyptus.....	10 gr.
Eau.....	50 —

Pulvérisations créosotées.

On fera prendre à l'intérieur la teinture d'eucalyptus :

1° Teinture d'eucalyptus.....	2 gr.
Sirop de quinquina.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 20 —
— de térébenthine.....	
Eau de cannelle.....	10 —
— de menthe.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 30 —
— de fleurs d'oranger.....	

Par cuillerées à dessert d'heure en heure.

2° Teinture d'eucalyptus.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 2 gr.
— de cannelle.....	
Sirop de quinquina.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 25 —
— de fleurs d'oranger.....	
Hydrolat de tilleul.....	100 —

Lancereaux recommande l'hyposulfite de soude :

Hyposulfite de soude.....	2 gr.
Sirop d'eucalyptus.....	20 —
Julep gommeux.....	100 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

Dans les bronchites fétides, Toupet, outre la potion à l'hyposulfite de soude, recommande les inhalations d'oxygène et les injections sous-cutanées de :

Eucalyptol.....	1 gr.
Huile d'olives stérilisée.....	10 cent. cub.

Faire une à trois injections de 1 centimètre cube par jour.

Weill et Diamantberger conseillent :

1° Injections quotidiennes dans la fesse, d'une seringue de Pravaz de :

Gaïacol cristallisé.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 10 gr.
Huile d'amandes douces stérilisée à 120°.....	
Chlorhydrate de cocaïne.....	0 ^{sr} ,20

2° Le soir, lavement évacuateur avec 500 grammes d'eau boriquée suivi d'un lavement à garder avec un demi-verre de lait tiède, XX gouttes d'huile gaïacolée et VI à VIII gouttes de laudanum.

3° Badigeonnages sur la poitrine avec la même huile gaïacolée.

4° Frictions avec eau alcoolisée sur les parties non badigeonnées.

Quand il y a un foyer pleural ou intra-pulmonaire, il faut le traiter chirurgicalement.

Gangrène symétrique.

Réchauffer les parties (gants fourrés), électriser, oxygéner (bains d'oxygène) et faire prendre à l'intérieur :

Ergotine.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 0 ^{sr} ,05
Sulfate de quinine.....	
Excipient avec glycérine.....	Q. S.

Pour une pilule; en prendre trois par jour.

S'il y a des plaies, poudrer avec iodoforme ou aristol. Les simples érosions seront pansées avec l'emplâtre de Vigo ou le diachylon.

Gangrène vulvaire.

Traiter énergiquement avec thermo-cautère et panser à l'iodoforme ou avec :

Poudre de charbon.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$
— de quinquina.....	
— de salol.....	

Faire des lotions au permanganate de potasse (1 p. 500) et recouvrir de compresses imbibées de cette solution.

Traitement général tonique et reconstituant. La prophylaxie consiste à tenir la vulve propre dans les fièvres éruptives, adynamiques, etc.

Gastralgie.

Régime des dyspeptiques, eau de Vichy ou de Vals.

Au moment des douleurs, donner I à II gouttes de laudanum ou V à X gouttes de :

Teinture de belladone.....	} aa 2 gr.
— de colombo.....	
— d'arnica.....	
Elixir parégorique.....	

Vésicatoires volants au creux épigastrique.

Glaucome.

Sclérotomie et ponction fine pour diminuer la tension oculaire : bicarbonate de soude ou salicylate de soude chez les arthritiques, ou benzoate de lithine.

Goitre et thyroïdites.

Tous les huit jours, injections de 1/4 ou 1/2 centimètre cube de teinture d'iode pure (Luton, Duguet). Dans un cas de goitre congénital, le traitement thyroïdien de la nourrice a été efficace (Mossé et Cathala). Quand la thyroïdite a abouti au myxoedème, le traitement thyroïdien de l'enfant est indiqué.

Goitre exophtalmique.

Douches froides ou douches écossaises, massage et frictions, courants galvaniques, arsenic, atropine, extrait d'ergot, sulfate de quinine. L'iodure de strontium et le bromure de strontium (25 à 50 centigr., 3 fois par jour pendant un mois, puis suspension, reprises, etc.), ont donné des succès à Lockhart Gillespie :

Bromure de strontium.....	} aa	18 ^g ,50
Iodure de strontium.....		
Sirop d'écorces d'oranges.....		30 gr.
Eau.....		120 —

Une cuillerée à dessert trois fois par jour.

Gommes.

Les gommes syphilitiques se traitent par l'iodure de potassium. Les gommes tuberculeuses suppurées se traitent par la ponction évacuatrice suivie d'injection de naphтол camphréou de solution iodoformée.

Iodoforme.....	1 gr.
Glycérine.....	20 —

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Huile de morue, bains salés, cure maritime (Berck).

Gourme.

TRAITEMENT LOCAL. — Supprimer la phtiriasis si elle existe, panser les placards eczématiformes ou impétigineux avec la vaseline boriquée, les compresses imbibées d'eau d'Alibour, etc.

Traitement général, s'il y a lieu (lymphatisme, scrofula) : huile de morue, préparations iodées, eaux salines et arsenicales.

Grenouillette.

La ponction ne suffit pas, il faut faire l'extirpation du kyste salivaire pour avoir la guérison définitive.

Grippe.

Garder l'enfant au lit ou au moins à la chambre pendant huit ou dix jours, diète lactée. Donner un purgatif, un vomitif ou un éméto-cathartique :

1° Huile de ricin.....	10 à 15 gr.
A prendre en une fois le matin à jeun.	
2° Ipéca pulvérisé.....	08 ^g ,20
Tartre stibié.....	08 ^g ,01

Pour un paquet, n° 3 ; à prendre de dix en dix minutes le matin à jeun dans une cuillerée d'eau sucrée (enfant de cinq à six ans).

3° Sulfate de soude.....	20 gr.
Emétique.....	0sr,05
Sirop simple.....	10 gr.
Eau.....	250 —

A prendre le matin à jeun en trois ou quatre gorgées dans l'espace d'une heure (enfant de huit à dix ans).

S'il y a diarrhée fétide, donner les paquets suivants dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée :

Benzonaphтол.....	} àà 0sr,20
Salicylate de bismuth.....	
Phosphate de chaux tribasique.....	

Pour un paquet, n° 15; en prendre cinq par jour.

S'il y a de la fièvre, ne pas oublier la quinine en suppositoire ou en lavement :

1° Sulfate de quinine.....	0sr,25
Beurre de cacao.....	2 gr.

Pour un suppositoire, n° 4; un chaque soir.

2° Bichlorhydrate de quinine.....	0sr,25
Laudanum de Sydenham.....	1 goutte.
Eau distillée.....	50 gr.

Pour un lavement à garder.

Quand il y a de la céphalalgie, des courbatures, de l'agitation, on donnera l'antipyrine, la phénacétine, la salipyrine :

1° Antipyrine.....	1 gr.
Eau de laurier-cerise.....	2 —
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 —
Eau distillée.....	50 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

2° Phénacétine.....	0sr,25
---------------------	--------

Pour un paquet ou cachet; à prendre deux ou trois fois par jour dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée.

3° Salipyrine.....	0sr,25
--------------------	--------

Même mode d'emploi.

Alison a vanté le tanin qu'on peut donner en lavement :

Tanin.....	0sr,50
Décoction de guimauve.....	60 gr.

Pour un lavement à garder.

Pour les complications de la grippe, voir les articles *bronchite, conjonctivite, otite*. L'anémie et la faiblesse consécutives à la grippe seront traitées par l'huile de morue, les sirops reconstituants, le fer, etc. On peut, avant le repas, prescrire une cuillerée du mélange:

Sirop de gentiane.....	} àà 200 gr.
— de quinquina.....	
Teinture de noix vomique.....	} àà 1 —
— de colombo.....	
— de badiane.....	

Changement d'air, vie à la campagne.

H

Hématome du sterno-mastoïdien (Voy. TUMEURS DU STERNO-MASTOÏDIEN).

Hématomyélie.

Révlusion le long de la colonne vertébrale, pointes de feu, ventouses scarifiées, sachets de glace, etc. Calomel à doses fractionnées (1 à 2 centigr. 4 à 6 fois par jour), iodure de potassium, ergotine.

Hématurie.

Repos au lit, régime lacté, pas de vin ni viandes rouges. Injections de sérum artificiel, lavements et bains chauds. Dans l'hématurie essentielle, on peut prescrire l'essence de térébenthine (6 à 12 capsules suivant l'âge :