

| | |
|--------------------------|--------|
| 3° Sulfate de soude..... | 20 gr. |
| Emétique..... | 0sr,05 |
| Sirop simple..... | 10 gr. |
| Eau..... | 250 — |

A prendre le matin à jeun en trois ou quatre gorgées dans l'espace d'une heure (enfant de huit à dix ans).

S'il y a diarrhée fétide, donner les paquets suivants dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée :

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Benzonaphтол..... | } àà 0sr,20 |
| Salicylate de bismuth..... | |
| Phosphate de chaux tribasique..... | |

Pour un paquet, n° 15; en prendre cinq par jour.

S'il y a de la fièvre, ne pas oublier la quinine en suppositoire ou en lavement :

| | |
|----------------------------|--------|
| 1° Sulfate de quinine..... | 0sr,25 |
| Beurre de cacao..... | 2 gr. |

Pour un suppositoire, n° 4; un chaque soir.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 2° Bichlorhydrate de quinine..... | 0sr,25 |
| Laudanum de Sydenham..... | 1 goutte. |
| Eau distillée..... | 50 gr. |

Pour un lavement à garder.

Quand il y a de la céphalalgie, des courbatures, de l'agitation, on donnera l'antipyrine, la phénacétine, la salipyrine :

| | |
|--------------------------------|-------|
| 1° Antipyrine..... | 1 gr. |
| Eau de laurier-cerise..... | 2 — |
| Sirop de fleurs d'oranger..... | 20 — |
| Eau distillée..... | 50 — |

Par cuillerées de deux en deux heures.

| | |
|---------------------|--------|
| 2° Phénacétine..... | 0sr,25 |
|---------------------|--------|

Pour un paquet ou cachet; à prendre deux ou trois fois par jour dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée.

| | |
|--------------------|--------|
| 3° Salipyrine..... | 0sr,25 |
|--------------------|--------|

Même mode d'emploi.

Alison a vanté le tanin qu'on peut donner en lavement :

| | |
|----------------------------|--------|
| Tanin..... | 0sr,50 |
| Décoction de guimauve..... | 60 gr. |

Pour un lavement à garder.

Pour les complications de la grippe, voir les articles *bronchite*, *conjonctivite*, *otite*. L'anémie et la faiblesse consécutives à la grippe seront traitées par l'huile de morue, les sirops reconstituants, le fer, etc. On peut, avant le repas, prescrire une cuillerée du mélange:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Sirop de gentiane..... | } àà 200 gr. |
| — de quinquina..... | |
| Teinture de noix vomique..... | } àà 1 — |
| — de colombo..... | |
| — de badiane..... | |

Changement d'air, vie à la campagne.

H

Hématome du sterno-mastoïdien (Voy. TUMEURS DU STERNO-MASTOÏDIEN).

Hématomyélie.

Révlusion le long de la colonne vertébrale, pointes de feu, ventouses scarifiées, sachets de glace, etc. Calomel à doses fractionnées (1 à 2 centigr. 4 à 6 fois par jour), iodure de potassium, ergotine.

Hématurie.

Repos au lit, régime lacté, pas de vin ni viandes rouges. Injections de sérum artificiel, lavements et bains chauds. Dans l'hématurie essentielle, on peut prescrire l'essence de térébenthine (6 à 12 capsules suivant l'âge :

1 par année d'âge). Si la gravelle est soupçonnée, cure à Contrexéville. S'il y a impaludisme, quinine.

Hémiplégie spasmodique.

Au début, révulsifs, vésicatoire à la nuque et sur la tête, sangsues aux apophyses mastoïdes, vessie de glace. Plus tard électrisation, massage, frictions, gymnastique suédoise. En cas d'accès épileptiformes, bromure de potassium ou de camphre, chloral. Benedikt a fait l'élongation des nerfs (nerfs radial, cubital, médian). Dans un cas (Sonnenburg), la trépanation au niveau du sillon de Rolando permit d'extirper un kyste et de guérir le malade. La craniectomie (Lannelongue) peut aussi être tentée. Si la syphilis est soupçonnée, ne pas manquer de donner l'iode de potassium et le mercure.

Hémoglobinurie paroxystique.

Éviter les sorties par les temps froids et humides, couvrir les enfants de flanelle, au besoin les garder au lit. Pas de fatigue, pas de marches prolongées. Médicaments reconstituants et dépuratifs. Huile de morue, sirop iodé, iode de potassium, frictions mercurielles, quinine.

L'iode de potassium est le médicament qui nous a le mieux réussi :

| | |
|-------------------------------|---------|
| Iode de potassium..... | 15 gr. |
| Eau distillée..... | Q. S. |
| Sirop d'écorces d'orange..... | 300 gr. |

Par cuillerées à soupe deux ou trois fois par jour.

Dans quelques cas Contrexéville sera indiqué.

Hémophilie.

Éviter les traumatismes, ne pas employer le bistouri, faire des incisions au thermocautère, combattre éner-

giquement les moindres hémorragies : ergotine, gélatine à 5 p. 100, chlorure de calcium :

| | |
|--------------------------|-------|
| Chlorure de calcium..... | 2 gr. |
| Sirop simple..... | 20 — |
| Eau..... | 100 — |

Par cuillerées de deux en deux heures.

Fortifier l'enfant par l'huile de morue, le séjour à la campagne, l'air de la mer, les eaux chlorurées.

Hémoptysies.

Repos physique et moral absolu. Boissons glacées. Chez les enfants déjà grands, ne pas redouter la morphine en injection sous-cutanée (1 mill. par année d'âge). Donner les astringents et hémostatiques usités :

| | |
|------------------------------|-------|
| 1° Ergotine..... | 1 gr. |
| Sirop de ratanhia..... | 30 — |
| Eau distillée de menthe..... | 70 — |

Par cuillerées d'heure en heure.

On peut faire des injections sous-cutanées d'ergotine Yvon (1/2 à 1 cent. cube), ou de sérum gélatineux à 2 p. 100 (25, 50, 100 grammes).

2° Teinture de Bestucheff (X à XV gouttes dans l'eau sucrée) :

| | |
|-----------------------------|-------|
| Liquore de Hoffmann..... | 7 gr. |
| Perchlorure de fer sec..... | 1 — |

3° Pulvérisations de perchlorure de fer.

| | |
|------------------------|-------------|
| 4° Sirop diacodé..... | } ãã 10 gr. |
| — de cachou..... | |
| — de térébenthine..... | |
| Eau distillée..... | 20 — |
| | 100 — |

Par cuillerées de deux en deux heures.

5° Prendre par jour deux ou trois pilules contenant :

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Ergotine..... | 0 ^{gr} ,10 |
| Sulfate de quinine..... | 0 ^{gr} ,05 |
| Excipient avec glycérine..... | Q. S. |

Pour une pilule, n° 15.

6° La poudre d'ipéca à dose très forte (1 à 2 gr. à la fois), ou fractionnée et nauséuse (5 centigr. toutes les heures) est parfois efficace.

7° La digitale est aussi un bon médicament qui, en fortifiant et ralentissant les battements du cœur, agira indirectement sur l'hémoptysie.

Cure d'air au repos, alimentation, saison au Mont-Dore.

Hémorragie cérébrale.

Lavement purgatif, sangsues derrière les oreilles, frictions temporales avec l'onguent napolitain, puis iodure de potassium. Plus tard, faire la rééducation des mouvements, le massage, la mécanothérapie.

Hémorragies méningées.

Respiration artificielle et insufflation chez le nouveau-né. Glace sur la tête, sangsues aux apophyses mastoïdes, vésicatoire à la nuque. Lavement purgatif, potion calmante (bromure et chloral). Onguent napolitain belladonné sur la tête.

Hémorragies vulvaires.

Nettoyage à l'eau bouillie boriquée, cautérisation au nitrate d'argent du bourgeon saignant; au besoin, excision du prolapsus urétral qui est souvent la cause de la vulvorrhagie.

Herpès circiné.

Badigeonnages à la teinture d'iode tous les jours, ou onctions avec :

| | |
|--------------------------|-------|
| 1° Soufre précipité..... | 2 gr. |
| Vaseline..... | 20 — |
| 2° Turbith minéral..... | 1 gr. |
| Glycérolé d'amidon..... | 30 — |

Herpès facial.

Pansement avec vaséline simple, boriquée, ou avec :

| | | |
|----------------------------|------|--------|
| Salicylate de bismuth..... | } aa | 10 gr. |
| Oxyde de zinc..... | | |
| Glycérine..... | | |

Herpès zoster (Voy. ZONA).

Hoquet.

Boire lentement, croquer un morceau de sucre imbibé de vinaigre, prendre quelques gouttes de valériane d'ammoniaque dans l'eau sucrée. Compression du phrénique gauche au cou pendant une à trois minutes.

Injection de pilocarpine (solution à 1 p. 100 : V à X gouttes). Potion avec :

| | |
|----------------------|-------------|
| Sirop diacode..... | 20 gr. |
| Chloroforme..... | XX gouttes. |
| Sirop de menthe..... | 10 gr. |
| Huile d'amandes..... | 60 — |

Par cuillerées à café jusqu'à effet.

Hydrocèle vaginale.

L'hydrocèle simple guérit généralement toute seule; celle qui est enkystée doit être opérée. Pulvérisations d'éther avec un appareil de Richardson tous les huit jours. Ponction simple, injection de quelques gouttes d'alcool à 60° ou de teinture d'iode :

| | |
|--------------------------|--------|
| Teinture d'iode..... | 10 gr. |
| Iodure de potassium..... | 1 — |
| Eau distillée..... | 20 — |

Hydrocéphalie.

Traitement mixte : frictions mercurielles, iodure de potassium. Ponctions lombaires répétées tous les huit

ou quinze jours. Ponction directe des ventricules cérébraux avec ou sans trépanation.

Hydronéphrose.

En cas de rein mobile, néphrorraphie. En cas d'aboutissement anormal de l'uretère, la chirurgie peut encore intervenir. La ponction n'est que palliative. Schattaer a pratiqué l'extirpation avec succès.

Hydropéricarde.

Traitement général de l'anasarque: lait, diurétiques, digitale. Traitement local par la ponction aspiratrice quand l'épanchement est très abondant.

Hydrothorax.

Purgatifs, diurétiques, régime lacté, digitale. Ventouses sèches, badigeonnages de teinture d'iode, cataplasmes sinapisés. Ponction quand les moyens précédents auront échoué.

Hypéridrose.

Comme traitement général, astringents et toniques vasculaires :

| | | |
|--------------------------------|------|--------|
| Bichlorhydrate de quinine..... | } ãã | 0sr,10 |
| Poudre d'ergot..... | | |
| — de digitale..... | } ãã | 0sr,01 |
| — de noix vomique..... | | |

Pour un paquet ou cachet; deux par jour pendant dix jours, puis suspension égale et reprise.

Laver tous les jours les pieds avec l'une ou l'autre de ces solutions :

| | |
|-------------------|-------|
| 1° Naphtol g..... | 5 gr. |
| Glycérine..... | 20 — |
| Alcool à 60°..... | 200 — |

| | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| 2° Tanin..... | 5 gr. | |
| Eau-de-vie camphrée..... | 200 — | |
| 3° Permanganate de potasse..... | } ãã | 1 gr. |
| Thymol..... | | |
| Alcool à 60°..... | 20 — | |
| Eau distillée..... | 200 — | |

Frictions avec une pommade salicylée à 1 p. 50.
On peut saupoudrer l'intérieur des bas ou chaussettes avec :

| | | |
|------------------------|-------|------|
| Acide salicylique..... | 2 gr. | |
| — borique..... | 10 — | |
| Talc..... | } ãã | 50 — |
| Amidon..... | | |

Hypermétropie.

Verres convexes.

Hypertrophie congénitale.

Massage, compression élastique, courants continus. Elongation du nerf sciatique dans un cas. Amputation dans des cas exceptionnels (fragment de membre gênant par son volume).

Hypertrophie du cerveau.

Iodure de potassium pendant quinze jours par mois, frictions mercurielles. Education spéciale (médico-pédagogie).

Hypertrophie du cœur.

Iodure et bromure de potassium, drap mouillé, affusions froides, grand air, repos, régime lacté.

| | | |
|--------------------------------|---------|-------|
| Bromure de potassium..... | } ãã | 5 gr. |
| Iodure de potassium..... | | |
| Eau distillée..... | Q. S. | |
| Sirop d'écorces d'oranges..... | 200 gr. | |

Une cuillerée à dessert matin et soir.

Hypertrophie des lèvres.

Compression permanente ou répétée, massage. Onctions avec la pommade boriquée ou à l'oxyde de zinc (1 p. 10). S'il y a des fissures, vaseline ou cold-cream. On fait aussi des onctions ou lotions avec :

| | |
|---------------------------|------------|
| 1° Tanin..... | 10 gr. |
| Essence de menthe..... | V gouttes. |
| Glycérolé d'amidon..... | 50 gr. |
| 2° Biborate de soude..... | 3 gr. |
| Glycérine..... | 30 — |
| Eau de roses..... | 100 — |

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Huile de morue, sirop iodotannique, iodure de potassium, arsenic :

| | |
|-------------------------|---------|
| Arséniate de soude..... | 0,57,05 |
| Eau distillée..... | 150 gr. |

Une cuillerée à café matin et soir pendant quinze jours tous les mois.

Cure à la Bourboule ou à Uriage.

Hystérie.

Isoler l'enfant, bonne hygiène, eau froide (drap mouillé, affusions froides), électricité statique. Suggestion à l'état de veille.

Cures à Bagnères-de-Bigorre, Divonne, Néris, Ratz, etc. Vie à la campagne, exercices physiques.

Pas de boissons alcooliques.

I**Ichtyose.**

Bains émollients prolongés (100 gr. de glycérine, son,

amidon). Frictions quotidiennes au savon noir, au glycérolé tartrique, etc. :

| | |
|------------------------------------|--------|
| 1° Acide tartrique..... | 1 gr. |
| Glycérolé d'amidon..... | 40 — |
| 2° Goudron..... | 20 gr. |
| Axonge benzoinée..... | 50 — |
| 3° Hydrolat de laurier-cerise..... | 5 gr. |
| Glycéré d'amidon..... | 50 — |

On fait deux onctions par jour, puis une par jour ; puis deux, puis une par semaine.

Cures thermales : la Bourboule, Challes, Barèges, Luchon, Saint-Gervais, Uriage.

TRAITEMENT RECONSTITUANT. — Huile de morue, exercices au grand air, alimentation choisie. Dans quelques cas, on s'est bien trouvé du traitement thyroïdien.

Ichtyose fœtale.

Couveuse à 32° ou 35°, gavage, bains de sublimé à 1 p. 10000.

Ichtyose des nouveau-nés.

Bon allaitement, bains alcalins (50 à 100 gr. de carbonate de soude), eau de Vichy ou de Vals (une cuillerée à café avant la tétée). Frictions sur l'hypocondre droit avec :

| | |
|---------------------------|-------|
| Iodure de potassium..... | 2 gr. |
| Bicarbonate de soude..... | 5 — |
| Lanoline..... | 10 — |
| Vaseline..... | 20 — |

Penser à la syphilis et donner des frictions mercurielles, des bains de sublimé à 1 p. 10000.

Isoler les enfants atteints d'ictère infectieux et épidémique.