

Hypertrophie des lèvres.

Compression permanente ou répétée, massage. Onctions avec la pommade boriquée ou à l'oxyde de zinc (1 p. 10). S'il y a des fissures, vaseline ou cold-cream. On fait aussi des onctions ou lotions avec :

1° Tanin.....	10 gr.
Essence de menthe.....	V gouttes.
Glycérolé d'amidon.....	50 gr.
2° Biborate de soude.....	3 gr.
Glycérine.....	30 —
Eau de roses.....	100 —

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Huile de morue, sirop iodotannique, iodure de potassium, arsenic :

Arséniate de soude.....	087,05
Eau distillée.....	150 gr.

Une cuillerée à café matin et soir pendant quinze jours tous les mois.

Cure à la Bourboule ou à Uriage.

Hystérie.

Isoler l'enfant, bonne hygiène, eau froide (drap mouillé, affusions froides), électricité statique. Suggestion à l'état de veille.

Cures à Bagnères-de-Bigorre, Divonne, Néris, Ratz, etc. Vie à la campagne, exercices physiques.

Pas de boissons alcooliques.

I**Ichtyose.**

Bains émollients prolongés (100 gr. de glycérine, son,

amidon). Frictions quotidiennes au savon noir, au glycérolé tartrique, etc. :

1° Acide tartrique.....	1 gr.
Glycérolé d'amidon.....	40 —
2° Goudron.....	20 gr.
Axonge benzoinée.....	50 —
3° Hydrolat de laurier-cerise.....	5 gr.
Glycéré d'amidon.....	50 —

On fait deux onctions par jour, puis une par jour ; puis deux, puis une par semaine.

Cures thermales : la Bourboule, Challes, Barèges, Luchon, Saint-Gervais, Uriage.

TRAITEMENT RECONSTITUANT. — Huile de morue, exercices au grand air, alimentation choisie. Dans quelques cas, on s'est bien trouvé du traitement thyroïdien.

Ichtyose fœtale.

Couveuse à 32° ou 35°, gavage, bains de sublimé à 1 p. 10000.

Ichtyose des nouveau-nés.

Bon allaitement, bains alcalins (50 à 100 gr. de carbonate de soude), eau de Vichy ou de Vals (une cuillerée à café avant la tétée). Frictions sur l'hypocondre droit avec :

Iodure de potassium.....	2 gr.
Bicarbonate de soude.....	5 —
Lanoline.....	10 —
Vaseline.....	20 —

Penser à la syphilis et donner des frictions mercurielles, des bains de sublimé à 1 p. 10000.

Isoler les enfants atteints d'ictère infectieux et épidémique.

Ictère de la deuxième enfance.

Purgatif ou éméto-cathartique :

1° Poudre de scammonée.....	} aa	ost,25
— d'ipéca.....		

Pour un paquet, n° 2. Prendre à dix minutes d'intervalle dans une cuillerée d'eau sucrée.

2° Citrate de magnésie.....	20 gr.
Sirop de groscilles.....	30 —
Eau.....	150 —

A prendre en une ou deux fois le matin à jeun.

Grands lavements d'eau bouillie, matin et soir. Grands bains alcalins.

Diète lactée. Antisepsie intestinale :

Benzonaphtol.....	ost,25
Magnésie calcinée.....	ost,20
Bicarbonate de soude.....	ost,15

Pour un paquet, n° 15; en prendre quatre à cinq par jour.

En cas d'ictère chronique ou à répétition, conseiller une cure à Vichy ou à Pougues.

Ictère à rechute.

Diète lactée, lavages de l'intestin, antisepsie intestinale, bains frais (25 à 20°) s'il y a hyperthermie.

Ictère grave.

Calomel à doses fractionnées (2 centigr. toutes les deux heures), inhalations d'oxygène, injections de sérum artificiel, de caféine, de spartéine, bains chauds (38°), régime lacté.

Idiotie.

Outre le traitement chirurgical applicable à des cas exceptionnels (Lannelongue, *craniectomie*), on fait surtout le traitement médico-pédagogique dans des maisons spéciales.

Impétigo.

Faire d'abord tomber les croûtes avec des cataplasmes d'amidon refroidis, ou des pulvérisations chaudes. Puis onctions matin et soir avec :

1° Acide borique.....	4 gr.
Vaseline.....	30 —
2° Salol.....	3 gr.
Vaseline.....	30 —
3° Oléo-stéarate de cuivre.....	1 gr.
Axonge benzoïnée.....	40 —
4° Acide borique.....	1 gr.
Onguent de Vigo.....	5 —
Vaseline.....	30 —

Étendre sur un linge fin et appliquer comme un emplâtre.

Dans l'impétigo étendu de la tête et de la face, les compresses imbibées d'eau d'Alibour à 1 p. 3 ou 1 p. 2 sont très efficaces (Renouveler le pansement tous les trois jours).

Les placards isolés seront traités avec avantage par l'occlusion avec emplâtre de Vigo, ou diachylon.

Couper les cheveux et faire disparaître les poux quand il y en a.

Incontinence d'urine.

S'assurer d'abord qu'il n'y a pas de cause d'irritation : phimosis, adhérences préputiales, adhérences clitoridiennes. Dans ce cas, le traitement chirurgical peut être suivi d'un succès immédiat.

Hygiène thérapeutique. — Boire peu surtout le soir, pas d'alcool; garder les urines le plus longtemps possible le jour pour accroître la tolérance de la vessie; décubitus dorsal, le bassin plus élevé que la tête.

Hydrothérapie, eau froide, bains de mer, eaux chlo-

urées sodiques, Contrexéville, Vichy (si l'enfant est ricémique).

Hygiène morale, pas de réprimandes, grande indulgence.

TRAITEMENT. — Tous les soirs, une pilule de 1 centigramme d'extrait de belladone, puis 2 centigrammes et ainsi de suite jusqu'à 10 ou 15 centigrammes (Trousseau).

Sulfate d'atropine.....	08r,01
Eau distillée.....	10 gr.

Prendre le soir X gouttes de cette solution, augmenter tous les soirs d'une goutte jusqu'à concurrence de XX ou XXX, suivant l'âge.

L'antipyrine, donnée le soir (2 à 3 gr.) en deux ou trois doses, à une heure d'intervalle, est très efficace.

La strychnine se donne comme l'atropine; on peut aller jusqu'à 1 milligramme de sulfate de strychnine par année d'âge; mais il faut suspendre la médication au bout de dix jours.

L'extrait fluide de *Rhus aromaticus* se donne aux doses de V, X, XV, XX, XXV, XXX gouttes. Saint-Philippe donne le *Rhus radicans*, V à XX gouttes de teinture matin et soir; on peut aller à LX gouttes au-dessus de six ans.

L'électrisation du col de la vessie (Guyon) avec les courants faradiques a donné des succès nombreux.

Enfin Liébeault a vanté la suggestion.

Indigestion.

Vomitif en cas de gêne considérable sans évacuations spontanées. Parfois la simple ingestion d'eau chaude, de thé léger suffira. S'il s'est écoulé plusieurs heures depuis le repas, on appliquera sur le ventre un grand cataplasme chaud de farine de graines de lin, on fera des frictions avec l'huile de camomille chaude, on mettra des bottes d'ouate, on donnera un purgatif (huile de ricin, 10 à 20 gr.).

En cas de selles fétides, faire les jours suivants de l'antisepsie intestinale :

Benzonâptol.....	} ãã	08r,20
Sous-nitrate de bismuth.....		

Pour un paquet quatre à cinq par jour.

Quand l'indigestion est incomplète, on peut favoriser le passage des aliments en donnant du thé ou une infusion comme la suivante :

Fleurs de tilleul.....	} ãã	1 gr.
Feuilles d'oranger.....		
Sirop d'anis.....		30 —
Eau.....		150 —

Infarctus uriques (Voy. LITHIASE RÉNALE et SPASME DE LA VESSIE).

Influenza (Voy. GRIPPE).

Insomnie.

Régulariser les repas, interdire l'abus des boissons, l'usage du vin, du café, etc. Grande sobriété, surtout le soir. Agir sur le système nerveux par la vie au grand air, par l'hydrothérapie (drap mouillé, affusions froides). Combattre la constipation par les lavements glycélinés ou les suppositoires à la glycérine. S'il y a beaucoup d'excitation, on peut prescrire les calmants et hypnotiques usités :

1° Sirop de codéine.....	5 gr.
Eau distillée de tilleul.....	60 —

Prendre le soir en se couchant (enfant de quatre à cinq ans).

2° Bromure de potassium.....	08r,40	
Hydrate de chloral.....	08r,20	
Eau distillée.....	} ãã	30 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....		

Même usage.

FAC. DE MED. U. A. N. L.
BIBLIOTECA

3^o Prendre le soir en se couchant d'heure en heure, jusqu'à effet, une cuillerée à café de bromidia ou d'une formule analogue :

Bromure de potassium.....	} ãã	3 gr.
Hydrate de chloral.....		
Extrait de jusquiame.....	} ãã	0 ^{sr} ,05
— de chanvre indien.....		
Eau de tilleul.....		60 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....		30 —

4^o Prendre le soir, dans une cuillerée d'eau sucrée, un paquet contenant :

Sulfonal ou trional.....	0 ^{sr} ,25
--------------------------	---------------------

Boire immédiatement après une tasse de thé ou tilleul chaud. Répéter la dose une heure après en cas d'insuccès.

On peut donner les lavements ou suppositoires suivants :

1 ^o Bromure de potassium.....	0 ^{sr} ,50
Chloral.....	0 ^{sr} ,15
Jaune d'œuf.....	N ^o 1.
Eau de laitue.....	60 gr.
2 ^o Antipyrine.....	0 ^{sr} ,50
Eau distillée.....	50 ^o gr.

Pour un lavement à garder.

3 ^o Racine de valériane.....	10 gr.
Infuser dans eau.....	100 —
Passer et ajouter asa fœtida.....	1 —
Jaune d'œuf.....	N ^o 1.

Pour un lavement à garder.

4 ^o Hydrate de chloral.....	0 ^{sr} ,25
Beurre de cacao.....	2 gr.
5 ^o Trional ou sulfonal.....	0 ^{sr} ,30
Beurre de cacao.....	2 gr.

On donnera la quinine si l'enfant se trouve dans un pays à endémie palustre.

S'il est syphilitique, le meilleur traitement de l'in-

somnie sera le traitement par les frictions mercurielles et par l'iodure de potassium.

Intertrigo (Voy. ÉRYTHÈME).

Intagination intestinale.

Les purgatifs sont à rejeter absolument ; les grands lavements, les injections gazeuses peuvent réussir, mais on ne doit pas en abuser. Il faut distendre l'intestin progressivement et avec douceur. On a eu quelques succès également avec le *lavement électrique* : injection d'eau salée dans le rectum, sonde munie d'un mandrin métallique enfoncée jusqu'à l'S iliaque ; le mandrin communique avec le pôle positif d'une pile à courants continus, le pôle négatif étant appliqué sur le ventre (durée dix minutes. — Boudet de Paris).

Bucquoy a préconisé la faradisation, une électrode placée dans le rectum, l'autre sur le ventre.

On a aussi pratiqué le lavage de l'estomac.

Mais il ne faut pas s'obstiner dans ce traitement médical trop souvent malheureux.

Le traitement de choix est la *laparotomie*, qui réussit d'autant mieux qu'elle est plus précoce. Après avoir ouvert le ventre sur la ligne médiane, on cherche le boudin et on le réduit ; s'il est irréductible ou gangrené, on le résèque ; dans quelques cas on se borne à faire un anus artificiel.

K

Kératites.

En cas de syphilis, traitement par l'iodure et le mercure (kératite interstitielle) ; s'il n'y a que de la scrofulose, huile de morue, sirop antiscorbutique, cure saline ou sulfureuse (Luchon, Saint-Christau).