

3° Prendre le soir en se couchant d'heure en heure, jusqu'à effet, une cuillerée à café de bromidia ou d'une formule analogue :

Bromure de potassium.....	} ãã	3 gr.
Hydrate de chloral.....		
Extrait de jusquiame.....	} ãã	0gr,05
— de chanvre indien.....		
Eau de tilleul.....		60 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....		30 —

4° Prendre le soir, dans une cuillerée d'eau sucrée, un paquet contenant :

Sulfonal ou trional.....	0gr,25
--------------------------	--------

Boire immédiatement après une tasse de thé ou tilleul chaud. Répéter la dose une heure après en cas d'insuccès.

On peut donner les lavements ou suppositoires suivants :

1° Bromure de potassium.....	0gr,50
Chloral.....	0gr,15
Jaune d'œuf.....	N° 1.
Eau de laitue.....	60 gr.
2° Antipyrine.....	0gr,50
Eau distillée.....	50 gr.

Pour un lavement à garder.

3° Racine de valériane.....	10 gr.
Infuser dans eau.....	100 —
Passer et ajouter asa fœtida.....	1 —
Jaune d'œuf.....	N° 1.

Pour un lavement à garder.

4° Hydrate de chloral.....	0gr,25
Beurre de cacao.....	2 gr.
5° Trional ou sulfonal.....	0gr,30
Beurre de cacao.....	2 gr.

On donnera la quinine si l'enfant se trouve dans un pays à endémie palustre.

S'il est syphilitique, le meilleur traitement de l'in-

somnie sera le traitement par les frictions mercurielles et par l'iodure de potassium.

### Intertrigo (Voy. ÉRYTHÈME).

#### Intagination intestinale.

Les purgatifs sont à rejeter absolument ; les grands lavements, les injections gazeuses peuvent réussir, mais on ne doit pas en abuser. Il faut distendre l'intestin progressivement et avec douceur. On a eu quelques succès également avec le *lavement électrique* : injection d'eau salée dans le rectum, sonde munie d'un mandrin métallique enfoncée jusqu'à l'S iliaque ; le mandrin communique avec le pôle positif d'une pile à courants continus, le pôle négatif étant appliqué sur le ventre (durée dix minutes. — Boudet de Paris).

Bucquoy a préconisé la faradisation, une électrode placée dans le rectum, l'autre sur le ventre.

On a aussi pratiqué le lavage de l'estomac.

Mais il ne faut pas s'obstiner dans ce traitement médical trop souvent malheureux.

Le traitement de choix est la *laparotomie*, qui réussit d'autant mieux qu'elle est plus précoce. Après avoir ouvert le ventre sur la ligne médiane, on cherche le boudin et on le réduit ; s'il est irréductible ou gangrené, on le résèque ; dans quelques cas on se borne à faire un anus artificiel.

## K

### Kératites.

En cas de syphilis, traitement par l'iodure et le mercure (kératite interstitielle) ; s'il n'y a que de la scrofulé, huile de morue, sirop antiscorbutique, cure saline ou sulfureuse (Luchon, Saint-Christau).

Porter des verres fumés ou un bandeau noir, ou une large visière. Instiller matin et soir, dans l'œil malade, I ou II gouttes du collyre suivant :

Sulfate d'atropine.....	0 <sup>gr</sup> ,02
Eau distillée.....	5 gr.

En cas d'ulcère de la cornée, et si l'on craint la perforation, préférer le collyre suivant :

Sulfate d'ésérine.....	0 <sup>gr</sup> ,02
Eau distillée.....	5 gr.

Puis on touche le foyer et on badigeonne le bord ciliaire des paupières avec la pommade suivante :

Précipité jaune.....	0 <sup>gr</sup> ,20
Vaseline blanche.....	10 gr.

Soigner les fosses nasales, traiter les coryzas qui souvent préudent aux kératites et kérato-conjonctivites.

#### Kératodermie symétrique.

Traitement palliatif par les bains prolongés, les enveloppements humides, les gants de caoutchouc, les onctions au savon noir.

Ballantyne badigeonne avec :

Acide salicylique.....	1 gr.
Ether.....	20 —

Éviter les pressions, les marches forcées, les travaux manuels. Faire une cure à Luchon, Uriage, Saint-Gervais.

#### Kérion.

Curetage de la lésion ou simplement badigeonnages répétés avec la teinture d'iode. J'ai pour habitude de traiter cette variété de tricophytie par l'emplâtre de Vigo laissé en permanence.

#### Kystes congénitaux.

Ponction insuffisante, reproduction fatale du liquide; danger des injections de teinture d'iode, des drainages, des incisions. Préférer l'extirpation complète quand elle est possible.

L'électrolyse a donné une amélioration entre les mains de M. Lannelongue.

#### Kystes de l'ovaire.

Ponction exploratrice, puis laparotomie et excision de la tumeur. Des cas d'ovariotomie suivis de guérison ont été publiés par Hue (fille de deux ans), par d'Arcy Power (fille de quatre mois), etc.

#### Kystes hydatiques du foie.

On a préconisé le traitement interne par l'iode et l'iodure de potassium; mais il ne faut pas y compter. Le traitement de choix est le traitement chirurgical.

On peut faire une ponction évacuatrice dans les conditions d'antisepsie requises, en la faisant suivre d'une injection de liqueur de van Swieten (petite quantité : 5 à 10 gr.).

Pavy a conseillé l'injection suivante :

Extrait mou de fougère mâle.....	} ãã	2 gr.
Liquueur de potasse.....		
Eau distillée.....		24 —

La ponction simple suivie de repos absolu au lit avec compression ouatée de l'abdomen a pu donner des succès; mais en suivant longtemps les malades on constate souvent des récidives. En cas de suppuration, il faut faire la laparotomie, que les chirurgiens préconisent pour la plupart, même dans les kystes simples.

**Kystes hydatiques du poumon.**

Il n'y a pas de traitement médical de cette affection; la ponction exploratrice ayant révélé la nature du kyste, on fera la pleurotomie avec résection costale, on évacuera le liquide et on réséquera la poche. Drainage et pansement antiseptique.

**L****Laryngite aiguë.**

Au début, vomitif, bottes d'ouate, bains de pieds sinapisés. Puis, antispasmodiques :

Teinture de belladone.....	} aa 2 gr.
Alcoolature de racines d'aconit.....	

En prendre V à X gouttes matin et soir, suivant l'âge.

Prendre dans l'intervalle des infusions béchiques (violette, capillaire, bourrache, etc.), édulcorées avec sirop de tolu, de gomme, etc.

Si la toux persiste, donner les expectorants :

1° Oxyde blanc d'antimoine.....	1 gr.
Sirop de codéine.....	5 —
Julep gommeux.....	60 —

Par cuillerées à dessert de deux en deux heures.

2° Kermès minéral.....	0gr,10
Looch blanc.....	60 gr.

Même mode d'emploi.

Pastilles d'ipéca ou de kermès (trois à six par jour). Pulvérisations de la bouche et de la gorge avec eau sulfureuse ou eau boriquée.

**Laryngite chronique.**

En cas de syphilis, traitement mixte par le mercure et l'iode de potassium. Si la scrofule est en cause,

huile de morue, eaux sulfureuses, Mont-Dore; pulvérisations à vapeur avec les eaux d'Enghien, Labassère, Challes, Eaux-Bonnes.

Badigeonnages intra-laryngiens ou instillations avec :

1° Créosote pure.....	1 gr.
Alcool à 60°.....	4 —
Glycérine.....	60 —
2° Menthol.....	} aa 2 gr.
Camphre.....	
Huile.....	

Repos absolu de l'organe : ne pas chanter, ne pas parler à haute voix. Dans les cas très graves (phtisie laryngée, œdème de la glotte), la trachéotomie peut devenir nécessaire.

**Laryngite striduleuse.**

Bottes d'ouate, éponge chaude au devant du cou, vomitif; pas de vésicatoire.

Garder la chambre, prendre des boissons chaudes, une potion expectorante ou calmante :

1° Kermès.....	0gr,05
Julep gommeux.....	60 gr.
2° Bromure de potassium.....	1 gr.
Sirop de belladone.....	10 —
Eau distillée.....	} aa 30 —
Sirop d'écorces d'orange.....	

Par cuillerées à dessert de deux en deux heures.

3° Antipyrine.....	2 gr.
Sirop.....	60 —
Eau distillée.....	100 —

Une cuillerée à soupe tous les quarts d'heure (Sevestre).

Le maillot humide, le drap mouillé peuvent être essayés; parfois les bains chauds (36° à 38°) sont très efficaces. Ne pas oublier les pulvérisations à vapeur.