

Cures thermales à Bourbonne, Bourbon-l'Archambault, Évaux, Nérès, Barbotan, Préchacq, Saint-Amand, Dax.

Rougeole.

Diète liquide : lait, bourrache. Après la période fébrile, alimentation graduellement croissante : crèmes, potages, purées de légumes.

En cas de toux violente, vomitif, ventouses sèches, cataplasmes sinapisés, potion calmante :

Extrait de jusquiame.....	0 ^{sr} ,05
— de belladone.....	0 ^{sr} ,01
Sirop de Tolu.....	30 gr.
Eau.....	70 —

Par cuillerées à café d'heure en heure.

S'il y a congestion pulmonaire, menace de broncho-pneumonie, enveloppements froids du thorax, potion de Todd :

Cognac.....	20 gr.
Teinture de cannelle.....	2 —
Sirop de fleurs d'oranger.....	30 —
Eau distillée.....	60 —

Par cuillerées à dessert de deux en deux heures.

S'il y a de la dyspnée, bains chauds (38°), inhalations d'oxygène.

Pour favoriser l'éruption quand elle sort mal, on donnera :

1° Ammoniaque.....	X gouttes.
Sirop de fleurs d'oranger.....	50 gr.
Infusion de bourrache.....	950 —
2° Acétate d'ammoniaque.....	3 gr.
Alcoolat de cannelle.....	4 —
Julep gommeux.....	100 —

Par cuillerées à dessert de deux en deux heures.

3° Acétate d'ammoniaque.....	4 gr.
Sirop de punch.....	50 —
Eau distillée de tilleul.....	100 —

S'il y a ataxie, délire, hyperthermie, on donne les bains frais (30, 25, 20°) toutes les quatre heures, pendant cinq à dix minutes suivant la tolérance.

La quinine n'abat pas la fièvre, mais l'antipyrine, à la dose de 50 centigrammes à 1 gramme en une fois, donne une rémission très notable.

Le Dr Chatinière (de Saint-Mandé) a traité la rougeole par la lumière rouge (rideaux rouges aux fenêtres) et il a remarqué que l'éruption était très atténuée, la fièvre amoindrie, les complications prévenues par cette photothérapie.

Pour faire la prophylaxie des complications, il convient de nettoyer systématiquement la bouche, la gorge, les fosses nasales plusieurs fois par jour (pulvérisations, irrigations, gargarismes).

Nettoyer la vulve, les organes génitaux, les yeux, etc.

Pour préserver l'entourage, l'isolement ne suffit pas, car il est trop tardif, la rougeole étant contagieuse avant l'éruption. La quarantaine sera de quinze jours. La rougeole peut se transporter par des tiers, mais à courte distance. Inutile de désinfecter les locaux et les objets, la vitalité du germe de la rougeole en dehors du corps étant très éphémère.

Rubéole.

Traitement hygiénique : garder le lit, boire du lait, prendre une purgation, un bain savonneux à la fin de la maladie. Pour éviter la propagation, isoler l'enfant pendant quinze jours.

S

Sarcomes de l'intestin.

Il n'y a que le traitement chirurgical qui puisse offrir quelque chance de salut : extirpation, entéro-anastomose.

Scarlatine.

Hygiène thérapeutique. — Chambre isolée, aérée, bien exposée, chauffée modérément (18°).

Régime lacté exclusif pendant trois semaines, puis purées de légumes, pain, bouillies, crèmes. Faire boire les malades. Pas d'alcool, pas de viande pendant six semaines.

Propreté de la peau (bains tièdes quotidiens) et des muqueuses (purgatifs, diurétiques, lavages, irrigations, pulvérisations). Onctions avec des corps gras et pom-mades pour hâter la desquamation. Faire des instilla-tions nasales matin et soir avec l'huile résorcinée à 1 p. 25. Badigeonnages de la gorge quand il y a de l'an-gine avec de la glycérine résorcinée à 1 p. 10 ou 1 p. 20.

Repos absolu au lit pendant un mois; garder la chambre pendant au moins quarante jours. Désinfecter vêtements et appartement avant de remettre l'enfant en circulation.

TRAITEMENT DES FORMES GRAVES. — S'il y a hyperthermie, ataxo-adynergie, donner des affusions froides ou des bains froids (25°, 20°) toutes les quatre ou cinq heures. Si le bain n'est pas supporté, employer le drap mouillé. Les antithermiques chimiques (quinine, anti-pyrine, acide salicylique) ne sont pas à conseiller. Le salicylate de soude ne sera donné que dans les cas de *rhumatisme scarlatin*, s'il n'y a pas d'albuminurie. J'ai trouvé que le *salophène*, l'*aspirine* calmaient aussi les douleurs.

La digitale, l'acétate d'ammoniaque sont des toniques et stimulants qui peuvent être employés.

La *néphrite scarlatineuse* sera prévenue et traitée par le régime lacté, par les purgatifs, les ventouses sur les lombes, le tanin. En cas d'anasarque, on peut donner la théobromine (50 centigr. à 1 gr. par jour en deux ou trois paquets), ou la *diurétine* (1 gr. 50 dans une potion).

S'il y a urémie, lavement purgatif du codex, inhala-

tions d'oxygène, saignée ou sangsues derrière les oreilles, vessie de glace sur la tête.

PROPHYLAXIE. — Il n'y a pas de médicaments immunisants, il faut faire l'isolement et l'antiseptie, se défier de la propagation par des tiers, par des objets, par des substances alimentaires (lait). Désinfecter avec soin les pièces occupées par les scarlatineux et les objets souillés par eux.

Sclérème des nouveau-nés.

Allaitement naturel ou gavage, couveuse, inhalations d'oxygène, frictions et massages avec l'huile camphrée, bains sinapisés, enveloppements ouatés, sachets de sable chaud. Donner un peu d'eau-de-vie (5 gr. dans le lait sucré).

Sclérodémie.

Hydrothérapie, massage, électrolyse, scarifications, iodure de potassium.

Sclérose du cerveau.

Donner l'iodure de potassium (10 centigr. par année d'âge), les bains tièdes prolongés, faire des massages et mouvements communiqués. S'il y a des attaques épi-leptiformes, donner des bromures et des sédatifs. Cra-niectomy dans quelques cas; éducation spéciale.

Sclérose en plaques.

Iodure de potassium et frictions mercurielles, nitrate d'argent en pilule :

Nitrate d'argent.....	057,01
Argile ou kaolin.....	057,10
Eau distillée.....	Q. S.

Pour une pilule; une à trois par jour.

Scoliose.

Prévenir la déformation par de bonnes attitudes surtout à l'école, par la disposition favorable des tables, pupitres, bancs, fenêtres.

Pour corriger la scoliose, gymnastique suédoise, massage, électricité, corsets orthopédiques.

Scorbut infantile.

PROPHYLAXIE. — Allaitement naturel, éviter les aliments indigestes et de conserve.

TRAITEMENT. — Revenir au lait frais, et donner chaque jour deux à trois cuillerées à café de jus d'orange, de raisin; laver la bouche avec le jus de citron.

Quelques auteurs ajoutent le jus de viande, la purée de pommes de terre, etc.

Bains salés, cure d'air, repos.

Scrofule.

Huile de foie de morue à doses fortes (deux à trois cuillerées à soupe par jour) l'hiver.

Iode, iodures, sirop de raifort iodé, iodo-tannique l'été.

Voici quelques formules de préparations iodurées :

1 ^o Iodure de potassium.....	4 gr.
Extrait de quinquina.....	2 —
Infusion de pensées sauvages.....	80 —
Sirop antiscorbutique.....	20 —

Une cuillerée à potage tous les matins.

2 ^o Iodure d'amidon soluble.....	1 gr.
Eau distillée.....	35 —
Sucre blanc.....	64 —

(Soubeyran).

Deux à quatre cuillerées à café par jour.

3 ^o Iodure de potassium.....	} aa	2 gr.
Teinture d'iode.....		
Sirop de gentiane.....	} aa	125 —
— de quinquina.....		

(Verneuil).

Une à deux cuillerées à café par jour.

Potain prescrit, à chaque repas, un verre à liqueur de :

Extrait fluide de quinquina.....	45 gr.
Glycérine neutre.....	100 —
Eau.....	Q. S. p. 1000 —

Les scrofuleux non excitables se trouvent très bien de la cure marine et notamment des plages du nord (Berck, Boulogne, Dunkerque, Ostende, etc.). Ceux qui sont faiblement excitables peuvent aller sur les plages du Calvados, de la Bretagne, aux Sables-d'Olonne, à Arcachon, à Biarritz, etc.

Ceux que la mer excite trop seront envoyés aux eaux chlorurées sodiques (Salies, Salins, Bourbonne) ou arsenicales (La Bourboule).

Certaines prédominances cutanées ou muqueuses (eczémas, catarrhes bronchiques) peuvent indiquer les eaux sulfureuses des Pyrénées.

L'hygiène qui convient aux scrofuleux est celle des habitants des campagnes : vie au grand air, exercices, gymnastique, nourriture saine et abondante.

User largement des bains salés, des frictions stimulantes, du gant de crins, du massage, de la gymnastique suédoise.

Séborrhée.

Contre les croûtes séborrhéiques de la tête, la propreté suffit : lavages quotidiens, onctions avec une pommade anodine :

Oxyde de zinc.....	4 gr.
Vaseline.....	30 —

Ne pas faire porter de bonnets aux nourrissons.
Contre la séborrhée sèche ou pityriasis du cuir chevelu, la lutte est plus difficile.

On prescrira des frictions quotidiennes avec les mixtures suivantes :

1° Borax.....	4 gr.
Eau.....	} ã 20 —
Alcool à 90°.....	
Glycérine.....	
2° Résorcine.....	} ã 1 gr.
Teinture de cantharides.....	
Alcool à 90°.....	} ã 10 —
Glycérine.....	
Eau de Cologne.....	
— distillée.....	
3° Résorcine.....	2 gr.
Huile de ricin.....	20 —
Alcool à 60°.....	80 —
4° Hydrate de chloral.....	30 gr.
Liqueur de Van Swieten.....	100 —
Eau.....	500 —
5° Sulfate de quinine.....	1 gr.
Eau de Cologne.....	} ã 40 —
Alcool à 90°.....	
6° Tanin.....	2 gr.
Alcool à 90°.....	20 —
Huile d'amandes douces.....	40 —

On fait le soir une friction, on savonne à l'eau tiède le lendemain matin.

Couper les cheveux ras. Essayer Luchon dans la séborrhée chronique.

Septicémie gastro-intestinale.

Diète hydrique (eau pure, eau gazeuse). Si les vomissements persistent, lavage de l'estomac et de l'intestin.
Lavement nutritif :

Peptone sèche.....	10 gr.
Jaune d'œuf.....	N° 1 ou 2.
Lait tiède.....	60 gr.
Sel marin.....	Une pincée.

Injections sous-cutanées de sérum artificiel (eau salée à 7 p. 1000) à la dose de 100, 200, 300 gr. matin et soir. Injections de caféine, d'éther, d'huile camphrée. Réchauffer les malades avec des boules, donner des bains à 38°, faire des frictions avec le baume de Fioravanti ou le liniment de Rosen.

Sigmoïdite.

Variété de stercorome de l'S iliaque. Repos au lit, cataplasmes laudanisés sur le ventre, bains chauds quotidiens, lavements répétés, diète liquide. Au besoin, intervention chirurgicale comme dans le stercorome irréductible.

Spasme de la glotte.

Au moment de l'accès, frictionner, flageller, jeter de l'eau froide à la figure, au besoin insuffler ou tuber. Kürt a conseillé les attouchements de la pituitaire ou de la conjonctive avec une barbe de plume trempée dans une solution de quinine. Essayer la compression du phrénique et enfin les tractions rythmées de la langue. Les inhalations d'ammoniaque, d'éther, de chloroforme (quelques gouttes), les larges inhalations d'oxygène sont à éprouver. Dans l'intervalle des accès, donner des bains de tilleul :

Tilleul avec bractées.....	50 gr.
Eau bouillante.....	1000 —
Passer et verser dans l'eau du bain.	

Donner, trois fois par jour, une cuillerée à café de la potion suivante :

Musc.....	0 ^{ost} , 10
Bromure de potassium.....	1 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	} ã 30 gr.
Eau distillée.....	

Ou bien encore :

Oxyde de zinc.....	0 ^{sr} ,10
Julep gommeux.....	60 gr.

Par cuillerées à café de deux en deux heures.

Tous les soirs, on introduira un suppositoire contenant :

Extrait de belladone.....	0 ^{sr} ,05
Beurre de cacao.....	2 gr.

Combattre la constipation avec des suppositoires à la glycérine ou de petits lavements glycérisés.

Rilliet et Barthez faisaient des frictions sur le cou avec la pommade suivante :

Extrait de belladone.....	1 gr.
Axonge.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 15 —
Onguent gris.....	

Entourer les jambes d'ouate.

Pour Kassowitz, le spasme de la glotte étant lié au rachitisme et au craniotabes, le meilleur traitement est le phosphore :

Phosphore.....	0 ^{sr} ,01
Huile.....	100 gr.

PROPHYLAXIE. — Allaitement naturel, promenade au grand air; pas d'excitation, pas de contrariété; faire que l'enfant boive lentement pour ne pas avaler de travers, donner des aliments en purée.

En cas de vers intestinaux, donner le semen contra, la santonine, etc.

Spasme de la vessie.

Diluer l'urine par des boissons abondantes, le lait coupé de tisanes de chiendent, graines de lin, queues de cerise, eau de Vichy. Bains tièdes prolongés, cata-

plasma sur le ventre. Lavements froids, suppositoires calmants :

Hydrate de chloral.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 0 ^{sr} ,05
Extrait de belladone.....	
Beurre de cacao.....	2 gr.

Eviter les refroidissements (caleçon de flanelle).

Spermatorrhée.

En cas de contraction exagérée des vésicules séminales, donner les antispasmodiques: bromure de potassium ou de camphre, lupulin, phosphore de zinc, jusquiame, belladone, bains chauds, douches sulfureuses chaudes. S'il y a atonie: seigle ergoté ou ergotine, noix vomique ou strychnine, gouttes de Baumé, douches froides ou drap mouillé, bains de mer, massage, électrisation périnéale. Lallemand a préconisé la cautérisation au nitrate d'argent du véru montanum. Mais cela n'est bon que dans les urétrites chroniques avec cystite du col.

Trousseau a comprimé la prostate par la voie rectale (embout de bois arrondi). S'il y a fissure anale, dilatation forcée. Hydrothérapie, changement d'air, cure à Divonne, Gérardmer, etc.

Spina ventosa.

Au début, révulsion: teinture d'iode, pointes de feu, emplâtre de Vigo. S'il y a suppuration, on incise et on panse à l'iodoforme. Réduire l'intervention chirurgicale au minimum, patienter. Cure prolongée à Berck.

Spléno-pneumonie.

Badigeonnages iodés, ventouses, vésicatoires, bonne hygiène, cure d'air.

Sténose du pylore.

Laparotomie, gastro-entérostomie, quand l'enfant a assez de force pour supporter cette intervention. Un enfant de deux mois a été sauvé par W. Abel ; un autre de onze ans a été guéri par Hansy (gastro-entérostomie avec bouton de Murphy).

Stercorome.

Au début, grandes irrigations tièdes d'eau bouillie ou boriquée. Massages abdominaux, strychnine, électrisation. On peut prescrire :

Poudre de scammonée.....	08 ^r ,10
Magnésie calcinée.....	} <i>aa</i>
Rhubarbe.....	
Poudre de noix vomique.....	08 ^r ,02

Pour un paquet ; deux à trois par jour dans une cuillerée à café de lait ou d'eau sucrée (enfant de cinq à six ans).

Si la tumeur persiste et cause une obstruction insurmontable, on essaiera le curettage et en dernier ressort la laparotomie.

Stomatite aphteuse (Voy. APHTES).**Stomatite érythémateuse.**

Lavages au chlorate de potasse (2 à 3 p. 100).

Chlorate de potasse.....	} <i>aa</i>	5 gr.
Bicarbonate de soude.....		
Eau bouillie.....	150	—

Badigeonner au pinceau trois à quatre fois par jour. S'il y a saignement gingival, fongosités, décollements, toucher au pinceau avec :

Teinture d'iode.....	10 gr.
Glycérine.....	20 —

Si la muqueuse est douloureuse, toucher avec :

Teinture d'opium.....	08 ^r ,10
Chlorate de potasse pulvérisé.....	5 gr.
Sirop de mûres.....	40 —

Régime lacté.

Stomatique herpétique (Voy. HERPÈS).

Même traitement que ci-dessus.

Stomatite impétigineuse.

Laver la bouche à l'eau boriquée, au chlorate de potasse à 4 ou 5 p. 100, et toucher les ulcérations avec l'eau oxygénée ou le collutoire suivant :

Borax.....	10 gr.
Miel blanc.....	20 —

Stomatite pultacée (Voy. STOMATITE ÉRYTHÉMATEUSE).**Stomatites ulcéreuses.**

Chlorate de potasse *intus* et *extra*. A l'intérieur, ne pas dépasser 1 à 2 grammes.

Chlorate de potasse.....	2 gr.
Julep gommeux.....	60 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

A l'extérieur, on prescrira :

Chlorate de potasse ou borax.....	5 gr.
Mellite de roses.....	30 —
Eau bouillie.....	200 —

Faire rincer la bouche cinq à six fois par jour.

On peut toucher au pinceau avec :

1 ^o Chlorate de potasse.....	4 gr.
Miel rosat.....	10 —
Glycérine.....	20 —

2° Bicarbonate de soude.....	5 gr.
Borax.....	10 —
Sirop de mûres.....	30 —
3° Borate de soude.....	5 gr.
Miel blanc.....	30 —
4° Acide salicylique.....	2 gr.
Glycérine.....	20 —
	(Barié).
5° Teinture d'iode.....	10 gr.
Glycérine.....	20 —
6° Permanganate de potasse.....	1 gr.
Eau.....	150 —

Marfan vante le chlorure de chaux sec.

J'ai employé avec succès les injections et badigeonnages avec l'eau oxygénée à 12 volumes.

Diète lactée. Extraire les dents malades.

Strabisme.

Le strabisme convergent peut être traité par la méthode orthoptique suivie pendant longtemps. Faire d'abord une cure d'atropine de huit jours permettant de calculer le degré d'hypermétropie. Faire porter ensuite constamment des verres convexes qui corrigent cette hypermétropie. Fermer tous les jours, pendant une heure ou deux heures, l'œil bon avec une bandelette.

Le traitement chirurgical (ténotomie) est destiné à supprimer la vision disgracieuse.

Strophulus.

Poudrer largement au lycopode, à l'amidon, au talc, ou avec le mélange suivant :

Lycopode.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 15 gr.
Amidon.....	
Sous-nitrate de bismuth.....	
Talc.....	
Menthol.....	1 —

Faire matin et soir des lotions avec :

1° Menthol.....	5 gr.
Eau-de-vie camphrée.....	100 —
2° Acide phénique.....	5 gr.
Vinaigre aromatique.....	300 —
Onctions le soir au coucher.	(W. Dubreuilh).
3° Goudron de hêtre.....	30 gr.
Teinture de quillaya.....	100 —

On met une cuillerée de cette émulsion dans 1/2 verre d'eau et on lotionne (W. D.).

On peut appliquer une pommade acide :

Acide tartrique.....	1 gr.
Glycérolé d'amidon.....	40 —

ou lotionner avec :

Menthol.....	2 à 5 gr.
Huile d'amandes douces.....	50 —

En même temps, régler le régime, les tétées, écarter les aliments indigestes, combattre la constipation, faire l'antiseptisme intestinal :

Benzonaphtol.....	0 ^{sr} ,10
Bicarbonate de soude.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 0 ^{sr} ,05
Salicylate neutre de bismuth.....	

Pour un paquet ; cinq à six par jour dans une cuillerée de lait sucré (enfant de six à dix-huit mois).

Subluxation du maxillaire inférieur.

Aliments liquides ou mous, mentonnière en cuir moulé embrassant le maxillaire inférieur, munie de lacs élastiques attachés au sommet de la tête et reliés entre eux par une courroie élastique demi-circulaire postérieure. Le maxillaire ainsi bridé ne peut exécuter qu'un abaissement de 1 centimètre. Porter l'appareil jour et nuit pendant plusieurs mois (Beurnier, 2 succès). En cas d'échec, suturer le ménisque au périoste.

Sudamina.

Saupoudrer les parties atteintes avec lycopode, talc, amidon.

Suette miliaire.

Chambre aérée, chauffée (18°), boissons fraîches, lait, bouillon, quinine, lotions froides vinaigrées. En cas d'hypothermie et d'ataxo-adynergie, bains froids (20°) toutes les quatre heures. En cas de dyspnée, sinapismes aux jambes, cataplasmes sinapisés sur le thorax, ventouses sèches.

Isolement des malades, désinfection des locaux et objets.

Surdi-mutité.

Explorer l'oreille et les cavités naso-pharyngiennes, racler les végétations. Instruire les enfants, leur apprendre à lire sur les lèvres des interlocuteurs et à parler.

Surmenage scolaire.

Repos, grand air, exercices à la campagne, ration de croissance. Bains de mer. La Bourboule, eaux chlorurées sodiques. Réduire les heures de classe, accroître les récréations, élaguer les programmes.

Symphyse cardiaque.

Repos absolu au lit, régime lacté, purgatifs, révulsifs (vésicatoires, pointes de feu). Iodure de potassium. Pas de digitale, plutôt caféine, théobromine.

Syphilis acquise.

Frictions mercurielles : 2 grammes d'onguent napolitain par jour. Panser les lésions locales avec une pommade au calomel :

Précipité blanc.....	3 gr.
Vaseline.....	30 —

Après un an de traitement permanent, donner l'iodeure de potassium (1 gr. par jour pendant trois semaines ; interruption de dix jours, reprise de trois semaines, etc). Tous les trois mois, cure mercurielle de quinze jours.

PROPHYLAXIE. — Choisir les nourrices avec soin, empêcher les baisers et contacts suspects ; remplacer la vaccine de bras à bras par le vaccin de génisse. Aseptiser les instruments.

Syphilis héréditaire.

Traitement précoce par les frictions mercurielles *ut supra*, en changeant la place de la friction tous les jours. On peut formuler ainsi :

Onguent napolitain.....	60 gr.
Essence de menthe.....	XV gouttes.

Diviser en trente boîtes ; faire tous les matins une friction de cinq minutes avec une flanelle sur le ventre, à droite, à gauche, en bas, en haut, etc., en changeant de place chaque fois. Après la friction, laisser la flanelle sur place.

S'il y a des érosions et plaies, donner un bain de sublimé à 1 p. 10000 tous les jours, avant la friction.

Au bout d'un mois de frictions, on suspend huit jours et on recommence ; ainsi pendant un an. Puis on donne le sirop de Gibert (une cuillerée à café par jour, trois semaines par mois). Au bout de deux ans, on ne donne que l'iodeure de potassium (20 centigr. par jour) quinze jours par mois. Si l'on donne la liqueur de van Swieten, on la fait prendre dans du lait (X gouttes par jour et

par mois d'âge). Welander a remplacé les frictions mercurielles par les inhalations (sachet d'onguent napolitain devant la poitrine).

Panser les rhinites et lésions locales avec la vaseline au calomel (1 p. 10). Allaitement naturel:

Les injections mercurielles sont inutiles: huile grise, oxyde jaune, calomel.

PROPHYLAXIE. — Traiter la syphilis des parents, traiter la femme enceinte, déconseiller le mariage aux syphilitiques récents et mal soignés. Une mère syphilitique doit allaiter son enfant; en cas d'impossibilité, elle ne doit pas prendre une nourrice.

T

Tabes dorsal spasmodique.

Courants continus sur la colonne vertébrale, bains chauds, nitrate d'argent:

Nitrate d'argent.....	0 ^{gr} ,01
Glycérine et mie de pain.....	Q. S.

Pour une pilule (deux par jour).

On a aussi conseillé l'ergotine (20 à 30 centigr.). Ventouses sèches, pointes de feu, vésicatoires de chaque côté de la colonne vertébrale.

Education méthodique des membres, gymnastique, massage, mouvements passifs (mécanothérapie). Cures thermales: Bourbonne, Bourbon-l'Archambault, Aix, Dax, Saint-Amand, Nérès.

Tachycardie.

Repos, cure d'air, séjour à la campagne, drap mouillé, cures alternatives de bromure et d'iodure de potassium (hypertrophie cardiaque), quinine, valériane, valériane d'ammoniaque. Soigner l'estomac.

Taies de la cornée.

Huile de morue, iodure de potassium. Insufflations sur la cornée avec:

Calomel en poudre.....	} aa
Sucre en poudre.....	

Ou bien avec:

Aloès socotrin.....	} aa	0 ^{gr} ,03
Calomel.....		
Sucre en poudre.....		

On emploie aussi les collyres et pommades:

1 ^o Iodure de potassium.....	5 gr.
Teinture d'iode.....	XXX gouttes.
Eau distillée.....	30 gr.

Instiller matin et soir (Armieux).

2 ^o Bicarbonate de soude.....	1 gr.
Iodure de potassium.....	2 —
Eau distillée.....	50 —
	(Kammerer).

3 ^o Oxyde jaune de mercure.....	0 ^{gr} ,10
Vaseline blanche.....	10 gr.

4 ^o Onguent gris.....	} aa	5 gr.
Lanoline.....		
Vaseline.....		

Avec le bout d'une petite baguette, on porte un fragment de ces pommades dans le cul-de-sac conjonctival. On fait fermer l'œil et avec une boulette d'ouate hydrophile on masse les paupières closes.

Teigne tondante.

Tête tenue rase, propre, couverte, lavée toujours à l'eau savonneuse ou au sublimé (1 p. 500 ou 1 p. 1000). Autour de chaque tonsure, cercle d'épilation de 5 à 6 mil-