

par mois d'âge). Welander a remplacé les frictions mercurielles par les inhalations (sachet d'onguent napolitain devant la poitrine).

Panser les rhinites et lésions locales avec la vaseline au calomel (1 p. 10). Allaitement naturel:

Les injections mercurielles sont inutiles: huile grise, oxyde jaune, calomel.

PROPHYLAXIE. — Traiter la syphilis des parents, traiter la femme enceinte, déconseiller le mariage aux syphilitiques récents et mal soignés. Une mère syphilitique doit allaiter son enfant; en cas d'impossibilité, elle ne doit pas prendre une nourrice.

T

Tabes dorsal spasmodique.

Courants continus sur la colonne vertébrale, bains chauds, nitrate d'argent:

Nitrate d'argent.....	0 ^{gr} ,01
Glycérine et mie de pain.....	Q. S.

Pour une pilule (deux par jour).

On a aussi conseillé l'ergotine (20 à 30 centigr.). Ventouses sèches, pointes de feu, vésicatoires de chaque côté de la colonne vertébrale.

Education méthodique des membres, gymnastique, massage, mouvements passifs (mécanothérapie). Cures thermales: Bourbonne, Bourbon-l'Archambault, Aix, Dax, Saint-Amand, Nérès.

Tachycardie.

Repos, cure d'air, séjour à la campagne, drap mouillé, cures alternatives de bromure et d'iodure de potassium (hypertrophie cardiaque), quinine, valériane, valériane d'ammoniaque. Soigner l'estomac.

Taies de la cornée.

Huile de morue, iodure de potassium. Insufflations sur la cornée avec:

Calomel en poudre.....	} aa
Sucre en poudre.....	

Ou bien avec:

Aloès socotrin.....	} aa	0 ^{gr} ,03
Calomel.....		
Sucre en poudre.....		

On emploie aussi les collyres et pommades:

1 ^o Iodure de potassium.....	5 gr.
Teinture d'iode.....	XXX gouttes.
Eau distillée.....	30 gr.

Instiller matin et soir (Armieux).

2 ^o Bicarbonate de soude.....	1 gr.
Iodure de potassium.....	2 —
Eau distillée.....	50 —
	(Kammerer).

3 ^o Oxyde jaune de mercure.....	0 ^{gr} ,10
Vaseline blanche.....	10 gr.

4 ^o Onguent gris.....	} aa	5 gr.
Lanoline.....		
Vaseline.....		

Avec le bout d'une petite baguette, on porte un fragment de ces pommades dans le cul-de-sac conjonctival. On fait fermer l'œil et avec une boulette d'ouate hydrophile on masse les paupières closes.

Teigne tondante.

Tête tenue rase, propre, couverte, lavée toujours à l'eau savonneuse ou au sublimé (1 p. 500 ou 1 p. 1000). Autour de chaque tonsure, cercle d'épilation de 5 à 6 mil-

limètres. Badigeonnages répétés de teinture d'iode ou onctions avec :

Turbith minéral.....	1 gr.
Vaseline.....	30 —

M. du Castel, quand les plaques sont devenues lisses par la teinture d'iode, épile et racle, puis fait des injections intra-dermiques avec :

Sublimé.....	0 ^{sr} ,01
Acide tartrique.....	0 ^{sr} ,40
Chlorhydrate de cocaïne.....	1 gr.
Alcool à 90°.....	} à 30 —
Eau distillée.....	

On fait de très nombreuses piqûres (1 goutte par piqûre). Quinquaud, après savonnage et lavage au sublimé à 1 p. 1 000, raclait à la curette les surfaces malades. Après l'opération, il lotionnait avec :

Biiodure d'hydrargyre.....	0 ^{sr} ,15
Bichlorure d'hydrargyre.....	1 gr.
Alcool à 90°.....	40 —
Eau distillée.....	250 —

Il appliquait ensuite des rondelles d'emplâtre ainsi composé :

Biiodure d'hydrargyre.....	0 ^{sr} ,15
Bichlorure d'hydrargyre.....	1 gr.
Emplâtre simple.....	250 —

Au bout de quarante-huit heures, on enlève l'emplâtre, on savonne, on frictionne avec la solution antiseptique, on remet l'emplâtre, et ainsi de suite tous les deux jours. Si la guérison se fait attendre, recommencer le curettage et pratiquer l'épilation, en essayant la pomade suivante :

Vaseline.....	} à 100 gr.
Acide borique.....	
— salicylique.....	
— chrysophanique.....	

Butte procède ainsi : on étend, sur les plaques et en débordant d'un centimètre, plusieurs couches de ce collodion :

Alcool à 95°.....	21 gr.
Iode métallique.....	0 ^{sr} ,75
Collodion.....	35 gr.
Térébenthine de Venise.....	1 ^{sr} ,50
Huile de ricin.....	2 gr.

Ou bien du suivant :

Alcool à 95°.....	} à 5 gr.
Ether.....	
Iode métallique.....	
Collodion.....	

On recommence pendant trois ou quatre jours jusqu'à ce que la couche de topique soit bien épaisse, bien adhérente, sans craquelures. Au bout de quinze jours, on coupe aux ciseaux les bords du placard et on enlève le tout sans violence. La partie du topique en contact avec le cuir chevelu est recouverte d'une grande quantité de petits cheveux. On lave avec une solution de sublimé à 1 p. 500. Après cette sorte d'épilation, les topiques agissent mieux.

Sabouraud conseille : 1° une bordure d'épilation de un centimètre, 2° un badigeonnage de toute la tête à la teinture d'iode. Raser les plaques, badigeonner à la teinture d'iode trois fois par semaine, épiler chaque mois.

S'il s'agit de tondante à grosses spores, on stimulera le derme avec un crayon d'huile de croton au tiers ou à la moitié (beurre de cacao, cire vierge, huile de croton).

Comme traitement général, huile de morue, sirop iodotannique, eaux chlorurées sodiques, arsenicales, sulfureuses.

PROPHYLAXIE. — Isolement, renvoi de l'école, tête couverte, objets de toilette individuels, désinfection de ces objets par le sublimé ou l'éteuve.

Ténia.

Chez les enfants déjà grands, on peut employer l'extrait éthéré de fougères mâles en capsules contenant 50 centigrammes d'extrait et 5 centigrammes de calomel (une par année d'âge); la veille, l'enfant a été soumis à la diète lactée; le matin, il prend un lavement évacuateur, après quoi il ingère les capsules ténifuges.

Chez les enfants qui refusent les capsules, on peut essayer la potion suivante qui risque d'être vomie :

Extrait éthéré de fougère mâle.....	6 gr.
Essence de térébenthine.....	1 —
Sirop de fleurs d'oranger.....	40 —
Eau distillée de menthe.....	60 —

A prendre en une fois ; une demi-heure après prendre 30 grammes d'huile de ricin.

Un enfant de trois ans a bien toléré la potion suivante :

Extrait éthéré de fougère mâle.....	15r,50
Jus de réglisse.....	5 gr.
Mucilage.....	10 —
Sirop de fleurs d'oranger.....	30 —
Eau.....	50 —

R. Blache prescrit de prendre, en deux fois, le matin à jeun :

Extrait éthéré de fougère mâle.....	2 gr.
Huile de ricin.....	15 —
Sirop de menthe.....	20 —

Le Dr Duhourcau (Cauterets) emploie l'extrait chloroformo-huileux de fougères mâles associé à l'huile de ricin et de croton (une capsule par année d'âge le matin et le soir).

L'émulsion de semences de courges (50 à 60 ou 80 gr.) réussit quelquefois :

Semences de courges privées de leur enveloppe.....	60 gr.
Emulsion avec eau.....	200 —
Sirop de fleurs d'oranger.....	40 —

Le Koussou, difficile à prendre pour un enfant, peut être granulé :

Koussou en poudre.....	15 gr.
Sucre pour granuler.....	Q. S.

Prendre en une fois dans du lait.

Le tannate de pelletière (Tanret) est trop toxique pour des enfants, mais l'infusion ou la décoction d'écorces de grenadier peut se prescrire :

Ecorce de racines de grenadier.....	40 gr.
Faire infuser dans eau bouillante.....	200 —
Sirop de menthe.....	50 —

On a conseillé encore le kamala :

Poudre de kamala.....	6 gr.
Pulpe de tamarin.....	30 —
Suc de citron.....	Q. S.

Prendre en une fois.

Teinture de kamala.....	10 gr.
Sirop d'écorces d'oranges.....	30 —
Eau de menthe.....	80 —

On a associé plusieurs ténifuges dans l'électuaire suivant :

Extrait éthéré de fougère mâle.....	} aã 05r,50
— de racines de grenadier.....	
Fleurs de Koussou.....	} aã 20 gr.
Miel.....	

Diviser en trois parties pour prendre à jeun à dix minutes d'intervalle; une heure après, donner quinze à vingt grammes d'huile de ricin.

Quand on a échoué avec un ténicide, attendre trois mois avant de recommencer.

PROPHYLAXIE. — Ne pas manger de viande crue de porc ou de bœuf.

Terreurs nocturnes.

Veiller au fonctionnement du tube digestif, combattre la constipation, éviter l'abus des liquides, soi-

gner la qualité des aliments. Ne pas faire de contes effrayants. Bain de tilleul le soir. Au besoin quelques hypnotiques (bromures, trional, chloral). Chez les enfants nerveux on prescrira l'eau froide (affusions, drap mouillé). Ils devront se coucher de bonne heure, ne pas aller au spectacle, en soirée, etc. Sorties, promenades au grand air, jeux de plein air.

Tétanie.

Bains tièdes prolongés (34° à 35°), ventouses le long de la colonne vertébrale, inhalations d'éther ou de chloroforme, bains de vapeur, frictions calmantes avec :

Huile de jusquiame.....	30 gr.
Laudanum.....	} aa 5 —
Chloroforme.....	

Les courants continus ont été préconisés. Dans l'intervalle des accès, bromure, chloral en potion ou en lavement :

Bromure de potassium.....	1 gr.
Eau de fleurs d'oranger.....	30 —
Sirop de gomme.....	20 —

Par cuillerées à café d'heure en heure.

Hydrate de chloral.....	0 ^{sr} .50
Teinture de musc.....	X gouttes.
Sirop de fleurs d'oranger.....	50 gr.

Même mode d'emploi.

Hydrate de chloral.....	0 ^{sr} .20
Beurre de cacao.....	1 ^{sr} .50

Pour un suppositoire.

PROPHYLAXIE. — Traiter les troubles digestifs, combattre la diarrhée, donner du lait, faire l'antisepsie intestinale, parfois le lavage de l'estomac.

Tétanos.

Chambre obscure, loin du bruit, immobilité. Alimentation liquide (lait, bouillon), potion calmante :

Bromure de potassium.....	} aa 3 gr.
Hydrate de chloral.....	
Sirop de fleurs d'oranger.....	30 —
Eau de tilleul.....	100 —

Une cuillerée à potage de deux en deux heures.

S'il y a difficulté d'ingestion, lavements ou suppositoires de chloral (1 gr.).

Berenyi a prescrit avec succès :

Sulfonal.....	0 ^{sr} .20
Jaune d'œuf.....	N° 1.
Eau tiède.....	30 gr.

Pour un lavement.

On a injecté l'extrait de fève de Calabar (1/2 à 1 centigr.).

L'inoculation de sérum de cheval rendu réfractaire agit surtout avant l'apparition des symptômes tétaniques. On a cité des succès dus à l'injection de 1 à 4 centimètres cubes d'une solution phéniquée (2 ou 3 p. 100). C'est la méthode de Baccelli. D'autres ont réussi avec le sublimé à 1 p. 1000.

Mais Roux et Borrel ont inauguré la méthode des injections intra-cérébrales d'antitoxine (2 cent. cubes dans chaque lobe), sans préjudice des injections sous-cutanées (20 cent. cubes et davantage). Tizzoni s'est servi de sérum de chien rendu réfractaire.

En même temps la plaie doit être désinfectée, le segment de membre au besoin amputé. Pour prévenir le tétanos des nouveau-nés, on pansera avec soin la plaie ombilicale.

Thricocéphale.

User d'eau bouillie ou filtrée pour prévenir l'invasion du parasite. Faire des lavages intestinaux boriqués, boratés (10 gr. par litre) ou d'eau naphtolée (1/4 de gr. par litre). En même temps, on fera prendre :

Santonine.....	} aa	08,05
Calomel.....		

Pour un paquet; en prendre un tous les matins pendant une semaine dans une cuillerée de lait.

Extrait éthéré de fougère mâle.....	5 gr.
Huile d'amandes douces.....	20 —

Prendre en une fois.

Thrombose des sinus.

Sangsues à l'apophyse mastoïde, glace sur la tête, vésicatoire à la nuque, sinapismes aux membres, purgatifs. En même temps, mercure et iodure de potassium à l'intérieur.

Comme prophylaxie, soigner les otites, anthrax et érysipèles de la face.

Thrombose des veines rénales.

On prévient cette affection, trouvaille d'autopsie, par un bon allaitement. On combattra la déshydratation par les bains chauds, les lavements d'eau bouillie, les injections de sérum artificiel.

Thymus (maladies).

Liqueur de Fowler (1 goutte par jour et par année d'âge); suspendre après dix ou quinze jours d'emploi. Frictions mercurielles. En cas de suffocation, trachéotomie.

Tic de Salaam.

Bains de tilleul prolongés, drap mouillé pendant un quart à une demi-heure; bromure de potassium (20 à 30 centigr. par jour); suppositoires de chloral, sulfonal ou trional (25 centigr.).

Tics.

Bains tièdes, draps mouillés, douches, gymnastique suédoise. Séjour à la campagne, jeux de plein air.

Torticolis.

Electrisation faradique. En cas de tumeurs, frictions mercurielles, iodure de potassium. Massage, frictions avec :

Chloroforme.....	} aa	5 gr.
Laudanum.....		

Révulsion avec teinture d'iode, vésicatoire. En cas de rhumatismes, salicylate de soude (50 centigr. par année d'âge). A. Robin a encore conseillé la quinine et le jaborandi :

Feuilles de jaborandi.....	2 gr.
Macérer douze heures dans eau-de-vie.....	10 —
Infuser vingt minutes dans eau.....	150 —

Faire prendre à jeun après avoir passé.

Pour les cas rebelles, ténotomie et collier dit Minerve. La résection et l'élongation du spinal ont donné quelques succès.

Trachéite.

Séjour à la chambre, boissons chaudes (lait coupé d'infusion pectorale). Badigeonnages de teinture d'iode

ou coton iodé sur le sternum. Vomitif si la toux est pénible. Potion calmante :

Teinture de belladone.....	} ã	X gouttes.
— d'aconit.....		
Eau de laurier-cerise.....		2 gr.
Sirop de polygala.....		40 —
Eau de menthe.....		60 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

Trachéocèle.

Si la tumeur est bien tolérée, rien à faire ; si elle entrave la respiration, on doit l'extirper.

Trophonévrose de la face.

Massage, électrisation continue, courants induits.

Tuberculose cutanée verruqueuse.

Cautérisation au thermo ou galvano-cautère après avoir ramolli les tubercules par les cataplasmes ou l'emplâtre de Vigo. Huile de morue, bains salés, bonne nourriture.

Tuberculose de l'œil.

Cautérisation, excision du foyer, au besoin énucléation. Traitement général de la tuberculose.

Tuberculose intestinale.

Poudres astringentes et antiseptiques, bismuth, talc, benzonaphtol, phosphate basique de chaux. Aliments en purée, viande crue. Hygiène des tuberculeux.

Tuberculose pleurale.

Ponctions en cas d'épanchement abondant. Traitement général de la tuberculose pulmonaire.

Tuberculose pulmonaire.

Hygiène. — Cure d'air au repos, dormir la fenêtre entr'ouverte, séjour dans les climats secs et doux (Riviera) ; cure de sanatorium (Ormesson, Villiers-sur-Marne, Leysin, Davos, Canigou, Durtol, Thorenc, etc.). Nourriture abondante et riche (suralimentation). Frictions cutanées sèches et térébenthinées.

Thérapeutique. — Créosote en lavements, suppositoires ou injections sous-cutanées (10 centigr. par année d'âge) :

Huile de morue.....	100 gr.
Créosote de hêtre.....	1 —

Deux à six cuillerées à dessert par jour.

Créosote.....	0sr.50
Jaune d'œuf.....	Nº 1.
Huile d'olive.....	60 gr.

Pour un lavement.

Créosote.....	1 gr.
Huile stérilisée.....	15 —

Pour injections sous-cutanées.

On calmera la toux par l'opium, la belladone, les balsamiques. On attaquera la fièvre par l'antipyrine (1 à 2 grammes avant l'accès).

L'arsenic souvent prescrit autrefois tend à être remplacé par le cacodylate de soude en lavement ou injection sous-cutanée :

Cacodylate de soude.....	0sr.50
Eau stérilisée.....	10 cent. cub.

Faire une injection de un demi à 1 cent. cub. par jour.

Le Dr Donatien Labbé a vanté l'air ozoné.

PROPHYLAXIE. — Vie au grand air, à la campagne, séjour au bord de la mer (Berck), eaux chlorurées sodiques (Salies), etc.

Tuberculose des vertèbres (Voir MAL DE POTT).

Tuberculose du rein et des voies urinaires.

S'assurer qu'un seul rein est pris par la palpation, la cystoscopie. Néphrotomie contre la pyonéphrose; néphrectomie quand le rein opposé est sain. Contre la cystite tuberculeuse, régime lacté, repos au lit, lavages vésicaux, curetage (Rochet).

Tuberculose du testicule.

Bains salés, huile de foie de morue, séjour à Berck. Emplâtre de Vigo en permanence. Quand il y a suppuration, ouverture et pansement iodoformé. Pas de castration.

Tuberculose (prophylaxie).

Séparer les enfants dès la naissance des parents phtisiques. Isolement quand il est possible. Interdire la communauté de lit et de chambre.

Empêcher les tuberculeux de souiller le sol par leurs crachats. Ne pas cracher dans un mouchoir mais dans un crachoir humide. Les parents tuberculeux éviteront d'embrasser leurs enfants sur la bouche, de les faire boire au même verre, de tousser près de leur visage. Dans un appartement habité par un tuberculeux, ne pas balayer à sec ni épousseter au plumeau; essuyage direct, balayage à la serpillière humide.

Interdire de cracher dans les locaux publics, voitures, wagons, salles d'attente.

Empêcher l'enfant de jouer avec la terre des rues et promenades. Lui laver les mains et le visage.

Dans les écoles, écarter tout enfant tuberculeux, ne pas oublier les maîtres.

Le lait des vaches tuberculeuses sera interdit; dans tous les cas on le stérilisera par la chaleur. La viande des bovidés ne sera pas mangée crue. Mais l'alimentation n'est que rarement en cause. C'est par le poumon

qu'on devient tuberculeux, par les crachats desséchés des phtisiques. C'est le crachat qu'il faut viser.

Tumeur lacrymale (Voy. DACRYOCYSTITE).**Tumeurs adénoïdes du pharynx.**

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Huile de morue, bains de mer, eaux sulfureuses ou arsenicales.

TRAITEMENT LOCAL. — Marage a touché avec succès les végétations avec un tampon d'ouate imbibé de résorcine et d'eau (parties égales).

Séance tous les deux ou trois jours.

Quand les végétations sont volumineuses, il faut les détruire: 1° *Ecrasement* avec le doigt, méthode ancienne abandonnée; 2° *Cautérisations* au galvanocautère, méthode délicate; 3° *Ablation* avec des pinces spéciales après anesthésie au bromure d'éthyle (méthode de choix).

Après l'extirpation des végétations adénoïdes, le taux de la croissance est doublé ou triplé.

Tumeurs blanches.

Repos dans une bonne attitude, immobilisation dans un appareil plâtré ou silicaté, dans une gouttière, sur une planche. Compression ouatée, traction continue, révulsion par la teinture d'iode, les pointes de feu, les vésicatoires, les frictions d'onguent napolitain belladonné.

Autrefois on attaquait la tumeur blanche par l'ignipuncture. On lui a substitué les injections modificatrices de naphthol camphré (Ménard), de chlorure de zinc (Lannelongue): méthode sclérogène. On prend une solution de chlorure de zinc à 1 p. 10 et avec une seringue de Pravaz on injecte deux à trois gouttes sous le périoste, en plusieurs points, autour des fongosités. Il en

résulte une inflammation qui aboutit à la formation d'une muraille scléreuse.

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Séjour prolongé à Berck-sur-Mer ou dans un autre sanatorium maritime, eaux chlorurées sodiques fortes (Salies, etc.), huile de morue, phosphate de chaux, arsenic.

Tumeurs cérébrales.

Traitement mixte par les frictions mercurielles et l'iodure de potassium. Calmer les convulsions par le bromure de potassium, le chloral; libérer l'intestin (purgatifs et lavements); révulsion à la nuque (vésicatoire), glace sur la tête.

En présence de symptômes nets de localisation, on fera la craniectomie et on cherchera à extirper la tumeur.

Tumeurs de la moelle.

Traitement mixte par le mercure et l'iodure de potassium. Intervention chirurgicale dans certains cas.

Tumeurs de la vessie.

Extirpation précoce et radicale pour prévenir la récurrence et la généralisation. Si l'on arrive trop tard, on se contentera de palliatifs, tels que lavages antiseptiques de la vessie, narcotiques, etc.

Tumeurs du péritoine.

Contre les kystes et les abcès, la laparotomie est indiquée, après ponction exploratrice pour fixer le diagnostic.

Tumeurs du sterno-mastoïdien.

Traitement spécifique d'abord : frictions mercurielles, bains de sublimé à 1 p. 10 000, iodure de potassium.

Localement, on appliquera un emplâtre de Vigo, on fera des onctions avec une pommade iodurée à 1 p. 10, des massages; après l'échec de ces méthodes, on pourra intervenir chirurgicalement : ténotomie, extirpation.

Tumeurs érectiles (Voy. ANGIOMES).

Tumeurs du rein.

S'il s'agit de kyste, ponction évacuatrice suivie d'injection iodée, de chlorure de zinc à 1 p. 20, de sublimé à 1 p. 2000. Si la tumeur est solide, il faut faire la néphrectomie.

Tumeurs du testicule.

Contre le testicule tuberculeux, il faut agir médicalement; de même contre la syphilis testiculaire.

Le sarcome et le cancer doivent être opérés sans retard (castration).

On doit intervenir chirurgicalement aussi dans les cas de kystes, tératomes et autres tumeurs congénitales.

Tympanisme (Voy. MÉTÉORISME).

Typhus cérébro-spinal (Voy. MÉNINGITE CÉRÉBRO-SPINALE).

Typhus exanthématique.

Même traitement que dans la fièvre typhoïde : bains tièdes ou froids, lavements d'eau froide, potion de Todd, boissons abondantes, etc.

Typhus récurrent (Voy. FIÈVRE RÉCURRENTÉ).