

plante est diurétique. Le suc de baies fraîches (15 à 30 gr.), l'infusion, la poudre (4 à 8 gr.), le vin, ont été prescrit dans la goutte, la gravelle, l'ictère, les hydrosies, les fièvres intermittentes :

Aloès.

Tonique à doses faibles (1 à 2 centigr.), l'aloès est purgatif à doses fortes (10 à 50 centigr.). En lavement ou suppositoire, il provoque des selles et agit efficacement contre les oxyures.

Aloès.....	1 gr.
Jaune d'œuf.....	N ^o 1.
Eau tiède.....	60 gr.

Pour un lavement.

Beurre de cacao.....	3 gr.
Aloès.....	0 ^{gr} ,20
Extrait de belladone.....	0 ^{gr} ,01

Pour un suppositoire.

Les enfants déjà grands peuvent faire usage des pilules suivantes contenant chacune 10 centigrammes d'aloès :

1^o *Pilules ante cibum :*

Aloès.....	1 ^{gr} ,20
Extrait de quinquina.....	0 ^{gr} ,60
Cannelle.....	0 ^{gr} ,20
Sirop d'absinthe.....	Q. S.

Pour douze pilules.

2^o *Pilules écossaises, ou d'Anderson :*

Aloès.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 2 ^{gr} ,60
Gomme-gutte.....	
Essence d'anis.....	
Sirop de sucre.....	
	Q. S.

Pour vingt-six pilules.

3^o *Grains de santé du Dr Franck :*

Aloès.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 10 gr.
Jalap.....	
Rhubarbe.....	
Sirop d'absinthe.....	
	Q. S.

Pour cent pilules.

Aloïne.

L'aloïne, principe actif de l'aloès, agit comme amer ou purgatif, suivant la dose. On fait des granules de 4 centigrammes (un avant le repas comme apéritif, 2 à 3 le soir en se couchant comme purgatif).

Aluminium.

On a prescrit l'alumine pure dans la diarrhée infantile (40 à 50 centigr. mêlés au sucre).

La solution saturée de sulfate d'alumine a été employée en badigeonnages dans les angines, l'ongle incarné, les nævi, les polypes des fosses nasales, les ulcères scrofuleux.

Alumnol.

Combinaison de naphтол et d'alumine; ce corps a été employé en solution (10, 30, 50 p. 100), ou en pomade (2, 10, 20 p. 100) contre l'eczéma, le prurigo, l'acné, le psoriasis.

Alun.

Le sulfate double d'alumine et de potasse ou alun est un astringent qu'on prescrit en collutoire ou gargarisme dans les angines :

Alun.....	4 gr.
Miel blanc.....	20 —

Toucher la gorge avec un pinceau imbibé de cette mixture.

Alun.....	1 gr.
Roses rouges.....	10 —
Miel rosat.....	30 —
Eau bouillante.....	250 —

F. S. A. pour gargarisme.

Alun.....	1 gr.
Eau de roses.....	125 —

Pour collyre.

Eau hémostatique de Pagliari :

Alun.....	5 gr.
Benjoin.....	25 —
Eau bouillante.....	500 —

Contre les engelures, on a fait des cataplasmes astringents avec deux blancs d'œuf et 40 centigrammes d'alun.

Comme astringent, dans les hémorragies externes (épistaxis, piqûres de sangsues), on emploie les poudres ou les solutions d'alun. Ces topiques servent encore dans les engelures, les brûlures, l'hyperhidrose, le prurigo, le lichen, l'eczéma, les ulcérations de la fièvre typhoïde. Dans les stomatites, l'angine, l'œdème de la luette, la diphtérie, l'alun a été très employé. On a insufflé la poudre d'alun calciné avec sucre en poudre dans les taies de la cornée. Le crayon à l'alun cristallisé sert à cautériser les granulations conjonctivales. On l'a préconisé dans l'ongle incarné.

Amadou.

On s'en sert comme hémostatique dans les petites hémorragies (saignées, piqûres de sangsues, etc.).

Amandes.

L'amande forme la base de plusieurs préparations

(looch blanc, lait d'amandes, sirop d'orgeat, etc.).

Lait d'amandes ou émulsion simple :

Amandes douces mondées.....	} aa	32 gr.
Sucre blanc.....		
Eau froide.....		1000 —

Sirop d'orgeat ou d'amandes :

Amandes douces.....	50 gr.
— amères.....	10 —
Sucre blanc.....	300 —
Eau.....	162 ^{gr} ,50
Eau de fleurs d'oranger.....	25 gr.

L'huile d'amandes douces peut servir de laxatif chez les nourrissons : par cuillerées à café.

Les amandes amères entrent dans la composition de la liqueur de Gowland :

Amandes amères.....	90 gr.	
Eau.....	500 —	
Sublimé.....	0 ^{gr} ,80	
Sel ammoniac.....	1 ^{gr} ,20	
Alcool.....	} aa	15 gr.
Eau de laurier-cerise.....		

Ambre.

L'ambre gris est un produit morbide du cachalot. Se donne en pilule ou potion comme antispasmodique (2^{gr} à 50 centigr.). La teinture se donne à la dose de 1 à 5 grammes en potion :

Teinture d'ambre gris.....	5 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	30 —
Eau de tilleul.....	100 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

Amidon.

La matière amyliacée des céréales porte le nom d'*amidon*, le nom de *fécule* étant réservé à celle des pommes de terre. S'emploie en *poudre* pure ou additionnée d'acide borique, salicylique, etc., pour la rendre antiseptique. On peut la remplacer par la poudre de riz ou amidon de riz qui est plus fine.

On en fait des cataplasmes avec l'eau bouillante (60 gr. p. 500). On laisse refroidir avant d'appliquer sur les dermatoses.

Le *glycérolé d'amidon* s'obtient en chauffant doucement 1 partie d'amidon pour 15 de glycérine. Les *lavements d'amidon* se préparent crus ou cuits avec :

Amidon de blé.....	10 gr.
Eau.....	200 —

On ajoute souvent I à II gouttes de laudanum.

Les *bains d'amidon* se préparent avec 250 à 500 grammes d'amidon par bain.

Ammoniaque.

L'ammoniaque liquide se prescrit à l'intérieur dans l'alcoolisme aigu (V à X gouttes dans une infusion de tilleul, thé ou café); on peut la donner aussi dans le météorisme, les coliques, etc. Comme topique, elle est utile dans les piqûres d'insectes et morsures de serpents.

On peut employer un collodion ammoniacal :

Ammoniaque.....	XL gouttes.
Acide salicylique.....	0 ^{sr} ,30
Collodion.....	3 gr.

Quelques gouttes sur les parties piquées ou mordues (Schwartz).

Comme stimulants, l'*esprit de Sylvius* ou la *liqueur ammoniacale anisée* se prescrit à la dose de V gouttes par année d'âge dans une potion ou tisane :

1^o Esprit de Sylvius ou alcoolat ammoniacal aromatique.

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	} <i>aa</i> 50 gr.
Carbonate de potasse.....	
Eau de cannelle.....	
Alcool à 80°.....	
Ecorces fraîches d'orange et de citron.....	10 —
Vanille.....	3 —
Cannelle.....	1 ^{sr} ,50
Girofle.....	1 gr.

2^o Liqueur ammoniacale anisée :

Ammoniaque.....	24 gr.
Essence d'anis.....	3 —
Alcool.....	96 —

La plupart des sels ammoniacaux sont des stimulants diffusibles; parmi eux il faut citer le carbonate d'ammoniaque, base des *sels anglais*, qu'on peut prescrire à la dose de 5 à 10 centigrammes par année d'âge :

Carbonate d'ammoniaque.....	0 ^{sr} ,40
Potion gommeuse.....	60 gr.

Par cuillerées à café d'heure en heure (enfant de quatre à huit ans).

Le chlorhydrate d'ammoniaque (*sel ammoniac*) se prescrit de même :

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	0 ^{sr} ,50
Sirop de cerises.....	20 gr.
Eau de menthe.....	40 —

Bézy l'a prescrit dans le rachitisme :

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	0 ^{sr} ,20
Bicarbonate de soude.....	0 ^{sr} ,50
Sirop de fleurs d'oranger.....	60 gr.

Les autres sels, *citrate*, *acétate* se prescrivent dans les mêmes circonstances, ce dernier (*esprit de Mindererus*) à dose plus forte :

Carbonate d'ammoniaque.....	} <i>aa</i> 0 ^{sr} ,30
Acide citrique.....	
Eau distillée.....	
Sirop de limon.....	50 —

Prendre en quatre ou cinq fois dans la journée.

Acétate d'ammoniaque.....	5 gr.
Cognac.....	} <i>aa</i> 10 —
Oxymel scillitique.....	
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 —
Eau distillée.....	60 —

A prendre par cuillerées dans les vingt-quatre heures (enfant de cinq ans).

Le *phosphate* et le *benzoate d'ammoniaque* sont utilisés contre la gravelle (40 à 50 centigr. par année d'âge).

Le *bromure d'ammonium* est un sédatif (10 à 20 centigr. par année d'âge) :

Bromure d'ammonium.....	05 ^r ,50
Eau chloroformée.....	10 gr.
Sirop d'oranges.....	80 —

Par cuillerées de deux en deux heures (enfant de cinq ans).

Le *valérianate d'ammoniaque*, applicable aux spasmes de la tétanie, de l'hystérie, de la chorée, de l'éclampsie, se donne à la dose de 5 à 20 centigrammes par année d'âge :

Valérianate d'ammoniaque.....	05 ^r ,10
Sirop de fleurs d'oranger.....	} <i>aa</i> 10 gr.
Glycérine.....	
Eau de fenouil.....	50 —

Par cuillerées toutes les trois heures.

Dauchez l'a prescrit en lavement chez les filles nerveuses :

Valérianate d'ammoniaque.....	05 ^r ,30
Camphre en poudre.....	05 ^r ,25
Jaune d'œuf.....	N° 1.
Décoction de valériane.....	200 gr.

Localement, comme révulsif, on emploie souvent l'eau *sédative* pure ou étendue d'eau :

Ammoniaque liquide.....	100 gr.
Sel marin.....	20 —
Camphre.....	2 —
Eau distillée.....	900 —
Essence de roses.....	Q. S.

On a fait de la vésication en appliquant pendant dix à quinze minutes une feuille d'ouate imprégnée du *liquide vésicant* de Guépin :

Ammoniaque concentrée.....	1 gr.
Huile camphrée.....	2 —

On a fait de la vésication également avec la pommade de Gondret :

Suif.....	} <i>aa</i> 1 partie.
Axonge.....	
Ammoniaque à 25°.....	2 parties.

Les liniments ammoniacaux servent contre les douleurs rhumatismales, les paralysies, l'anémie, le rachitisme, etc. :

1° Ammoniaque.....	10 gr.
Huile d'amandes douces ou camphrée.....	90 —
2° Baume de Fioravanti.....	} <i>aa</i> 40 gr.
Huile d'olive.....	
Alcool camphré.....	15 —
Ammoniaque.....	5 —

Ce dernier est le liniment excitant des hôpitaux; le baume opodeldoch contient aussi de l'ammoniaque et de l'alcool camphré.

Contre les œdèmes, le purpura, le prurigo chronique, les enveloppements avec des compresses imbibées de la solution suivante sont très utiles;

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	50 gr.
Eau.....	Q. S. p. 1 litre.

On a employé les pommades à l'ammoniaque contre les engorgements scrofuleux du cou, etc. :

1° Chlorhydrate d'ammoniaque.....	2 gr.
Iodure de plomb.....	1 —
Axonge.....	30 —
2° Chlorhydrate ou carbonate d'ammoniaque.....	4 gr.
Camphre.....	1 —
Axonge.....	30 —

L'ichtyol saturé d'ammoniaque, *ichtyolate d'ammoniaque*, est employé en lotion ou pommade. Je m'en suis servi dans l'érysipèle de la face, l'eczéma, le lichen, le prurigo :

1 ^o Sulfoichtyolate d'ammoniaque.....	5 gr.
Eau distillée.....	100 —
2 ^o Sulfoichtyolate d'ammoniaque.....	3 gr.
Vaseline.....	30 —

Amyloforme.

Combinaison d'amidon et de formaldéhyde, l'amyloforme est une poudre blanche qui peut remplacer l'iodoforme. L'amyloforme n'est pas toxique. Le Dr Longard a insufflé cette poudre dans la cavité thoracique (empyème). On peut faire de la gaze amyloformée à 10 p. 100.

Ananas.

Fruit riche en sucre, géline, acide végétal; son suc sert à préparer une tisane rafraîchissante.

Analgène.

Antithermique dérivé de la chinoline, l'analgène a été prescrit par Moncorvo aux enfants (doses de 25 centigr. répétées plusieurs fois).

Analgésine (Voy. ANTIPYRINE).

Ancolie.

Les graines d'ancolie (*aquilegia vulgaris* — renonculacées), à la dose de 4 grammes en poudre, émulsion, infusion, favoriseraient la sortie des éruptions varioliques, morbilleuses, scarlatineuses, etc.

Anémone.

L'anémone pulsatile (renonculacées) sert à faire des infusions (10 gr. de plante fraîche pour 500 d'eau), des extraits, une eau distillée, une alcoolature, un saccharolé (1 gr. d'extrait de suc pour 20 gr. de sucre blanc). Le Dr Ramur a donné l'extrait d'anémone pulsatile noire dans la coqueluche : 2 à 4 centigrammes trois fois par jour aux nouveau-nés, 3 à 6 centigrammes à partir de six mois, 8 à 10 centigrammes dans la deuxième enfance. On prescrit l'alcoolature de racines de préférence à celle de feuilles :

Alcoolature de racines d'anémone.....	1 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 —
Eau de menthe.....	60 —

Par cuillerées à dessert de deux en deux heures.

Anémonine : par centigrammes, 1 à 2 par jour.

Angélique.

On se sert surtout de la racine, en poudre (1 à 5 gr.), en infusion (10 à 15 gr. pour 500), en teinture à 1 pour 4 (10 à 15 gr.). Les semences sont carminatives comme l'anis (infusion de 10 à 15 gr. pour 500). Cette plante est indiquée dans l'anorexie, la dyspepsie, le météorisme.

Angusture.

Poudre (1 à 2 gr.), teinture à 1 p. 4 (2 à 8 gr.), extrait alcoolique (1 à 3 gr.).

Aniline.

Le Dr Turnbull a donné, dans la chorée, le sulfate d'aniline (5 à 10 centigr. 3 fois par jour); pendant le

traitement, cyanose des lèvres et de la bouche. Médicament dangereux. On a vu de simples chaussures jaunes, noircies avec un colorant à base d'aniline, empoisonner des enfants et déterminer précisément cette cyanose que le sulfate d'aniline à l'intérieur a provoquée (Landouzy et Brouardel).

Anis.

L'anis ordinaire, anis vert, s'entend des semences de la *Pimpinella anisum*, qui sont carminatives : infusion de 5 à 10 grammes p. 500. Teinture à 1 p. 5 d'alcool à 80° (4 à 15 gr.). Eau distillée (dose de 40 à 50 gr.). Essence d'anis par gouttes :

Essence d'anis.....	X gouttes.
Alcool à 90°.....	10 gr.
Julep gommeux.....	120 —

A prescrire dans les coliques, le météorisme, la diarrhée.

Antimoine.

Les préparations antimoniées, l'émétique surtout (*tartrate double d'antimoine et de potasse*), sont irritantes localement pour la peau et les muqueuses : *pustulation stibiée, ecchyma stibié, choléra stibié*. On a pu utiliser cette action comme révulsive dans la coqueluche, les bronchites, les arthrites, la méningite, etc.

Mais c'est surtout pour la médication évacuante que le tartre stibié a été prescrit (vomissements, diarrhées, sueurs). Cette triple action s'accompagne de dépression nerveuse, d'hypothermie, etc. On ne doit donc pas y avoir recours dans l'état adynamique des maladies aiguës ou chroniques. On a pu par contre l'utiliser dans les bronchites, pleurésies, pneumonies, gripes, coqueluches, catarrhes gastriques, etc. De même dans la chorée, le rhumatisme aigu, la colique de plomb.

Je donne l'émétique à la dose de 5 milligrammes par jour et par année d'âge :

1° Émétique.....	0 ^{gr} ,01
Sucre en poudre.....	0 ^{gr} ,50

Pour un paquet, n° 3. A prendre toutes les dix minutes dans un demi-verre d'eau (enfant de six ans).

2° Émétique.....	0 ^{gr} ,03
Eau chaude.....	100 gr.

A prendre en une, deux ou trois fois, à quelques minutes d'intervalle (enfant de six ans).

Autrefois, dans le croup, on prescrivait, à l'hôpital des Enfants, la potion suivante :

3° Émétique.....	0 ^{gr} ,10
Sirop d'ipéca.....	30 gr.
Oxymel scillitique.....	10 —
Infusion de polygala.....	150 —

J. Bergeron formulait dans la coqueluche des pilules (5 à 10 par jour) contenant chacune :

4° Tartre stibié.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 1 milligr.
Extrait de belladone.....	
Excipient.....	Q. S.

Pour avoir une action purgative, on prescrit l'émétique en lavage :

5° Émétique.....	0 ^{gr} ,02 à 0 ^{gr} ,05
Eau.....	500 gr.

Par demi-verres dans la journée.

Pour avoir des vomissements et des selles, je prescris fréquemment l'éméto-cathartique suivant :

6° Émétique.....	0 ^{gr} ,05
Sulfate de soude.....	20 gr.
Sirop.....	10 —
Eau.....	250 —

A prendre en deux ou trois fois, en une heure, à jeun (enfant de dix ans).

Pour l'usage externe (frictions sur le dos, entre les épaules), on s'est servi de la pommade d'Autenrieth :

Emétique.....	10 gr.
Axonge.....	30 —

Kermès. — Ce médicament (oxysulfure d'antimoine hydraté), est une poudre rouge moins énergique que le tartre stibié, plutôt expectorant que vomitif, qu'on peut donner à la dose de 1 centigramme par année d'âge, dans la bronchite, la coqueluche; on fait des pastilles à 1 centigramme :

1° Kermès minéral.....	05 ^r ,05
Oxymel scillitique.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 10 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	
Julep gommeux.....	
Par cuillerées de deux en deux heures (enfant de cinq ans); agiter avant de s'en servir.	80 —

2° Looch blanc.....	100 gr.
Kermès.....	05 ^r ,10

Pour un enfant de huit à dix ans.

Campardon a prescrit le kermès (5 milligr. par jour) dans la couperose.

Oxyde blanc d'antimoine ou antimoine diaphorétique lavé (biantimoniade de potasse): moins actif que les précédents, se donne à la dose de 20 centigrammes par année d'âge :

Oxyde blanc d'antimoine.....	4 gr.
Looch blanc.....	120 —

Agitez; par cuillerées de deux en deux heures.

Comme éméto-cathartique, on donnait autrefois la poudre de *Tribus* ou cornachine.

Oxyde blanc d'antimoine.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$
Crème de tartre.....	
Scammonée.....	

Prendre 0 gr. 25 à 0 gr. 50 dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée.

Anthrarobine.

Employée en pommade dans les dermatoses (1 p. 10).

Antipyrine.

Médicament antithermique et analgésique quand il est donné à doses fortes, non réfractées.

Il abaisse ou prévient la fièvre vespérale des tuberculeux, calme les convulsions, les mouvements choréiques, les quintes de coqueluche, réussit contre certains cas de diabète, d'incontinence d'urine, de diarrhée infantile.

On peut donner l'antipyrine en lavement :

Antipyrine.....	1 gr.
Laudanum.....	1 goutte.
Eau bouillie tiède.....	60 gr.

On peut aussi faire des injections sous-cutanées :

Antipyrine.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 4 gr
Eau de laurier-cerise.....	
Eau distillée.....	
	6 —

Une seringue de Pravaz matin et soir.

Pour faciliter la solubilité de la quinine, on peut lui associer l'antipyrine :

Chlorhydrate basique de quinine..	3 gr.
Antipyrine.....	2 —
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

En injectant 1 centimètre cube, on donne 20 centigrammes d'antipyrine et 30 centigrammes de quinine. Par la voie buccale l'antipyrine est bien acceptée.

Chez les nourrissons atteints de diarrhée, Saint-Philippe a formulé :

Antipyrine.....	05 ^r ,50
Sirop simple.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 50 gr.
Eau de tilleul.....	

Une cuillerée à café de deux en deux heures avant la tétée ou le repas; doubler la dose après un an.

Contre la chorée, je prescris 50 centigrammes par jour et par année d'âge jusqu'à 6 grammes, et je recommande de ne pas fractionner, l'enfant devant prendre à chaque fois au moins 1 gramme du médicament :

Antipyrine.....	20 gr.
Sirop d'écorces d'oranges.....	100 —
Eau distillée.....	200 —

Prendre par cuillerées à soupe (trois, quatre, cinq, six suivant l'âge : six, huit, dix, douze ans).

Contre l'incontinence d'urine, on donne le soir, à une heure d'intervalle, deux à trois paquets de 1 gramme d'antipyrine.

Antiseptie intestinale.

Les antiseptiques de l'intestin sont indiqués dans toutes les maladies du tube digestif, dans les maladies du foie, dans celles du rein, dans l'asystolie, dans les affections de l'appareil respiratoire, dans les maladies du système nerveux, dans les dermatopathies, dans les dyscrasies, dans les maladies infectieuses générales.

Les principaux agents employés sont : le naphtol, le bétol, le salol, le benzonaphtol, le bismuth dans ses diverses combinaisons (sous-nitrate, sous-carbonate, sous-gallate, salicylate, etc.), le calomel à doses fractionnées, les acides lactique et chlorhydrique, la créosote, la résorcine, la naphthaline, l'iодоforme, etc. On choisit les antiseptiques insolubles et on les donne par petits paquets en suspension dans le lait, l'eau sucrée, un looch, un julep gommeux, etc. Fractionner les doses.

La dose habituelle des antiseptiques peu toxiques (benzonaphtol, bismuth, etc.) est de 10 centigrammes à 30 centigrammes par année d'âge.

Au-dessous d'un an on formulera ainsi :

Benzonaphtol.....	} ãã 08 ^r ,10
Salicylate de bismuth.....	
Phosphate tribasique de chaux.....	

Pour un paquet; en prendre cinq semblables dans la journée (bonne formule quand il y a de la diarrhée).

S'il y a de la constipation :

Bétol ou salol.....	} ãã 08 ^r ,10
Magnésie calcinée.....	
Bicarbonat de soude.....	

Pour un paquet; cinq à six dans la journée.

En potion on formulera :

Benzonaphtol.....	} ãã 1 gr.
Dermatol.....	
Julep gommeux.....	

Prendre par cuillerées de deux en deux heures (agiter avant de s'en servir).

Pour faire avorter les angines, Saint-Philippe a donné jusqu'à 4 grammes de salol en vingt-quatre heures.

Moncorvo, dans la diarrhée infantile, a aussi donné le salol (1 à 2 gr. par jour dans une potion) :

Salol.....	1 gr.
Julep gommeux.....	100 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

J'ai prescrit la naphthaline de la façon suivante :

Naphthaline.....	1 gr.
Sucre en poudre.....	10 —
Essence de bergamotte.....	V gouttes.

Diviser en vingt paquets; en donner cinq à dix par jour.

Baginsky a conseillé l'association avec le calomel :

Naphthaline.....	08 ^r ,10
Calomel.....	08 ^r ,01
Sucre en poudre.....	08 ^r ,50

Pour un paquet; en prendre cinq à six par jour.

Le D^r Filatow a associé la naphthaline au bismuth :

Naphthaline.....	08 ^r ,10
Sous-nitrate de bismuth.....	08 ^r ,20

Pour un paquet; en prendre un toutes les trois heures (enfant de deux à trois ans).

Le dermatol, *sous-gallate de bismuth*, se prescrira à la dose de 25 à 50 centigrammes ou 1 gramme par jour.

Le calomel sera donné à doses fractionnées (1 à 2 centigr. par année d'âge); on s'abstiendra de le mêler à une autre substance chimique :

Calomel	0 ^{sr} ,01
Sucre de lait.....	0 ^{sr} ,50

Pour un paquet, n° 6. (à prendre de deux en deux heures dans une cuillerée à café de lait ou d'eau).

L'acide lactique est prescrit comme antiseptique dans la diarrhée verte des nourrissons (1 à 2 gr. par jour dans une potion).

L'acide chlorhydrique se prescrit dans le même but de la façon suivante :

Acide chlorhydrique dilué.....	IV gouttes.
Sirop de cannelle.....	20 gr.
Eau distillée.....	60 —

Une cuillerée à café d'heure en heure dans les diarrhées infectieuses.

La créosote se prescrit de la même façon.

Comme adjuvant de l'antiseptie intestinale, on prescrira les lavages de l'estomac et de l'intestin, la diète hydrique.

Antispasmine.

L'antispasmine, mélange de narcéine sodique et de salicylate de soude, a été prescrite par Demme dans la coqueluche, la laryngite striduleuse, etc. (1 centigr. par année d'âge) :

Antispasmine.....	0 ^{sr} ,05
Sirop de Tolu.....	15 gr.
Eau distillée.....	45 —

Par cuillerées à café d'heure en heure (enfant de quatre à cinq ans).

Antitoxines (Voy. SÉRUMS).

Apiol.

L'apiol, tiré du persil, est utilisé dans la dysménorrhée (capsules de 10 à 20 centigr.).

L'*apioline* cristallisée se prescrit par granules de 2 centigrammes (trois à six par jour).

Apocynum cannabinum.

L'apocynum cannabinum ou *chanvre canadien* (Apocynées) a été utilisé avec succès contre la dysenterie. On se sert de poudre de racine (1 à 5 centigr. par année d'âge), de teinture à 1 p. 5 à la dose de I à V gouttes par année d'âge. Chez une fille de cinq ans (*Indian Medical Record*, 13 déc. 1899), atteinte de dysenterie chronique, III gouttes de *teinture* prises toutes les trois heures pendant une semaine ont amené la guérison.

Apomorphine.

En injection sous-cutanée, ce médicament, qui est de la morphine moins une molécule d'eau, provoque des vomissements :

Chlorhydrate d'apomorphine.....	0 ^{sr} ,05
Eau stérilisée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Injecter chaque fois 1 cent. cub.

On peut aussi prendre des granules de 5 milligrammes à l'intérieur.

Arbutine.

L'arbutine, tirée de l'*Uva ursi*, se prescrit dans la cystite, la pyélonéphrite et autres catarrhes des voies urinaires, par granules de 4 centigrammes (trois à quatre par jour).

Arec.

La noix d'arec (*areca catechu*) est ténifuge : 50 centigrammes à 1 gramme de poudre dans du lait.

Arenaria rubra

Décoction (2 p. 100) diurétique; extrait aqueux (10 centigr. trois fois par jour).

Argent.

Le crayon de nitrate d'argent pur ou mitigé (parties égales de nitrate d'argent et de nitrate de potasse) sert à cautériser les bourgeons charnus, la muqueuse des paupières, etc. Dans ce dernier cas, on neutralise aussitôt avec un pinceau trempé dans l'eau salée. À l'intérieur, le nitrate d'argent a été prescrit contre le tabès et les maladies de la moelle épinière (1 centigr. en pilule avec kaolin).

En collyre à 1 p. 50 le nitrate d'argent a été préconisé par Créde pour prévenir l'ophtalmie des nouveau-nés; Budin emploie la solution à 1 p. 150, moins irritante. Dans la dysenterie ou les colites dysentériques, les lavements au nitrate d'argent (10 centigr. p. 100 gr.) sont très utiles.

Dans la fissure à l'anus, dans le prolapsus de l'urètre chez les petites filles, on peut toucher au pinceau avec la solution à 1 p. 50.

Argentamine. — Utilisée en collyre dans l'ophtalmie des nouveau-nés.

Argentol. — Prescrit en poudre pour remplacer l'iodoforme.

Protargol. — Combinaison d'argent avec une substance protéique (8 p. 100 d'argent), a été employé dans la blennorragie et l'ophtalmie purulente. Solution à 5 p. 100 pour badigeonner la conjonctive. Irrigation à

1 p. 1000. Dans la vulvo-vaginite, on a fait des injections au protargol à 1 p. 1000, 1 p. 200, 1 p. 100.

Argile.

Horn a traité par l'argile le cordon de 160 nouveau-nés avec un succès constant : ouate saupoudrée d'argile.

Aristol.

Le *dithymol iodé*, connu sous le nom d'aristol, renferme 45 p. 100 d'iode; il s'utilise en poudre ou en pomade à 1 p. 10 :

Aristol.....	3 gr.
Vaseline.....	30 —

Oncions matin et soir sur les surfaces eczémateuses, sur les engelures et crevasses des mains. La solution à 2 p. 100 dans l'huile de vaseline a été injectée dans les cavités d'abcès froids. On a donné l'aristol à l'intérieur dans la phthisie.

Armoise.

L'armoise se donne dans l'aménorrhée : *infusion* de sommités fleuries à 10 ou 15 grammes p. 500, *eau distillée* (20 à 100 gr. en potion), *essence* (1 gr. en potion), *sirop* (30 gr. en potion), *extrait* (1 à 2 gr.), *suc* (15 à 20 gr.).

Arnica.

Fleurs sèches en *infusion* (2 gr. p. 500), *teinture* à 1 p. 5, *alcoolature* par X à XX gouttes. Propriétés stimulantes.

Arrow-root.

Fécule extraite des rhizomes de *Maranta* (Jamaïque);

sert à faire des bouillies au lait. Elle s'associe, dans le mélange de Husson, à d'autres farines utiles :

Arrow-root.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 500 gr.
Farine d'avoine.....	
Sucre.....	
Sagou.....	
Cacao.....	400 —
Phosphate de chaux précipité.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 50 —
Vanille.....	1 —

Arsenic.

L'arsenic peut être employé dans le paludisme, la tuberculose, l'anémie pernicieuse, la leucémie et pseudo-leucémie, la chlorose, la scrofule, l'asthme, le diabète, le rhumatisme chronique, les tumeurs malignes, les névroses (chorée), les bronchites, les dermatoses.

Pour éviter l'accumulation, ne pas prescrire plus de quinze jours de suite; pour éviter l'irritation locale, le donner au moment des repas, le fractionner, le diluer. La *liqueur de Fowler* (arsénite de potasse) contient 1 centigramme d'acide arsénieux par gramme (XX gouttes) ou un demi-milligramme par goutte :

Acide arsénieux.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 5 gr.
Carbonate de potasse.....	
Alcoolat de mélisse.....	
Eau distillée.....	
	15 —
	500 —

Cette solution d'arsenic à 1 p. 100 doit se prescrire par gouttes (V, X, XV, XX) diluées dans un véhicule (julep gommeux, etc.).

On peut l'injecter sous la peau en remplaçant l'alcoolat de mélisse par l'eau de laurier-cerise :

Acide arsénieux.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 0sr,10
Carbonate de potasse.....	
Eau distillée.....	
— de laurier-cerise.....	
	10 gr.
	0sr,30

On injectera un quart ou une demi-seringue à la fois.

Renaut l'a prescrite en lavement :

Liqueur de Fowler.....	2 gr.
Eau distillée.....	50 —
Laudanum.....	XII gouttes.

Injecter 5 cent. cub. le matin et autant le soir.

La *liqueur de Pearson* est six fois moins forte (1 p. 600); elle est à base d'arséniate de soude :

Arséniate de soude.....	1 gr.
Eau distillée.....	600 —

Six grammes ou CXX gouttes contiennent 1 centigramme d'arséniate de soude.

L'eau de la Bourboule contient par litre 28 milligrammes d'arséniate de soude.

En moyenne, il faut donner 1 milligramme d'acide arsénieux par année d'âge et par jour.

La *liqueur de Boudin* est une solution d'acide arsénieux à 1 p. 1000. Elle se prescrit dans la chorée par 5, 10 grammes pour commencer, en augmentant de 5 grammes tous les jours jusqu'à 30 ou 35 et en redescendant à 10 grammes; c'est le traitement de la chorée tel que je l'ai formulé (voyez ce mot dans la première partie du volume).

E. Weill a prescrit un *beurre arsenical* donné aux choréiques sur des tartines de pain. Il fait prendre, en une fois, tous les deux jours, 5, 10, 15, 20, 25, 30 milligrammes d'acide arsénieux comme dans le traitement par la liqueur de Boudin.

Au lieu des préparations liquides, on peut donner les solides : granules de dioscoride à 1 milligramme d'acide arsénieux (un à cinq par jour dans l'asthme).

L'*arséniate de fer* peut aussi se donner en granules de 1 milligramme.

La médication arsénicale intensive ou trop prolongée expose à la dyspepsie, à la fièvre, à la pigmentation cutanée, à la paralysie polynévritique.

Arum.

Cazin a guéri un coquelucheux de trois ans avec 30 centigrammes de racine d'arum pulvérisée, donnée trois à cinq fois par jour.

Asa foetida.

Médicament fétide, se prescrit en lavement dans les névroses, la coqueluche, contre les oxyures :

Asa foetida.....	4 gr.
Huile d'olives.....	} aa 40 —
Décoction de guimauve.....	

Asaprol.

Antiseptique non irritant, l'asaprol a été prescrit à l'intérieur dans la fièvre typhoïde et la furonculose, à la dose de 10 à 20 centigrammes par année d'âge :

Asaprol.....	1 gr.
Anisette.....	20 —
Eau de menthe.....	40 —

Par cuillerées de trois en trois heures (enfant de cinq à six ans).

Asaret.

L'asaret ou cabaret est un vomitif.
Poudre de feuilles ou de racines : 50 centigrammes à 1 gramme. On l'a utilisé aussi comme sternutatoire.

Aseptol.

En solution à 5 ou 10 p. 100, cet antiseptique a été employé par Grognot dans la diphtérie :

Aseptol.....	1 ^{fr} .50
Glycérine.....	30 gr.

Touchez la gorge toutes les trois heures avec un pinceau trempé dans ce collutoire.

En même temps, on faisait bouillir de l'eau additionnée d'une cuillerée à soupe par litre de :

Aseptol.....	} aa 100 gr.
Glycérine.....	

Asperge.

La racine d'asperge, diurétique, fait partie des cinq racines apéritives du Codex. *Infusion* (10 à 15 gr. p. 500), *extrait de racines* (1 à 2 gr.), *extrait de pointes* (1 à 2 gr.), *sirop de pointes* d'asperge (15 à 20 gr.), *sirop des cinq racines* doit voici la formule :

Racines d'asperge.....	} aa 100 gr.
— d'ache.....	
— de fenouil.....	
— de persil.....	
— de petit houx.....	} 3000 —
Eau bouillante.....	
Sucre blanc.....	2000 —

Donner 20 à 30 grammes en potion.

Asparagine, principe actif de l'asperge : 2 à 5 centigrammes par année d'âge.

Aspirine.

Combinaison d'acide salicylique et d'acide acétique, l'aspirine est un succédané du salicylate de soude (rhumatisme articulaire).

La dose est de 25 centigrammes à 50 centigrammes par jour et par année d'âge. Bien toléré.

Atropine (Voy. BELLADONE).**Aubergine.**

Le suc de l'écorce peut être employé contre les ver-rues; l'aubergine porterait au sommeil (hypnotique alimentaire comme la laitue).

Un sirop fait avec l'extrait d'aubergine a été prescrit par le Dr Bussière contre la toux nerveuse, la coqueluche, la grippe.

Aunée.

La *racine d'aunée* (décoction de 15 gr. p. 500), le *sirop d'aunée* (20 à 30 gr. dans une potion), la *teinture* (2 à 4 gr.), l'*extract* (1 à 2 gr.), la *poudre* (2 à 4 gr.), ont été prescrits dans la scrofule, la bronchite, la diarrhée chronique, etc.

Comme tisane contre la bronchite, on a formulé :

Racine d'aunée.....	} aa	2 gr.
Lierre terrestre.....		
Hysope.....		
Eau bouillante.....		500 —
Miel blanc.....		30 —

Par demi-tasses dans la journée.

Hélénine. — A été préconisée contre la tuberculose et pour le pansement des plaies; agit bien dans la coqueluche: 1 centigramme par année d'âge.

Avoine.

La farine d'avoine sert à faire des bouillies pour les nourrissons.

Avenaline. — Gruau d'avoine torréfié et diastasé, contenant plus de glucose et de dextrine que la farine d'avoine ordinaire.

Voici les différences de composition des farines :

	AVENALINE.	AVOINE.	RIZ.	BLE.
Amidon.....	41,75	60,59	89	70,05
Matières azotées.....	14,50	14,39	7	15,25
Dextrine.....	28,25	9,25	1	7
Graisse et essences.....	5,50	5,50	0,75	1,95
Sels.....	3	3,25	1	2,75
Cellulose.....	7	7,02	1,25	3

Axonge.

Pour faciliter la conservation de cette matière grasse, vieil excipient des pommades, on y ajoute du benjoin (axonge benzoïnée) :

Axonge fraîche.....	500 gr.
Benjoin pulvérisé.....	20 —

Chauffez au bain-marie deux ou trois heures et passez.

On prépare alors les pommades :

1° Axonge benzoïnée.....	30 gr.
Oxyde de zinc.....	3 —
2° Axonge benzoïnée.....	30 gr.
Iodure de potassium.....	3 —

Certains dermatoses irritables supportent mieux les pommades à l'axonge que les pommades à la vaseline.

B

Badiane.

Le fruit de badiane ou *anis étoilé* se prescrit dans la dyspepsie flatulente et le météorisme : *poudre* (1/2 à 1 gr.), *infusion*, *macération* (1 p. 100), *eau distillée* (10 à 20 gr. dans une potion), *alcoolat* (10 à 20 gr. dans une potion).

Banane.

Fruit excellent qui convient aux enfants pour sa richesse et sa digestibilité.

Bardane.

La *racine* de bardane, qui contient de l'inuline, de l'amidon, des sels potassiques, s'emploie en *infusion* ou