

Un sirop fait avec l'extrait d'aubergine a été prescrit par le Dr Bussière contre la toux nerveuse, la coqueluche, la grippe.

Aunée.

La *racine d'aunée* (décoction de 15 gr. p. 500), le *sirop d'aunée* (20 à 30 gr. dans une potion), la *teinture* (2 à 4 gr.), l'*extract* (1 à 2 gr.), la *poudre* (2 à 4 gr.), ont été prescrits dans la scrofule, la bronchite, la diarrhée chronique, etc.

Comme tisane contre la bronchite, on a formulé :

Racine d'aunée.....	} aa	2 gr.
Lierre terrestre.....		
Hysope.....		
Eau bouillante.....		500 —
Miel blanc.....		30 —

Par demi-tasses dans la journée.

Hélénine. — A été préconisée contre la tuberculose et pour le pansement des plaies; agit bien dans la coqueluche: 1 centigramme par année d'âge.

Avoine.

La farine d'avoine sert à faire des bouillies pour les nourrissons.

Avenaline. — Gruau d'avoine torréfié et diastasé, contenant plus de glucose et de dextrine que la farine d'avoine ordinaire.

Voici les différences de composition des farines :

	AVENALINE.	AVOINE.	RIZ.	BLE.
Amidon.....	41,75	60,59	89	70,05
Matières azotées.....	14,50	14,39	7	15,25
Dextrine.....	28,25	9,25	1	7
Graisse et essences.....	5,50	5,50	0,75	1,95
Sels.....	3	3,25	1	2,75
Cellulose.....	7	7,02	1,25	3

Axonge.

Pour faciliter la conservation de cette matière grasse, vieil excipient des pommades, on y ajoute du benjoin (axonge benzoïnée) :

Axonge fraîche.....	500 gr.
Benjoin pulvérisé.....	20 —

Chauffez au bain-marie deux ou trois heures et passez.

On prépare alors les pommades :

1° Axonge benzoïnée.....	30 gr.
Oxyde de zinc.....	3 —
2° Axonge benzoïnée.....	30 gr.
Iodure de potassium.....	3 —

Certains dermatoses irritables supportent mieux les pommades à l'axonge que les pommades à la vaseline.

B

Badiane.

Le fruit de badiane ou *anis étoilé* se prescrit dans la dyspepsie flatulente et le météorisme : *poudre* (1/2 à 1 gr.), *infusion*, *macération* (1 p. 100), *eau distillée* (10 à 20 gr. dans une potion), *alcoolat* (10 à 20 gr. dans une potion).

Banane.

Fruit excellent qui convient aux enfants pour sa richesse et sa digestibilité.

Bardane.

La *racine* de bardane, qui contient de l'inuline, de l'amidon, des sels potassiques, s'emploie en *infusion* ou

décoction (15 gr. pour 500); on prépare aussi un *sirop* (20 à 30 gr.), un vin, une *teinture* (5 à 10 gr.), un *extrait* (1 à 5 gr.)

La bardane serait un sudorifique, diurétique, dépuratif (dermatoses).

Baryum.

Ce médicament a été préconisé contre la scrofule.

1 ^o Chlorure de baryum.....	0 ^{sr} ,10
Eau distillée.....	100 gr.

Par cuillerées de deux en deux heures.

2 ^o Chlorure de baryum.....	0 ^{sr} ,10
Sirop simple.....	50 gr.
Eau.....	200 —

3 ^o Chlorure de baryum.....	2 gr.
Eau distillée.....	15 —

Prendre X à XV gouttes dans un verre d'eau sucrée (ophtalmies scrofuleuses — Siebel).

4 ^o Chlorure de baryum.....	0 ^{sr} ,50
Extrait de gentiane.....	5 gr.
Poudre de gentiane.....	Q. S.

Pour cent pilules, deux matin et soir.

5 ^o Iodure de baryum.....	0 ^{sr} ,20
Axonge.....	30 gr.

Onctions sur les engorgements scrofuleux.

Baume du Pérou.

Résine balsamique prescrite surtout pour l'usage externe :

1 ^o Baume du Pérou.....	10 gr.
— nerval.....	20 —
Eau de Cologne.....	30 —

Liniment pour les crevasses des mains, les engelures, etc.

2 ^o Baume du Pérou.....	aa 20 gr.
Glycérolé d'amidon.....	

Pommade pour la gale des enfants (une seule friction peut suffire). L'enfant après la friction remet sa chemise et la garde jusqu'au lendemain.

A l'intérieur, on a prescrit par cuillerées la potion suivante :

Baume du Pérou.....	1 gr.
Gomme arabique.....	5 —
Sirop d'orgeat.....	30 —
Eau.....	120 —

Baumes.

Il y a plusieurs variétés usitées en médecine :

1^o *Baume du commandeur* ou teinture balsamique du Codex, employé dans le pansement des coupures et plaies, c'est une sorte de teinture (alcool à 80°) de plantes telles que l'hypericum, l'angélique, la myrrhe, l'oliban, etc.

2^o *Baume de Fioravanti*, encore un alcool chargé de principes aromatiques (térébenthine, styrax, etc.).

3^o *Baume nerval*, à base d'huile, de moelle de bœuf avec un peu d'alcool et de camphre.

4^o *Baume opodeldoch* contient plus d'alcool et de camphre que le précédent, du savon animal, de l'ammoniaque, etc.

5^o *Baume tranquille*, sédatif, à base de solanées (huile de jusquiame composée).

Belladone.

Médicament très employé, diminue les sécrétions, calme les spasmes, etc. On emploie l'*extrait* de feuilles ou de racines, la *teinture de feuilles*, le *sirop* fait avec cette teinture (75 centigr. pour 10 gr.). En poudre on peut prescrire 1 centigramme par année d'âge; même dose pour l'extrait. La teinture à 1 p. 5 (alcool à 60°) est très employée (II gouttes par année d'âge).

Le sulfate d'atropine se prescrit en granules de 1 milligramme ou en solution au millièmes pour l'usage interne :

Sulfate neutre d'atropine.....	0 ^{gr} ,01
Eau distillée.....	10 gr.

XX gouttes représentent un milligr.

On commence par II gouttes par année d'âge et on augmente suivant la tolérance.

Pour l'usage externe on se sert de solutions à 1 p. 300, 1 p. 500, et on instille I goutte dans l'œil matin et soir.

La belladone est indiquée dans les bronchites à sécrétions abondantes, dans les toux spasmodiques, dans la coqueluche, dans le coryza, dans la laryngite striduleuse. On l'emploie aussi dans la constipation, les coliques, la fissure anale, l'incontinence d'urine, les convulsions, la chorée, etc. Voici quelques formules :

1 ^o Teinture de belladone.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 5 gr.
Alcoolature de racines d'aconit.....	

X, XX, XXX gouttes en quatre ou cinq fois dans la journée avec une cuillerée à café d'eau sucrée comme véhicule.

2 ^o Teinture de belladone.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 2 gr.
— de drosera.....	
— de grindelia.....	
Alcoolature de racines d'aconit.....	
Elixir parégorique.....	
Eau de laurier-cerise.....	

Donner V à X gouttes trois à quatre fois par jour; augmenter d'une goutte par prise tous les jours jusqu'à effet.

3 ^o Teinture de belladone.....	XXX gouttes.
Sirop de fleurs d'oranger.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 10 gr.
— de codéine.....	
Eau distillée.....	60 —

Par cuillerées à café de deux en deux heures.

4 ^o Teinture de belladone.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 5 gr.
— de cannelle.....	
— de colombo.....	

Dans les douleurs intestinales, IV à X gouttes avant le repas (J. Simon).

5 ^o Teinture de belladone.....	5 gr.
Elixir parégorique.....	10 —

Prendre XL à LX gouttes par jour, dans les menstruations douloureuses (J. Simon).

6 ^o Teinture de belladone.....	10 gr.
— de valériane.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 5 —
— de digitale.....	

V à LX gouttes par jour dans la coqueluche avec faiblesse du cœur (H. Roger).

7 ^o Poudre de racines de belladone.....	0 ^{gr} ,05
Sucre en poudre.....	0 ^{gr} ,25

Pour un paquet, deux à huit par jour suivant l'âge (Sandras).

8 ^o Poudre de belladone.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 0 ^{gr} ,05
Extrait de belladone.....	

Pour une pilule; une matin et soir écrasée avec confiture, sirop, miel, lait sucré, etc. (Trousseau).

9 ^o Sirop de belladone.....	50 gr.
— de Tolu.....	150 —

Une cuillerée à café en deux ou trois fois dans la première enfance, puis augmenter par demi-cuillerée jusqu'à sédation des quintes de coqueluche. Au-dessus de sept ans, on commence par deux cuillerées à café et on va progressivement jusqu'à la rougeur des pommettes et la dilatation des pupilles (C. de Gassicourt).

10 ^o Sirop de belladone.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 30 gr.
— de codéine.....	
Bromure de potassium.....	2 —
Eau de fleurs d'oranger.....	40 —

Une cuillerée à café matin et soir à trois ans; trois cuillerées par jour au-dessus de cet âge.

S'il s'agit d'atropine, prenant la solution au millièmes, on donne I goutte trois fois par jour au-dessous d'un an, II gouttes au-dessus et on augmente graduellement. J. Simon a pu donner ainsi, à trois ans, XL gouttes, soit 2 milligrammes de sulfate d'atropine.

Contre l'épilepsie, il est bon d'associer le bromure de potassium à la belladone :

Extrait de belladone.....	0 ^{gr} ,10
Bromure de potassium.....	10 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères.....	200 —

Une cuillerée à café matin et soir pour les nourrissons, à dessert dans la seconde enfance, à soupe à partir de dix ans.

Pour l'usage externe, on prescrit des pommades ou des liniments à la belladone :

1 ^o Vaseline.....	30 gr.
Extrait de belladone.....	4 —
2 ^o Onguent napolitain.....	30 gr.
Extrait de belladone.....	4 —
3 ^o Huile d'olives.....	30 gr.
Extrait de belladone.....	4 —

On peut encore prescrire la belladone en suppositoires pour calmer les douleurs ou épreintes, ou pour faciliter les évacuations (1 centigr. d'extrait par année d'âge) :

1 ^o Extrait de belladone.....	0 ^{sr} .05
Beurre de cacao.....	3 gr.

F. S. A. — Un suppositoire pour enfant de cinq ans.

2 ^o Extrait de belladone.....	0 ^{sr} .01
Aloès.....	0 ^{sr} .10
Glycérine.....	1 gr.
Suppositoire creux au beurre de cacao.....	N ^o 1.

Ce suppositoire convient aux enfants très constipés.

Comme sirop de dentition, on peut formuler :

Sirop de belladone.....	10 gr.
Chlorhydrate de cocaïne.....	0 ^{sr} .25

Benjoin.

Le baume retiré par incision du *styrax benjoin* agit sur la sécrétion urinaire et sur le catarrhe des bronches et du larynx. La *teinture de benjoin* en badigeonnage agit bien contre les engelures et crevasses des mains. Elle se donne à l'intérieur à la dose de 1 à 2 grammes en potion. Injectée dans la narine, chez un enfant de douze ans (4 gr.), elle a permis d'arrêter une épistaxis grave (F. Barker).

La poudre de benjoin a été insufflée dans les narines des coquelucheux :

Poudre de benjoin.....	} àà 5 gr.
Salicylate de bismuth.....	
Sulfate de quinine.....	1 —
	(Moizard).

Benoite.

La racine de benoite en poudre, décoction, infusion, teinture, extrait, essence, a été employée dans les dyspepsies et entérites, dans l'asthme, la coqueluche, le paludisme :

Racines de benoite fragmentée.....	30 gr.
Eau bouillante.....	1000 —
Après réduction d'un tiers ajoutez sirop d'écorces d'orange.....	30 —

Benzanilide.

Moins toxique que l'acétanilide, se prescrit à la dose de 5 centigrammes par année d'âge.

Benzine.

Parasiticide, peut se prescrire contre les poux et la gale :

Benzine.....	10 gr.
Axonge.....	50 —

Frictions matin et soir.

La benzine tue les trichines. On l'a essayée dans la coqueluche, en émulsion (X, XV, XX gouttes). On répand en même temps quelques gouttes sur les draps.

Contre les piqûres du rouget, on a conseillé les applications de benzine pure ou un liniment analogue au suivant (Labesse) :

Benzine.....	60 gr.
Huile de vaseline.....	30 —
Naphtaline.....	} àà 2 —
Essence d'andropogon citratus.....	
	18.

Benzoate de mercure (Voy. MERCURE).

Benzoate de naphtol (Voy. NAPHTOLS).

Benzoate de soude.

Anticatarrhal et antiacide, ce médicament convient dans les cas d'uricémie, de bronchite, de coqueluche. Sirop balsamique (Yvon et Dujardin-Beaumetz) :

Benzoate de soude.....	10 gr.
Sirop de térébenthine ou tolu.....	390 —

Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 50; en prendre deux à trois par jour dans une infusion de violettes.

Formule magistrale :

Benzoate de soude.....	2 gr.
Sirop d'asperges.....	10 —
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 —
Eau distillée.....	60 —

Par cuillerées à dessert de deux en deux heures.

Bétoine.

La poudre de cette labiée sert de sternutatoire pour le coryza, l'ozène, etc. :

Bétoine.....	} aa
Sauge.....	
Marjolaine.....	

Bétol.

Le bétol est une combinaison d'acide salicylique avec le naphtol β ; on le prescrit comme antiseptique intestinal :

Bétol.....	} aa 0,07, 20
Salicylate de bismuth.....	
Craie préparée.....	

Pour un paquet, n° 5; à prendre toutes les deux ou trois heures.

Bétol.....	1 gr.
Julep gommeux.....	60 —

Prendre par cuillerées à soupe toutes les deux ou trois heures.

Bette.

Le suc de betterave (*Beta vulgaris*) a été employé comme sternutatoire et dans les ophthalmies. On s'est servi de la queue des feuilles ou de la racine convenablement taillée comme suppositoires laxatifs chez les nourrissons. Les feuilles de *poirée* (variété de betterave) peuvent se manger comme salade cuite avec ou sans addition d'oseille. Elles se recommandent aux dyspeptiques constipés.

Beurre.

Le beurre frais agit bien contre la constipation des enfants allaités artificiellement (Dorfer) :

Une demie à une cuillerée à café matin et soir de deux à trois mois. deux à trois cuillerées à café à partir de trois à quatre mois, une à trois cuillerées à soupe entre cinq et douze mois.

Dans l'anémie et le rachitisme, on se trouve également bien de l'usage du beurre.

Biberon.

Le biberon doit être le plus simple possible : flacon lisse, pas de tube, une simple tétine en caoutchouc non vulcanisé. On aura deux tétines, l'une restant plongée dans l'eau bouillie boriquée pendant que l'autre est en service. Après la tétée, on jette le lait qui reste et on nettoie le biberon à l'eau savonneuse, on le rince à l'eau bouillie. Quand on fait chauffer les flacons au bain-marie (méthode Soxhlet), la propreté du biberon est assurée.

Biscottes.

Les biscottes, *biscottes de Bruxelles*, *biscottes de Hambourg*, sont des tranches de pain de gruau séchées

au four et légèrement torrifiées à la surface; elles contiennent un peu de beurre et de jaune d'œuf; servent à faire des panades : Faire bouillir de l'eau, ajoutez la biscotte fragmentée, du beurre, du sel, faites cuire assez longtemps et, avant de servir, délayez un jaune d'œuf. On peut faire des potages au lait.

La *biscotte de légumine*, imaginée par le D^r Bovet, contient, pour cent :

Matières azotées.....	17 ^{gr} ,50 à 18 ^{gr} ,50	
— hydrocarbonées.....	62 gr.	
Phosphore organique.....	3 ^{gr} ,35	} 6,55
Phosphates alcalino-terreux.....	3 ^{gr} ,20	

Cette substance est donc très riche.

Bismuth.

Ce métal ne s'emploie qu'à l'état de sels.

Sous-nitrate de bismuth. — Remède vulgaire de la diarrhée, à la dose de 20 centigrammes par année d'âge :

1^o Sous-nitrate de bismuth..... 0^{gr},20

Pour un paquet, en prendre quatre ou cinq dans la journée.

2 ^o Sous-nitrate de bismuth.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 0 ^{gr} ,20
Benzonaphtol.....	
Poudre de semences d'anis.....	

Pour un paquet, n^o 5.

3 ^o Sous-nitrate de bismuth.....	2 gr.
Elixir parégorique.....	XX gouttes.
Sirop de coings.....	20 gr.
Eau distillée.....	100 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

On l'a employé en suspension dans l'eau pour les gonorrhées, en poudrage sur les plaies, en pommade :

1 ^o Sous-nitrate de bismuth.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 20 gr.
Poudre de talc.....	
— de lycopode.....	
Amidon.....	

Poudrer matin et soir (érythèmes, eczemas suintants).

2 ^o Sous-nitrate de bismuth.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 5 gr.
Oxyde de zinc.....	
Axonge benzoïnée.....	

Oncions matin et soir (eczéma).

Sous-carbonate de bismuth. — Se prescrit comme le précédent :

1 ^o Sous carbonate de bismuth.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 0 ^{gr} ,20
Craie préparée.....	
Benzonaphtol.....	

Pour un paquet, trois par jour dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée.

2 ^o Sous-carbonate de bismuth.....	2 gr.
Laudanum.....	II gouttes.
Sirop de ratanhia.....	20 gr.
Eau distillée.....	80 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

Salicylate de bismuth. — Se prescrit comme antiseptique intestinal, à la dose de 10 centigrammes par année d'âge :

1 ^o Salicylate de bismuth basique.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 0 ^{gr} ,20
Benzonaphtol.....	
Bicarbonate de soude.....	

Pour un paquet; trois à cinq dans la journée.

Dans l'entérite muco-membraneuse, Revilliod a injecté dans l'intestin :

2 ^o Salicylate de bismuth.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 10 gr.
Sous-nitrate de bismuth.....	
Mucilage de pépins de coings.....	

Benzoate de bismuth. — Serait préférable au salicylate, d'après Vigier, à cause de l'innocuité de l'acide benzoïque.

Mêmes doses.

Sous-gallate de bismuth ou dermatol. — A été proposé

pour remplacer l'iodoforme, car il n'est pas toxique. Se prescrit en poudre, en pommade, en paquets :

1° Dermatol.....	} aa 20 gr.
Lycopode.....	
Talc.....	
Amidon.....	

Saupoudrer les érythèmes et eczémas.

2° Dermatol.....	4 gr.
Vaseline.....	40 —

Onctions sur les parties irritées.

3° Dermatol.....	} aa 0 ^{sr} .20
Benzonaphtol.....	

Pour un paquet ; en prendre trois à quatre par jour dans une cuillerée à café de lait ou d'eau sucrée.

Bismuthol ou *phosphosalicylate de soude et bismuth*. — S'emploie en poudre, en pommade (1 p. 10), en solution (1 p. 50).

Airol ou *oxyiodogallate basique de bismuth*, ou *dermatol iodé*. — Succédané de l'iodoforme, s'emploie en poudre, en pommade à 1 p. 10 ou 1 p. 5, en émulsion dans la glycérine et l'eau stérilisée :

1° Airol.....	5 gr.
Vaseline, lanoline, axonge.....	30 à 50 gr.

Onctions matin et soir.

2° Airol.....	10 gr.
Glycérine.....	} aa 50 —
Eau stérilisée.....	

Lotions ou injections nasales, oculaires, auriculaires, vulvaires, etc.

Bismulose. — Combinaison albumineuse de bismuth, poudre blanche insipide, à prescrire contre la diarrhée. Doses de 25 à 50 centigrammes suivant l'âge répétés quatre à cinq fois par jour. La bismulose contiendrait 22 p. 100 de bismuth. Je l'ai trouvée efficace.

Elle peut servir à poudrer les plaies, l'érythème des fesses, etc.

Bleu de méthylène.

Dans le paludisme, Moncorvo a donné aux enfants 20 à 40 centigrammes de bleu de méthylène.

Le Dr Warren Allen a traité les eczémas infantiles avec une solution à 3 p. 100. Achard et Castaigne s'en servent pour mesurer la perméabilité rénale :

Bleu de méthylène.....	1 gr.
Eau.....	20 —

Une seringue de Pravaz contient 5 centigrammes qu'on peut injecter aux grands enfants. Ils urinent tous les quarts d'heure et on notera le moment d'apparition des urines bleues. Chez un sujet sain, le bleu doit paraître une demi-heure après, et cesser après quarante heures.

Bois de Panama (Voy. QUILLAJA).

Boldo.

Médicament conseillé contre les maladies du foie; infusion de feuilles (5 gr. p. 500), teinture à 1 p. 5 (II à V gouttes par année d'âge).

Boldine. — Granules de 1 milligramme (une pour deux années d'âge); excitant de la digestion et de la sécrétion biliaire.

Boucles d'oreilles

Lavage soigné des mains de l'opérateur, des oreilles à percer, stérilisation des instruments (trocart, fils d'argent). Percer à 6 millimètres de l'attache du lobule, introduire le fil d'argent, le mobiliser trois fois par jour. Castueil conseille de ne pas opérer avant trois ans,

vers cinq ans de préférence. S'il y a scrofule, syphilis, ne pas percer.

Bouillon blanc (Voy. MOLÈNE).

Bourrache.

Infusion ou décoction (5 gr. de feuilles sèches p. 500 gr. d'eau). Tisane sudorifique recommandée dans les fièvres éruptives.

Bromaline.

Ce corps est du *bromure de potassium* antiseptisé pour éviter le bromisme; il se prescrit par 2, 4, 6 à 8 grammes, étant mieux toléré que le bromure pur.

1 ^o Bromaline.....	1 gr.
Pour un paquet; en prendre quatre à six par jour dans l'eau sucrée.	
2 ^o Bromaline.....	10 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 —
Eau distillée.....	40 —
En prendre trois cuillerées à dessert par jour.	

Bromidia.

Cet hypnotique aurait pour composition :

Bromure de potassium.....	} ãã 6 gr.
Chloral.....	
Extrait de cannabis indica.....	} ãã 0 ^{sr} .05
— de jusquiame.....	
Eau.....	Q. S. p. faire 32 gr.
Par cuillerées à café d'heure en heure jusqu'à effet.	

Chez l'enfant on peut remplacer par :

Bromure de potassium.....	} ãã 3 gr.
Hydrate de chloral.....	
Extrait de chanvre indien.....	} ãã 0 ^{sr} .05
— de jusquiame.....	
Sirop de fleurs d'oranger.....	} ãã 30 gr.
Eau distillée.....	
Par cuillerées à café d'heure en heure jusqu'à effet.	

Bromoforme.

Prescrit dans la coqueluche, ce liquide, toujours très lourd, est d'un maniement délicat; il faut agiter avant de s'en servir et exiger des préparations fraîches. On donne IV gouttes par année d'âge, en augmentant tous les jours de II à IV gouttes jusqu'à effet :

Bromoforme.....	XX gouttes.
Looch huileux du codex.....	60 gr.

A prendre en trois ou quatre doses dans la journée (enfant de cinq ans).

Bromures.

Les bromures sont sédatifs, anesthésiants, paralysants, hypnotiques; à doses élevées ou trop prolongées, ils causent des accidents (*bromisme*): gastralgie, diarrhée, épistaxis, paralysies, acné, papules, érythèmes, cachexie, etc.

En supprimant le sel de l'alimentation, Ch. Richet et Toulouse ont accru l'action des bromures et permis de donner des doses deux ou quatre fois moindres.

C'est dans les maladies nerveuses que les bromures sont indiqués: épilepsie, éclampsie, méningites, tétanos, spasmes du larynx, chorée, insomnie, céphalalgie, palpitations, tachycardie, coqueluche, etc. En cas d'urgence, la dose de bromure de potassium sera élevée (20, 50 centigr. et même 1 gr. par année d'âge):

1 ^o Bromure de potassium.....	10 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	50 —
Eau distillée.....	150 —
Une cuillerée à soupe de trois en trois heures jusqu'à effet.	

2 ^o Bromure de potassium.....	} ãã 5 gr.
— de sodium.....	
— d'ammonium.....	
Sirop d'écorces d'oranges.....	100 —
Eau.....	200 —

Par cuillerées à café, à dessert, à soupe suivant l'âge (deux à quatre par jour).

Le *bromure de strontium* se prescrit de même.

Le *bromure d'or* (Goubert) se donne par milligrammes dans l'épilepsie (3 à 6 granules par jour).

Le *bromure d'éthylène* (Donath) se donne à la dose de X à XX gouttes deux fois par jour d'une émulsion (épilepsie) :

Bromure d'éthylène.....	1 gr.
Essence de menthe.....	V gouttes.
Huile d'amandes douces.....	20 gr.

Le *bromure de nickel* peu usité se donnerait à la dose de 30 à 40 centigrammes par jour.

Le *bromure de camphre* se donne à la dose de 10 centigrammes répétée trois ou quatre fois par jour.

Contre l'épilepsie, on a encore essayé le *bromure d'ammonium et de rubidium* :

Bromure d'ammonium et de rubidium.....	15 gr.
Sirop de menthe.....	100 —
Eau distillée.....	200 —

Une cuillerée à potage trois à quatre fois par jour.

Bromure d'éthyle.

Ce sel s'emploie en inhalation pour produire une anesthésie de courte durée (5, 10, 15 gr.) dans l'opération des adénoïdes.

Bryone.

Prescrite dans les affections de l'appareil respiratoire, les bronchites, la coqueluche, la bryone se donne en *poudre de racines* (1 paquet de 20 centigr. quatre à cinq fois par jour), en décoction (8 gr. par litre), en teinture (2 gr.) :

Teinture de bryone.....	} aa	1 gr.
— de drosera.....		
— de grindelia.....		
Sirop de terpine.....	20 —	
Eau distillée.....	60 —	

Par cuillerées à dessert de deux en deux heures.

La *bryonine* combattrait la paresse du cœcum et du côlon (3 à 5 milligr. par jour).

Buchu.

La poudre de feuilles (1 à 2 gr.), l'infusion (15 gr. p. 500), l'eau distillée, la teinture s'emploient comme diurétiques et dans les maladies de vessie.

Buglosse.

S'emploie comme la bourrache; feuilles et fleurs en infusion ou décoction (10 à 30 gr. suivant qu'elles sont sèches ou fraîches p. 500).

Bugrane.

Décoction de racines (5 à 10 p. 500); est diurétique.

Buis.

Les feuilles sont purgatives et vermifuges, le buis est sudorifique. Décoction de feuilles (3 à 4 gr. p. 500), d'écorces de racines (15 gr.), racine entière (30 gr.).

Busserole.

La busserole, ou *uva ursi*, est diurétique : feuilles en poudre (1 à 2 gr.), infusion, décoction (5 à 6 gr. p. 500).

Sirop d'uva ursi (20 à 30 gr.).

C

Cacao.

Le cacao, graine du theobroma, contient une matière grasse (beurre de cacao), des albuminoïdes, de la théo-