

diatiques et diurétiques à la *convallarine* et à la *convallamarine* (glucosides de la fleur et de la tige). Extrait aqueux en sirop (2 p. 100 : deux à trois cuillerées à dessert par jour). Teinture (V gouttes par année d'âge).

*Convallamarine* : 2 à 4 centigrammes, en granules de un demi-centigramme.

#### Mûrier.

Le sirop de mûres est fait avec les baies de mûrier noir; il sert à édulcorer les gargarismes astringents : 20 à 40 grammes pour 250 d'infusion ou décoction de feuilles de ronces, etc. L'écorce de racine serait anthelminthique : 15 grammes en décoction dans 250 grammes d'eau.

#### Musc.

Substance animale (glande ventrale du *moschus moschiferus*), d'odeur très forte, d'un prix très élevé. Antispasmodique. La teinture alcoolique à 1 p. 10 se donne à la dose de X à XX gouttes dans une potion. Le lavement de musc se formule ainsi :

Musc.....	0gr,50
Jaune d'œuf.....	N° 1.
Eau de guimauve.....	150 gr.

#### Muscade.

Médicament stimulant, entre dans la composition du liniment de Rosen. Teinture à 1 p. 8 (1 à 2 gr. en potion). Essence (II à V gouttes).

#### Myrrhe.

Substance stimulante et stomachique. Teinture à 1 p. 5 ou 1 p. 10 (V à X gouttes). Eau distillée. La myrrhe entre dans l'*élixir de Garus*, le *baume du commandeur*. On l'a conseillée dans le scorbut (une cuillerée

à café de teinture dans une infusion ou décoction astringente).

#### Myrte.

Infusion de 10 à 15 grammes de feuilles ou de baies dans 500 grammes (catarrhes urinaires et intestinaux).

### N

#### Naphtaline.

L'insolubilité de ce produit l'avait fait administrer comme antiseptique intestinal avant le naphtol :

Naphtaline.....	1 gr.
Sucre en poudre.....	10 —
Essence de bergamote.....	V gouttes.

Faire vingt paquets; en prendre cinq à dix par jour, suivant l'âge.

Baginsky l'a associée au calomel :

Naphtaline.....	0gr,10
Calomel.....	0gr,01
Sucre en poudre.....	0gr,20

Pour un paquet; cinq à six par jour.

On peut encore l'associer au bismuth (Filatow) :

Naphtaline.....	0gr,10
Sous-nitrate de bismuth.....	0gr,15

Pour un paquet; en prendre un toutes les trois heures.

Bongers l'a donnée en potion :

Naphtaline très pure.....	0gr,30
Mucilage de gomme.....	} à 40 gr.
Eau de camomille.....	

Une cuillerée à café de deux en deux heures; agiter avant de s'en servir.

Contre les oxyures, Rossbach prescrit un lavement le soir avec :

Naphtaline.....	1 à 2 gr.
Huile d'olives.....	50 gr.

Dans l'eczéma, le psoriasis, etc., on a fait des onctions avec :

Naphtaline.....	3 gr.
Axonge benzoïnée.....	30 —

### Naphtol.

Le naphtol  $\beta$  a été prescrit en pommade contre le psoriasis :

Naphtol $\beta$ .....	10 gr.
Vaseline.....	90 —

Ch. Bouchard l'a prescrit comme antiseptique intestinal (2 gr. 50 chez l'adulte); Maximovitch a fait voir que le naphtol  $\alpha$  était préférable. Eau naphtolée à 1 p. 5000 employée en lavages, irrigations, etc. Dans la diarrhée, l'embaras gastrique, je prescrivais autrefois :

Naphtol $\alpha$ ou $\beta$ .....	0 <sup>sr</sup> ,20
Sucre en poudre.....	1 gr.

Pour un paquet ; en prendre quatre à cinq par jour.

Aujourd'hui nous préférons le benzonaphtol, mieux toléré, qu'on prescrit seul ou associé au bismuth, à la magnésie, etc.

*Naphtol camphré* (Desesquelle), liquide sirupeux obtenu en mêlant et chauffant :

Naphtol $\beta$ .....	100 gr.
Camphre.....	150 —

Ménard, après avoir ponctionné les abcès froids, injecte dans leur cavité 30 à 60 grammes de ce liquide. Rendu l'a injecté dans la péritonite tuberculeuse.

Pour badigeonner la gorge dans la diphtérie et la scarlatine, j'ai employé :

Naphtol camphré.....	} aa 30 gr.
Glycérine.....	

*Naphtol sulfuriciné*, préparé en mêlant dix ou vingt parties de naphtol à 100 de sulfuriciné de soude; sert aux badigeonnages de la gorge :

Naphtol $\beta$ .....	10 gr.
Sulfuriciné de soude.....	90 —

*Benzonaphtol*, se prescrit pour l'antisepsie intestinale, en paquets fractionnés ou en suspension dans un julep :

1 <sup>o</sup> Benzonaphtol.....	} aa 0 <sup>sr</sup> ,25
Sous-nitrate de bismuth.....	

Pour un paquet ; en prendre trois à cinq par jour, dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée (diarrhée).

2 <sup>o</sup> Benzonaphtol.....	} aa 0 <sup>sr</sup> ,20
Magnésie calcinée.....	
Bicarbonate de soude.....	

Pour un paquet ; en prendre trois à six par jour (s'il y a tendance à la constipation).

3 <sup>o</sup> Benzonaphtol.....	1 gr.
Sirop de coings.....	30 —
Eau distillée.....	70 —

Agiter avant de s'en servir; prendre par cuillerées, dans les vingt-quatre heures.

### Narcéine (Voy. OPIUM).

#### Navet.

Dans la bronchite et la coqueluche, on a conseillé l'infusion et la décoction de racines et de graines de navet.

#### Nénuphar.

Infusion de fleurs de *nymphaea alba* (1 p. 100) émol-

liente, calmante; infusion et décoction de racines de *nymphaea lutea* (10 p. 100) diurétiques.

#### Nerprun.

Sirop fait avec les baies; purgatif. Je l'associe à l'eau-de-vie allemande (1 gr. de chaque par année d'âge).

#### Nickel.

Sulfate de nickel (5 centigr. pour 10 gr.) peut être employé en collyre comme le sulfate de zinc. Simpson l'a prescrit dans la migraine (25 millig. 2 à 3 fois par jour).

#### Nigelle.

Graines stimulantes qui seraient anthelminthiques, galactagogues, engraisantes ?

#### Nirvanine.

Chlorhydrate d'éther méthylique, la nirvanine serait un succédané de la cocaïne (solution à 5 p. 100).

#### Nitrite d'amyle.

Inhalations de IV à V gouttes sur un mouchoir dans l'asthme, l'épilepsie, l'hystérie, la chorée, la tétanie, la migraine, l'éclampsie, le tétanos, la rage, le mal de mer.

#### Noisetier.

L'huile de noisette est utilisée en dermatologie; l'écorce de noisetier serait astringente et fébrifuge.

#### Noix vomique.

Les semences de *strychnos nux vomica* contiennent la strychnine et la brucine (Pelletier et Caventou-1818),

poisons convulsants ou tétanisants qui se retrouvent aussi dans la *fève de Saint-Ignace* (gouttes amères de Baumé).

La noix vomique et la strychnine sont indiquées dans la débilité nerveuse, le collapsus cardiaque, les états paralytiques, l'incontinence d'urine, la spermatorrhée, la chorée (Trousseau a donné 30 centigr. d'extrait de noix vomique par jour dans la chorée), dans les maladies du poumon, dans la dyspepsie et l'atonie intestinale, la dilatation de l'estomac et la constipation, le prolapsus rectal.

La poudre de noix vomique se prescrit à la dose maxima de *un centigramme* par jour et par année d'âge, avec interruption au bout de huit à dix jours, car le médicament s'accumule :

Poudre de noix vomique.....	0 <sup>gr</sup> ,01
Pepsine.....	0 <sup>gr</sup> ,10
Magnésie calcinée.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 0 <sup>gr</sup> ,20
Bicarbonate de soude.....	

Pour un paquet; en prendre deux ou trois par jour, avant le repas, dans une cuillerée à café d'eau sucrée, de sirop ou de lait.

Je préfère la poudre à la teinture de noix vomique, qu'on peut prescrire à la dose de I à II gouttes par année d'âge, soit seule, soit associée à la gentiane :

Teinture de noix vomique.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 5 gr.
— de gentiane.....	

En prendre V à X gouttes, deux fois par jour, avant le repas.

Contre l'incontinence d'urine, on peut prescrire X à XX gouttes le soir du mélange :

Teinture de noix vomique.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 3 gr.
— de rhus aromatica.....	
— de quinquina.....	

La *liqueur de Baumé* se prescrit à la même dose que la teinture de noix vomique (I à II gouttes par année d'âge).

L'extrait alcoolique (8 parties d'alcool à 80° et 1 de noix vomique) se donne à la dose de 1 centigramme par année d'âge.

La *strychnine* doit être prescrite à dose dix fois moindre : au maximum *un milligramme* par jour et par année d'âge.

Le *sulfate de strychnine* est soluble dans dix parties d'eau froide; on peut dès lors faire des injections hypodermiques avec :

Sulfate de strychnine.....	0 <sup>87</sup> ,01
Eau distillée.....	10 cent. cub.

Faire une à deux injections par jour.

On peut donner des granules de sulfate de strychnine dosés à un *milligramme* ou un *sirop* à 5 milligrammes par 20 grammes. C'est dans la chorée et dans l'incontinence d'urine qu'on a surtout donné de fortes doses de strychnine. Trousseau a prescrit jusqu'à 25 milligrammes de sulfate par jour; Vogel a prescrit jusqu'à 7 milligr. 1/2 de nitrate de strychnine au dessus de trois ans.

Pour l'usage externe, on formulera des onctions avec :

Strychnine.....	1 gr.
Axonge ou lanoline.....	30 —

#### Nosophène.

Poudre jaune antiseptique, pouvant remplacer l'iodeforme (60 p. 100 d'iode). C'est un tétraiodophénolphtaléine.

#### Noyer.

Feuilles et fruits d'une astringence remarquable. Infusion de feuilles (1 à 2 p. 100). Décoction pour l'usage externe (50 gr. par litre). *Sirop* de suc de feuilles (20 à 30 gr.), sirop d'extrait (id.), extrait aqueux ou alcoo-

lique (20 à 50 centigr.). C'est surtout contre la scrofule qu'on a employé ces préparations. La décoction de feuilles de noyer a été employée dans la vulvo-vaginite; les bains de noyer (500 gr. de feuilles pour 30 à 40 litres) ont été prescrits dans les érythèmes de l'enfance.

### O

#### OËillet.

Peu usité; sirop pour édulcorer les potions béchiques.

#### OËnanthe.

Cette ombellifère a été jadis préconisée contre la scrofule.

#### OËuf.

Aliment complet, bon après le sevrage : un œuf à un an, deux œufs par jour à dix-huit mois. Muggia a fait des injections sous-cutanées de jaune d'œuf (5 à 10 cent. cubes) tous les deux ou trois jours, obtenant ainsi un relèvement de forces et une augmentation de poids. On peut les remplacer par la lécithine.

La coquille d'œuf pulvérisée a été employée dans le rachitisme; le blanc d'œuf a été prescrit dans la diarrhée (eau albumineuse); le jaune d'œuf sert à émulsionner les corps gras et résineux et les médicaments administrés par la voie rectale.

#### Ognon.

L'ognon serait diurétique, vermifuge (macération dans le vin blanc, un oignon pour 1/2 litre). Peu usité.

#### Olivier.

Feuilles et écorce amères et astringentes, prescrites dans le paludisme: teinture et extrait d'écorce (2 à