

**Tubage.**

Le tubage consiste à placer dans le larynx un tube qui rétablit le passage de l'air (croup). On se sert d'un ouvre-bouche, d'un mandrin armé de tube métallique et on introduit le tube. L'extraction se fait généralement par le procédé de l'*énucléation*, sans extracteur. Tubes gradués suivant l'âge (six numéros); une petite règle métallique, sur laquelle on porte les tubes, indique ceux qu'on doit choisir suivant l'âge. Un enfant tubé doit toujours être veillé par une personne connaissant la manœuvre du *tubage* et du *détubage*.

Cette opération, à l'hôpital tout au moins, a presque complètement remplacé la trachéotomie.

**Tuberculine.**

La lymphé de R. Koch n'a pas de valeur curative, mais c'est un précieux agent de diagnostic.

En injectant un dixième de milligramme, on a, chez les tuberculeux latents, une réaction fébrile éphémère qui assure le diagnostic.

**Turquette.**

Cette herbe est diurétique (infusion de 30 gr. par litre). Peut s'associer à l'aigremoine. Utilisable dans les cardiopathies.

**Tussilage.**

Le tussilage ou pas d'âne fait partie des fleurs pectorales (5 gr. p. 500 en infusion).

**Tussol.**

Prescrit par Rehn dans la coqueluche (15 centigr. trois ou quatre fois par jour; on peut aller progressi-

vement, jusqu'à 4 gr. par jour), ce serait un amygdalate d'antipyrine.

**U****Uréthane.**

Hypnotique peu toxique (10 centigr. par année d'âge) à prendre dans une cuillerée d'eau sucrée ou de sirop.

*Ural*, produit par le mélange du chloral et de l'uréthane (mêmes doses).

**Uricédine.**

Substance chimique tirée du suc de citron. Convient à toutes les manifestations de la diathèse urique (1 gr. matin et soir) avec ingestion abondante d'eau.

On peut donner le médicament granulé (par demi-cuillerées à café deux fois par jour).

**Urophérine.**

Mélange de théobromine lithinée et de salicylate de soude, diurétique (2 à 3 gr. par jour).

**Urotropine.**

Combinaison d'aldéhyde formique et d'ammoniaque, serait un dissolvant de l'acide urique. Diurétique. Dose (paquets de 25 à 50 centigr. dans une cuillerée d'eau sucrée, trois à six fois par jour). Cystite et gravelle.

**Ursal.**

Salicylate d'urée (rhumatisme).

**Ustilago maïdis.**

Analogue à l'ergot de seigle, hémostatique (2 à 3 gr. d'extrait fluide).

*Ustilagine* (principe actif du précédent).

• **Uva ursi** (Voy. BUSSESOLE).

**V****Vaccination.**

En temps d'épidémie, vacciner tout le monde, sans distinction d'âge, de saison, etc. Vacciner les nouveau-nés avant leur première sortie. S'il n'y a pas d'épidémie, on peut différer de quelques mois, surtout quand l'enfant est très faible, atteint d'eczéma, d'impétigo. Revacciner au moins tous les dix ans.

Aseptiser la peau, les mains, les instruments; insérer le vaccin au niveau des attaches deltoïdiennes, parfois au mollet, à la face externe de la cuisse. Faire trois, quatre, six piqûres. En cas de nævus de faibles dimensions, vacciner à ce niveau.

**Valériane.**

On se sert surtout de la racine (antispasmodique), poudre, teinture, sirop, etc.

Valériane pulvérisée.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$	0 <sup>sr</sup> ,25	
Extrait de valériane.....			
Poudre de cannelle.....			0 <sup>sr</sup> ,05
Miel.....			Q. S.

Faire un bol; en donner quatre à cinq par jour.

**Lavement avec :**

Racines de valériane.....	10 gr.
Infuser dans eau bouillante.....	60 —
Passer et ajouter jaune d'œuf.....	N <sup>o</sup> 1.

*Acide valérianique*, forme des sels avec l'ammoniaque, la quinine, le zinc.

*Valérianate d'ammoniaque* (5 centigr. par année d'âge):

Valérianate d'ammoniaque.....	0 <sup>sr</sup> ,50
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 gr.
Eau de menthe.....	60 —

Par cuillerées, de deux en deux heures.

Le valérianate de quinine se donne à la dose de 5 à 10 centigrammes par année d'âge, le valérianate de zinc à la dose de 1 centigramme.

**Vanadium.**

On a prescrit ce médicament dans la tuberculose, la chlorose, etc.

Le *métavanadate de soude* en solution à 1 p. 1000 se prescrit en injections hypodermiques (1 à 5 seringues de Pravaz par jour).

**Vanille.**

Poudre (3 centigr. par année d'âge), teinture à 1 p. 5 (11 gouttes par année d'âge), infusion (20 à 25 centigr. de poudre p. 500 gr. d'eau).

*Vanilline*, principe actif (2 1/2 p. 100), se donne à la dose de 5 centigrammes en potion.

Potion stimulante :

Teinture de vanille.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$	2 gr.
— de cannelle.....		
Elixir de Garus.....	10 —	
Sirop d'écorces d'oranges.....	20 —	
Eau.....	60 —	

Par cuillerées, de deux en deux heures.