

Ustilago maïdis.

Analogue à l'ergot de seigle, hémostatique (2 à 3 gr. d'extrait fluide).

Ustilagine (principe actif du précédent).

• **Uva ursi** (Voy. BUSSESOLE).

V

Vaccination.

En temps d'épidémie, vacciner tout le monde, sans distinction d'âge, de saison, etc. Vacciner les nouveau-nés avant leur première sortie. S'il n'y a pas d'épidémie, on peut différer de quelques mois, surtout quand l'enfant est très faible, atteint d'eczéma, d'impétigo. Revacciner au moins tous les dix ans.

Aseptiser la peau, les mains, les instruments; insérer le vaccin au niveau des attaches deltoïdiennes, parfois au mollet, à la face externe de la cuisse. Faire trois, quatre, six piqûres. En cas de nævus de faibles dimensions, vacciner à ce niveau.

Valériane.

On se sert surtout de la racine (antispasmodique), poudre, teinture, sirop, etc.

Valériane pulvérisée.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$	0 ^{sr} ,25
Extrait de valériane.....		
Poudre de cannelle.....		
Miel.....		
		Q. S.

Faire un bol; en donner quatre à cinq par jour.

Lavement avec :

Racines de valériane.....	10 gr.
Infuser dans eau bouillante.....	60 —
Passer et ajouter jaune d'œuf.....	N ^o 1.

Acide valérianique, forme des sels avec l'ammoniaque, la quinine, le zinc.

Valérianate d'ammoniaque (5 centigr. par année d'âge):

Valérianate d'ammoniaque.....	0 ^{sr} ,50
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 gr.
Eau de menthe.....	60 —

Par cuillerées, de deux en deux heures.

Le valérianate de quinine se donne à la dose de 5 à 10 centigrammes par année d'âge, le valérianate de zinc à la dose de 1 centigramme.

Vanadium.

On a prescrit ce médicament dans la tuberculose, la chlorose, etc.

Le *métavanadate de soude* en solution à 1 p. 1000 se prescrit en injections hypodermiques (1 à 5 seringues de Pravaz par jour).

Vanille.

Poudre (3 centigr. par année d'âge), teinture à 1 p. 5 (11 gouttes par année d'âge), infusion (20 à 25 centigr. de poudre p. 500 gr. d'eau).

Vanilline, principe actif (2 1/2 p. 100), se donne à la dose de 5 centigrammes en potion.

Potion stimulante :

Teinture de vanille.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$	2 gr.
— de cannelle.....		
Elixir de Garus.....		10 —
Sirop d'écorces d'oranges.....		20 —
Eau.....		60 —

Par cuillerées, de deux en deux heures.

Vaseline.

Carbure d'hydrogène tiré du pétrole.
Sert de véhicule aux pommades, s'associe à la lanoline, à l'axonge, etc.

Vaseline liquide.

La vaseline liquide ou *huile de vaseline* est l'huile lourde de pétrole; elle sert de dissolvant à une foule de substances (éther, chloroforme, thymol, menthol, eucalyptol, terpinol, iode, brome, phosphore, iodoforme); mais elle ne dissout pas l'eau, l'alcool, la glycérine, l'acide salicylique, les sels mercuriels, la terpine, le chloral.

Iodoforme.....	5 gr.
Vaseline liquide.....	100 —

Injecter 5, 10, 20 grammes dans les abcès froids.

Menthol.....	0 ^{gr} ,25
Vaseline liquide.....	20 gr.

Instiller dans les narines IV à V gouttes de cette solution (rhinopharyngite).

Vasogène.

Vaseline oxygénée, sert d'excipient pour l'ichtyol, le menthol, le pyrogallol, la chrysarobine, l'iodoforme.

Ventouses.

Cloches en verre pour faire le vide sur la peau et y attirer le sang, avec ou sans scarification. Révulsion très employée dans les bronchites, broncho-pneumonies, congestions pulmonaires, pleurésies, etc.

Vératrine.

Alcaloïde retiré du *veratrum sabadilla*, du *veratrum album*, du *colchique d'automne*. Pilules de 2 à 5 milligrammes. Pour l'usage externe, teinture à 1 p. 10.

Veratrine.....	0 ^{gr} ,25
Dissoudre avec alcool et ajouter axonge.....	30 gr.

Frictions dans l'anasarque, l'hydartrose.

Liniment résolutif :

Vératrine.....	0 ^{gr} ,50
Huile d'olive.....	2 gr.
Iodure de potassium.....	4 —
Axonge.....	30 —

Bouchut a donné la vératrine dans le rhumatisme infantile (1 à 5 milligr. d'abord, puis jusqu'à 4 centigr.). Il l'associait à l'opium. On l'a employée dans la chorée.

Veratrum viride.

Employé dans les cardiopathies, abaisserait la tension artérielle (antagoniste de la digitale). Teinture (II gouttes par année d'âge). On l'a prescrit dans la chorée avec éréthisme cardiaque.

Véronique.

Extrait et teinture de rhizome de la *Veronica virginica* comme cholagogue et laxatif.

Infusion de véronique (15 gr. de feuilles sèches par litre) augmente la diurèse et facilite l'expectoration: bronchite, phthisie.

Verveine.

Infusion de feuilles sèches de verveine officinale (10 gr. p. 100) sudorifique.

Extrait fluide de verveine bleue (1 à 2 gr.)

Vésicatoires.

L'emplâtre vésicant à la cantharide est irritant et toxique, peut mortifier la peau, donner de la pyélonéphrite, de la cystite, de la dysurie. On prescrira un vésicatoire petit (4 à 5 centimètres de diamètre) et on ne le laissera que deux à trois heures en place. Panser ensuite avec ouate hydrophile et laisser sécher. Parfois on interpose un papier huilé entre la peau et l'emplâtre qu'on a saupoudré de camphre.

On ne mettra pas de vésicatoires dans les cas de diphtérie, de néphrite, d'athropsie, d'eczéma, etc. Jamais de vésicatoires permanents. Quand il y a des plaies de vésicatoires, on peut laver (Archambault) avec :

Décoction de quinquina.....	500 gr.
Chlorure de soude.....	200 —

Puis on panse avec :

Bioxyde de mercure.....	0gr,50
Précipité blanc.....	1 gr.
Axonge purifiée.....	30 —

Dans les plaies diphtérisées, Archambault touchait avec le phénol camphré :

Acide phénique.....	10 gr.
Camphre.....	25 —

Vésicatoire liquide (Bidet) appliqué au pinceau dans les cas de pelade.

Vésicatoire au sublimé à 1 p. 100 (Aubert). *Vésicatoire au phénol* (Ollivier, Hayem). (Voy. *Acide phénique*).

Viande.

La *viande crue* a été très recommandée dans la phtisie (Richet), dans les diarrhées rebelles. Elle expose au ténia quand elle vient du bœuf ou du porc.

Poudre de viande a servi au gavage des tuberculeux (Debove). *Suc de viande crue* dans la phtisie.

Somatose en suspension dans le bouillon, le lait, etc.

Viburnum prunifolium.

Extrait fluide (2 à 5 gr.), extrait aqueux en pilules de 15 à 20 centigrammes (3 par jour), teinture (1 à 3 gr.).

Viburnine (5 à 15 centigr.). Médicament à prescrire dans la dysménorrhée des jeunes filles.

Vinaigre.

Liquide renfermant 7 à 10 p. 100 d'acide acétique. Employé pour l'usage externe, dans les dermatoses prurigineuses (urticaire, prurigo, piqûres d'insectes).

Vinaigres médicaux *simples* ou *composés* :

Vinaigre aromatique servant à faire des frictions stimulantes :

1 ^o Vinaigre blanc.....	875 gr.
Alcoolature vulnéraire.....	125 —
2 ^o Ail.....	10 gr.
Feuilles de mélisse.....	} aa 25 —
— de romarin.....	
— de sauge.....	
Fleurs de lavande.....	50 —
Vinaigre.....	2000 —

(Formule des Hôpitaux).

Vinaigre scillitique :

Squames sèches de scille.....	100 gr.
Acide acétique cristallisable.....	20 —
Vinaigre blanc.....	980 —

Sert à faire l'oxymel scillitique.

Vinaigre de colchique :

Bulbes frais de colchique.....	200 gr.
Acide acétique.....	20 —
Vinaigre blanc.....	980 —

Vinaigre camphré (usage externe):

Camphre.....	} aa	25 gr.
Acide acétique.....		
Vinaigre blanc.....		

Violette.

La *violette odorante* sert à faire des tisanes béchiques (10 gr. de fleurs par litre), un *sirop*, etc.

La *violette tricolore*, ou *pensée sauvage*, s'emploie comme dépuratif dans les dartres et scrofules (infusion: 10 gr. p. 1000).

Vomitifs.

1° *Ipécacuanha*: racine fraîchement pulvérisée (10 centigr. par année d'âge). Sirop d'ipéca (1 centigr. d'extrait par gr.), s'associe à la poudre:

Poudre d'ipéca.....	0sr,30
Sirop d'ipéca.....	30 gr.

Par cuillerées à café, de cinq en cinq minutes, jusqu'à effet.

On fait des pastilles d'ipéca (1 centigr.) qui sont expectorantes. Le sirop de Desessartz est un sirop d'ipéca composé. La poudre de Dower est à 1 p. 10 d'ipéca et d'opium (5 centigr. par année d'âge).

2° *Sulfate de cuivre* (10 à 40 centigr):

Sulfate de cuivre.....	0sr,25
Sirop.....	20 gr.
Eau.....	100 —

Par cuillerées de dix en dix minutes, jusqu'à effet.

3° *Tartre stibié* (1/2 centigr. par année d'âge):

1° Émétique.....	0sr,01
Sucre en poudre.....	0sr,50

Pour un paquet, n° 5; en prendre un de dix en dix minutes dans une cuillerée d'eau, jusqu'à effet.

2° Tartre stibié.....	0sr,03
Sirop.....	10 gr.
Eau distillée.....	60 —

Prendre en quatre à cinq fois, de dix en dix minutes.

4° *Apomorphine* en injections sous-cutanées.

Chlorhydrate d'apomorphine.....	0sr,05
Eau distillée.....	10 gr.

Un quart à une demi-seringue de Pravaz.

En potion, on formulerait:

Chlorhydrate d'apomorphine.....	0sr,01
Acide chlorhydrique.....	II gouttes.
Sirop de polygala.....	30 gr.
Eau distillée.....	60 —

Par cuillerées d'heure en heure.

X**Xéroforme.**

Le xéroforme, ou *tribromophénolate de bismuth*, se prescrit dans les diarrhées comme les autres sels de bismuth. En poudre ou en pommade à 1 p. 20, a été employé contre l'eczéma infantile. On fait d'abord tomber les croûtes, et on applique la pommade.

Le xéroforme peut aussi servir au pansement du cordon ombilical, des otites, rhinites, etc.

Z**Zédoaire** (Voy. CURCUMA).**Zinc.**

Chlorure de zinc; antiseptique de grande valeur. A 5 p. 100, il sert à la désinfection des linges, vases de