

Vinaigre camphré (usage externe):

Camphre.....	} aa	25 gr.
Acide acétique.....		
Vinaigre blanc.....		

Violette.

La *violette odorante* sert à faire des tisanes béchiques (10 gr. de fleurs par litre), un *sirop*, etc.

La *violette tricolore*, ou *pensée sauvage*, s'emploie comme dépuratif dans les dartres et scrofules (infusion: 10 gr. p. 1000).

Vomitifs.

1° *Ipécacuanha*: racine fraîchement pulvérisée (10 centigr. par année d'âge). Sirop d'ipéca (1 centigr. d'extrait par gr.), s'associe à la poudre:

Poudre d'ipéca.....	0sr,30
Sirop d'ipéca.....	30 gr.

Par cuillerées à café, de cinq en cinq minutes, jusqu'à effet.

On fait des pastilles d'ipéca (1 centigr.) qui sont expectorantes. Le sirop de Desessartz est un sirop d'ipéca composé. La poudre de Dower est à 1 p. 10 d'ipéca et d'opium (5 centigr. par année d'âge).

2° *Sulfate de cuivre* (10 à 40 centigr):

Sulfate de cuivre.....	0sr,25
Sirop.....	20 gr.
Eau.....	100 —

Par cuillerées de dix en dix minutes, jusqu'à effet.

3° *Tartre stibié* (1/2 centigr. par année d'âge):

1° Émétique.....	0sr,01
Sucre en poudre.....	0sr,50

Pour un paquet, n° 5; en prendre un de dix en dix minutes dans une cuillerée d'eau, jusqu'à effet.

2° Tartre stibié.....	0sr,03
Sirop.....	10 gr.
Eau distillée.....	60 —

Prendre en quatre à cinq fois, de dix en dix minutes.

4° *Apomorphine* en injections sous-cutanées.

Chlorhydrate d'apomorphine.....	0sr,05
Eau distillée.....	10 gr.

Un quart à une demi-seringue de Pravaz.

En potion, on formulerait:

Chlorhydrate d'apomorphine.....	0sr,01
Acide chlorhydrique.....	II gouttes.
Sirop de polygala.....	30 gr.
Eau distillée.....	60 —

Par cuillerées d'heure en heure.

X**Xéroforme.**

Le xéroforme, ou *tribromophénolate de bismuth*, se prescrit dans les diarrhées comme les autres sels de bismuth. En poudre ou en pommade à 1 p. 20, a été employé contre l'eczéma infantile. On fait d'abord tomber les croûtes, et on applique la pommade.

Le xéroforme peut aussi servir au pansement du cordon ombilical, des otites, rhinites, etc.

Z**Zédoaire** (Voy. CURCUMA).**Zinc.**

Chlorure de zinc; antiseptique de grande valeur. A 5 p. 100, il sert à la désinfection des linges, vases de

nuit, fosses d'aisance, etc. ; à 4 p. 100, on l'emploie pour l'embaumement.

M. Lannelongue, prenant les solutions à 1 p. 10, 1 p. 20, les a injectées autour des foyers tuberculeux (méthode sclérogène) pour former autour d'eux une muraille scléreuse qui les enferme, les étouffe et aboutit à leur stérilisation.

Les solutions plus diluées (1 p. 200) peuvent servir à faire des irrigations de la plèvre, du vagin, etc.

Sulfate de zinc, couperose blanche, vitriol blanc, très employé en oculistique :

Sulfate de zinc.....	0 ^{sr} ,05
Eau distillée.....	5 gr.

Instiller dans les yeux une goutte matin et soir (conjonctivite aiguë).

A l'intérieur, dans la chorée, l'hystérie, on a donné 5, 10, 15 centigrammes de ce sel.

Oxyde de zinc, employé en poudre (érythèmes), ou en pommade (1 p. 10, 1 p. 5) dans l'eczéma.

Valériane de zinc ; 5 à 10 centigrammes, trois fois par jour (antispasmodique).

TABLE DE POSOLOGIE

A

ABSINTHE. — *Poudre* (0^{sr},20 à 0^{sr},50 par année d'âge). *Infusion de sommités* (4 gr. p. 500). *Teinture alcoolique* (V gouttes par année d'âge). *Extrait* (0^{sr},01 par année d'âge). *Essence* (I à V gouttes en potion).

ABSINTHINE. — *Granules* à 0^{sr},001 (quatre à cinq par jour un quart d'heure avant le repas).

ACÉTANILIDE. — *Solution* dans grog ou Todd (0^{sr},05 par année d'âge).

ACÉTATE D'AMMONIAQUE. — *Potion* avec 0^{sr},50 par année d'âge.

ACÉTATE DE PLOMB. — *Solution* ou *pilule* (0^{sr},05 par année d'âge).

Collyre (1 p. 100). *Sous-acétate de plomb*, extrait de Saturne formant la base de l'eau blanche (20 gr. p. 1000).

ACÉTATE DE POTASSE OU DE SOUDE. — *Potion* (0^{sr},20 par année d'âge). *Tisane* (2 gr. p. 500).

ACIDE ACÉTIQUE CRISTALLISABLE. — Caustique pour les verrues.

ACIDE AZOTIQUE. — *Potion* (V à X gouttes) dans la diarrhée. *Limonade* (2 gr. p. 1000). *Acide azotique alcoolisé* (4 gr. p. 1000).

ACIDE BENZOÏQUE. — *Potion* avec phosphate de soude pour dissoudre (0^{sr},10 par année d'âge). *Benzoate de soude* (0^{sr},20 par année d'âge). *Benzoate d'ammoniaque* (0^{sr},05 par année d'âge). *Benzoate de naphтол* (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge).

ACIDE BORIQUE. — *Poudre* pour l'usage externe pure ou associée. *Solution* (3 ou 4 p. 100). *Pommade* (1 p. 10). *Borate de soude* (1 p. 10, 1 p. 5 en collutoire). Pour l'usage interne dans l'épilepsie (0^{sr},50 par année d'âge).

ACIDE CACODYLIQUE. — *Cacodylate de soude* en potion, lavement, injections sous-cutanées (0^{sr},01 par année d'âge). *Cacodylate de fer* (0^{sr},01 par année d'âge).