

commencent bien pour mal finir, ou, en autres termes, qui, initialement bénignes, n'en aboutissent pas moins ultérieurement aux formes les plus graves de la maladie. De cela j'ai déjà cité et j'aurais encore à citer quantité d'exemples.

Donc, pas d'illusions, dirai-je en terminant. Ce que nous pouvons préjuger d'une syphilis qui vient de naître se réduit en somme à peu de chose; et la vérité, c'est que nous n'avons aucun moyen de savoir ce qu'est au juste cette syphilis et de préjuger ce qu'elle contient de périls pour l'avenir.

Or, cette vérité est de premier ordre comme importance, et il faut que le médecin s'en pénètre; car il en dérive un corollaire *d'ordre pratique* qui comporte un intérêt considérable, intérêt que d'un mot vous allez apprécier.

Et, en effet, dans la pensée que la bénignité initiale d'une syphilis constitue le présage d'une bénignité future et indéfinie, nombre de praticiens se refusent à traiter une syphilis initialement bénigne à la façon dont ils traitent une syphilis d'un autre caractère, c'est-à-dire à lui imposer le long, le très long traitement qui est actuellement démontré nécessaire, sinon pour guérir la syphilis (la guérit-on jamais?), du moins pour contenir d'une façon définitive ses manifestations d'avenir. Or, c'est là, basée sur une erreur de pronostic prévisionnel, une faute grave qui court risque de devenir éminemment préjudiciable aux malades. Tout au contraire, l'expérience clinique démontre qu'une syphilis qui débute sous une forme favorable, qui « s'annonce bien », comme on dit, n'en contient pas moins pour l'avenir le germe d'accidents redoutables, si elle n'est pas suffisamment et longuement réprimée. Ainsi, comme je l'ai répété tant de fois et démontré, je crois, par des chiffres irréfutables, *le tertiarisme dérive, pour l'énorme majorité des cas, de syphilis originellement bénignes* (1).

Jugez donc, messieurs, à quelles conséquences peut aboutir de la sorte une induction fautive, tirée d'un prétendu présage; — et cette considération vous expliquera les longs développements que j'ai cru devoir accorder à cette question du pronostic prévisionnel de la syphilis.

(1) Voy. *Traitement de la syphilis*, p. 19 et suiv.

TABLE DES MATIÈRES

Définition. — Caractéristique générale de la syphilis. — Évolution en trois périodes : période <i>primaire</i> ; — période <i>secondaire</i> ; — période <i>tertiaire</i>	1
Dénomination.....	4
Comment la syphilis pénètre-t-elle dans l'organisme? — Quatre modes.....	5

SYPHILIS ACQUISE.

Contage syphilitique et contagion syphilitique. — Où réside ce contage? — Confrontations. — Expérimentations sur l'homme sain. — Le contage existe-t-il dans les manifestations d'ordre tertiaire? — Persiste-t-il indéfiniment dans le sang? — Les accidents secondaires sécrétants conservent-ils indéfiniment le pouvoir contagieux, à quelque époque de la maladie qu'ils viennent à se produire?.....	7
Modalités variables de la contagion syphilitique. — Contagion médiate.....	18
Écllosion et premières étapes de la syphilis. — <i>Lois d'évolution</i>	21
Question des syphilis d'emblée.....	24

PÉRIODE PRIMAIRE.

Chancre et bubon satellite.

CHANCRE SYPHILITIQUE.

Synonymie. — Caractères anatomiques. — Caractères cliniques. — Chancre expérimental. — Chancre de contagion.....	27
Description du chancre dans son type usuel. — Caractères d'étendue, de configuration, de couleur, de fond, de bords, etc.	
Induration. — Deux formes d'induration : induration nodulaire et induration lamelleuse; — celle-ci comportant deux degrés : induration parcheminée et induration foliacée. — Comment rechercher l'induration? — Que devient l'induration au moment et au delà de la période terminale du chancre? — Évolution. — Durée.....	32
Caractère dominant de la lésion primitive de la syphilis ou chancre syphilitique : <i>Bénignité</i>	43

BUBON SATELLITE.

Caractère <i>constant</i> de l'adénopathie symptomatique du chancre. — Siège. — Adénopathie centripète. — Échéance d'apparition.....	44
Symptomatologie. — Caractères usuels d'aphlegmasie, d'indolence, de dureté, de multiplicité ganglionnaire. — (Pléiade de Ricord. — Évolution. — Résolution spontanée.....	48
Variétés. — Variétés de développement (adénopathie faible, adénopathie	

forte). — Bubon congloméré. — Bubon syphilo-strumeux. — Bubon inflammatoire. — Bubon suppuré.....	54
Lymphangite symptomatique du chancre.....	57
Traitement.....	59
Rôle diagnostique du bubon satellite.....	60

Diagnostic général du chancre.

Cinq ordres d'éléments diagnostiques : 1° Caractères cliniques du chancre ; — 2° Caractères cliniques du bubon ; — 3° Données fournies par l'incubation ; — 4° Données fournies par l'auto-inoculation ; — 5° Données fournies par la pratique des confrontations.....	63
Diagnostic différentiel. — I. Diagnostic du chancre naissant. — II. Diagnostic du chancre adulte.....	73
Espèces pathologiques pouvant prêter à confusion. — 1° Érosions simples. — Piège des indurations artificielles.....	75
2° Herpès. — Caractère différentiel principal tiré du polycyclisme et du micro-cyclisme de l'érosion herpétique.....	77
3° Chancre simple. — Coexistence possible des deux chancres. — Chancre mixte.....	96
4° Ecthyma scabieux chancriforme.....	96

Variétés du chancre syphilitique.

Innombrables. — De tous les caractères cliniques du chancre deux seulement à peu près constants : processus érosif ou ulcéreux de surface et induration. — De l'induration chancreuse chez la femme. — Le chancre n'est pas syphilitique parce qu'il est induré ; il est induré parce qu'il est syphilitique.....	
I. Variétés de nombre.....	101
II. Variétés d'étendue. — Grands chancres. — Petits chancres.....	102
III. Variétés de forme objective. — Chancre érosif. — Chancre exulcéreux. — Chancre ulcéreux. — Chancre papuleux. — Chancre hypertrophique. — Variétés de couleur.....	103
IV. Variétés de siège. — Ubiquité. — Statistique sur les localisations du chancre. — Chancres génitaux. — Chancres périgénitaux. — Chancres extra-génitaux. — Modifications résultant des variétés de localisation. — Chancre des muqueuses. — Chancre de la peau.....	105

Particularités de localisation.

I. Variétés du chancre chez l'homme. — Chancre du gland et de la rainure glando-préputiale. — Chancre du frein et des fossettes du frein. — Chancre du méat urétral. — Chancre de l'urèthre. — Chancre du prépuce. — Chancres sous-phimosis. — Difficultés diagnostiques qu'ils comportent. — Chancres du fourreau, des bourses et de la région pubienne.....	111
II. Variétés du chancre chez la femme. — Statistique de localisations. — Chancre des grandes lèvres. — Chancre des petites lèvres. — Chancre de l'entrée du vagin et des caroncules. — Chancre du clitoris. — Chancre du méat urétral. — Chancre de l'infundibulum vulvo-vaginal. — Chancre du vagin. — Chancres du col utérin. — Leurs conséquences obstétricales. — Diagnostic différentiel du chancre syphilitique et du chancre simple sur le col utérin.....	119

CHANCRES EXTRA-GÉNITAUX.

Multiplicité toujours croissante (en apparence tout au moins) des chancres extra-génitaux. — Fréquence approximative. — Sièges. — Division.....	131
I. CHANCRES BUCCAUX. — Étiologie. — Péril du baiser en état de syphilis.	

— Contagions médiatees. — Contaminations professionnelles. — Contaminations dérivant de l'allaitement.	
1° Chancres labiaux. — Types divers. — Diagnostic différentiel avec épithélioma labial.....	135
2° Chancres de la langue. — Diagnostic différentiel. — Glossite dentaire. — Ulcère tuberculeux.....	139
3° Chancres de la gencive.....	142
4° Chancres du palais, du voile palatin, des piliers et de la muqueuse génienne.....	143
5° Chancres de l'amygdale. — Trois formes principales : forme érosive ; — forme ulcéreuse ; — forme angineuse. — Variété diphthéroïde. — Variété gangreneuse.....	143
6° Chancres du pharynx.....	149
II. CHANCRES DES NARINES ET DE LA PITUITAIRE.....	150
III. CHANCRES DE L'OEIL. — Étiologie. — Chancre palpébral. — Chancre du bord ciliaire. — Chancre conjonctival.....	150
IV. CHANCRES DU VISAGE. — Étiologie. — Contamination par le rasoir. — Types divers. — Types hypertrophiques. — Diagnostic différentiel : Épithéliome ; — Sycosis.....	155
V. CHANCRES DE L'OREILLE.....	162
VI. CHANCRES DU CUIR CHEVELU.....	162
VII. CHANCRES DU COU, DU TRONC ET DES MEMBRES. — Étiologie. — Contagions directes ; contagions médiatees. — Formes cliniques.....	162
VIII. CHANCRES DU SEIN. — Étiologie. — Type usuel. — Variétés : chancre fissuraire ; — chancres multiples herpétiformes.....	172
IX. CHANCRE VACCINAL. — Caractères cliniques. — Variétés. — Diagnostic avec vaccine ulcéreuse.....	177
X. CHANCRES DE LA MAIN. — Étiologie. — Chancres digitaux. — Types usuels. — Types anormaux : chancre hypertrophique ; — chancre panaris ; — chancre fongueux.....	181
XI. CHANCRES DES RÉGIONS ANALE, PÉRIANALE ET RECTALE.....	188
Pronostic de la syphilis issue des chancres extra-génitaux. — L'extra-généralité du chancre constitue-t-elle un élément de gravité pour la syphilis qui dérive de ce chancre?.....	195

Variétés d'évolution.

Chancres d'éclosion synchrone. — Chancres successifs. — Erreurs possibles relativement à ces derniers.....	197
--	-----

Complications du chancre.

I. <i>Accidents inflammatoires</i> . — Chancre enflammé. — Phimosis. — Balano-posthite. — Paraphimosis. — Vulvite. — Sclérome vulvaire.	
II. <i>Accidents gangreneux</i> .	
III. <i>Phagédénisme</i> . — Deux formes : phagédénisme gangreneux et phagédénisme inflammatoire. — Variété : phagédénisme érosif. — Accidents et conséquences. — Pseudo-phagédénisme. — Phagédénisme septique ou infectieux. — Étiologie. — Diagnostic. — Pronostic.	
Loi de Bassereau.....	202

Traitement du chancre et de ses complications.

I. Traitement suppressif, traitement abortif. — Y a-t-il avantage à supprimer le chancre en tant que lésion ? — Y a-t-il avantage à supprimer le chancre quant à ses conséquences ultérieures?.....	216
II. Traitement usuel.....	218
III. Que faire aux indurations posthumes?.....	221
IV. Indications résultant de localisations particulières.....	222
V. Traitement des complications. — Complications inflammatoires. —	

Chancres sous-phimosiques. — Balano-posthite. — Paraphimosis. — Gangrène et phagédénisme. — Fautes thérapeutiques à éviter..... 224

Accidents posthumes du chancre.

Exagération du noyau d'induration. — Chancre *redux*. — Fonte et ramollissement de l'induration..... 234

PÉRIODE SECONDAIRE.

Échéance d'invasion des accidents dits *généraux* ou *constitutionnels* de la syphilis. — Quels sont ces accidents?
Discipline chronologique de la maladie. — Division naturelle de toute la maladie en trois périodes : **Période primaire**; — **période secondaire**; — **période tertiaire**. — Avantages de cette classification, en dépit des légitimes critiques qui peuvent lui être adressées..... 240
Caractéristique générale de la période secondaire. — Parallèle avec la période tertiaire..... 245
Comment se fait ce qu'on appelle l'explosion secondaire?..... 248

État général au cours de la période secondaire.

Syphilis tolérées. — Syphilis affectant l'état général. — Type anémique. — Type asthénique ou nerveux. — Type dénutritif. — Type mixte. — Durée variable de ces troubles généraux. — Dangers indirects des états de débilitation syphilitique..... 249

Recherches hématologiques.

Altérations du sang. — Formes habituelles : diminution de l'hémoglobine; — diminution des hématies; — élévation de nombre des globules blancs. — Types divers de l'anémie syphilitique : type de l'anémie simple; — type chloro-anémique; — type chloro-anémique avec leucocytose; — type de l'anémie pernicieuse, etc..... 258
Influence du mercure sur la restauration du sang. — Déductions pratiques... 264

SYPHILIDES CUTANÉES.

Caractères généraux des syphilides. — Caractères généraux des syphilides secondaires..... 266
Division des syphilides secondaires..... 273

I. — Syphilides érythémateuses.

Constitution du genre. — Deux types..... 277
I. Roséole..... 278
II. Roséole circinée..... 281
Variétés.
Diagnostic différentiel : roséole simple; — roséole résineuse; — pityriasis versicolor rosé; — pityriasis rosé; — roséole de l'antipyrine..... 282
Roséole à récives multiples. — Singularité de ce type, susceptible de retours étonnamment répétés..... 290

II. — Syphilides papuleuses.

Constitution du genre. — Papule élémentaire. — Sa constitution étiologique. — Division..... 296
I et II. SYPHILIDE PAPULEUSE ET SYPHILIDE PAPULO-SQUAMEUSE. — Quatre types constitutifs :

1° Type à papules moyennes : SYPHILIDE PAPULO-SQUAMEUSE LENTICULAIRE. 299
2° Type à petites papules : SYPHILIDE PAPULO-GRANULEUSE ET SYPHILIDE PAPULEUSE PONCTUÉE. — Diagnostic différentiel avec le lichen plan 305
3° Type à grandes papules : SYPHILIDE PAPULEUSE NUMMULAIRE..... 310
4° Type à papules en placards : SYPHILIDE PAPULEUSE EN NAPPE..... 311

Variétés multiples de ces syphilides papuleuses. — Variétés comme développement : papules rudimentaires et papulo-tubercules comme types extrêmes. — Syphilides psoriasiformes. — Syphilides papuleuses circinées (annulaires, arciformes, en arceaux conjugués, en spirale, syphilides circinées concentriques, syphilides circinées à centre maculeux, etc.). — Syphilide papuleuse groupée ou en bouquet; — syphilide à groupement circiné; — syphilide papuleuse en corymbe..... 312
Variétés de siège : papule à rhagade; — syphilide papilliforme, verrucoïde ou végétante. — **Syphilide palmaire et plantaire**. — Type lenticulaire. — Type en nappe. — Type circiné. — Type corné. — Variétés digitales..... 316
Diagnostic des diverses formes de la syphilide papulo-squameuse. — Psoriasis. — Exanthèmes syphiloïdes palmaires et plantaires. — Exanthème palmaire de l'antipyrine..... 324
III. SYPHILIDE PAPULO-ÉROSIVE (plaques muqueuses de la peau)..... 335
IV. SYPHILIDE PAPULO-CROÛTEUSE. — Types divers à dénominations multiples. — Réforme nécessaire de nomenclature. — Syphilide herpétiforme. — Syphilide acnéiforme. — Syphilide impétigineuse..... 335

III. — Syphilide ulcéreuse superficielle.

Caractère constitutif : processus ulcéreux. — Syphilide ethymateuse. — Variété hémorragique; — variété végétante ou papillomateuse..... 343
Résumé. — Comment les variétés infiniment multiples des syphilides secondaires peuvent être ramenées à trois types : type érythémateux, type papuleux, type ulcéreux. — Avantages d'une nomenclature simplifiée de la sorte. 350
Diagnostic général des syphilides secondaires..... 351

Syphilides secondaires malignes.

Trois types principaux :

1° SYPHILIDE PAPULO-TUBERCULEUSE. — Variétés : syphilide papulo-tuberculeuse annulaire; — syphilide papulo-tuberculeuse hémorragique... 354
2° SYPHILIDE PAPULEUSE EXFOLIATRICE..... 358
3° SYPHILIDE PAPULEUSE NIGRICANTE..... 359

Syphilide pigmentaire.

Type usuel ou réticulaire. — Variété dite à lunules. — Mélanodermies atypiques. — Leucomélanodermies.
Pourquoi cette syphilide pigmentaire rentre dans le cadre des affections parasymphilitiques..... 361
Reliquats des syphilides secondaires. — **Leuco-atrophie cutanée**..... 374
Traitement des syphilides secondaires. — Médication générale. — Traitements topiques..... 378

Onyxis et périonyxis.

Groupe complexe des onyxis. — Onyxis craquelé. — Décollement partiel de l'ongle. — Décollement total. — Pachyonyxis. — Elconyxis..... 393
Périonyxis sec. — Périonyxis inflammatoire. — Périonyxis ulcéreux..... 397

Alopécie.

- Préjugés à son sujet. — Échéance d'invasion. — Pathogénie. — Syphilide pityriasiforme ou roséole furfuracée du cuir chevelu. — Alopécie sans lésions..... 402
 Alopécie crânienne. — Caractéristique. — Deux types : forme diffuse et forme en clairières. — Variété : alopécie pseudo-peladique. — Degrés variables d'intensité. — Durée. — Terminaison. — Diagnostic. — Pelade..... 409
 Alopécie de la barbe; — des sourcils et des cils; — alopécie génitale, etc.... 418

SYPHILIDES MUQUEUSES.

Dénominations. — Réforme nécessaire de nomenclature. — Quatre types nettement spécifiés :

- 1° Syphilides érosives ;
- 2° Syphilides papulo-érosives ;
- 3° Syphilides papulo-hypertrophiques ;
- 4° Syphilides ulcéreuses.

- Échéance d'invasion. — Siège..... 421
 Caractères généraux des syphilides muqueuses. — Contagiosité..... 425

Syphilides muqueuses génitales.

I. Chez la femme.

SYPHILIDES VULVAIRES.

- 1° Type érosif. — 2° Type papulo-érosif. — Nappes muqueuses par agmination. — Évolution. — Résolution hâtive et facile curabilité. — Traitement. — 3° Type papulo-hypertrophique. — Structure. — Complications. — Traitement. — 4° Type ulcéreux. — Analogies objectives avec le chancre simple. — Diagnostic différentiel..... 429
 Variétés. — Types associés. — Variétés de couleur. — Plaques opalines ou diphthéroïdes. — Syphilide papuleuse caliciforme. — Syphilide papulo-ulcéreuse. — Variétés circonscrites..... 450
 FOLLICULITES VULVAIRES..... 453
 SYPHILIDES VAGINALES..... 455
 SYPHILIDES UTÉRINES..... 456
 Complications des syphilides génitales chez la femme. — Érythème, intertrigo, œdème, phlegmons circonscrits. — Lymphangites. — Sclérème vulvaire. — Déformations..... 460
 II. Chez l'homme.
 1° Type érosif. — Danger considérable de ces insignifiantes syphilides érosives au point de vue de la contagion. — 2° Type papulo-érosif. — 3° Type papulo-hypertrophique. — 4° Type ulcéreux..... 464
 SYPHILIDES MUQUEUSES DU SCROTUM ET DES RÉGIONS PÉRIGÉNITALES..... 467
 Complications. — Balano-posthite secondaire. — Traitement..... 469
 SYPHILIDES ANALES ET PÉRIANALES. — Diagnostic. — Dermite papulo-érosive pseudo-syphilitique..... 471

Syphilides bucco-gutturales.

- Accidents les plus communs de toute la syphilis. — Étiologie. — Siège. — Formes diverses. — Quatre types..... 475
 Variétés de nombre, d'étendue, d'aspect, de configuration, etc. — Plaques muqueuses opalines, voire diphthéroïdes. — Syphilides circonscrites. — Variétés régionales. — Rhagades. — Forme fissuraire. — Plaques lisses de la langue ou glossite dépapillante. — Variétés comme troubles fonctionnels. — Angine secondaire. — Plaques muqueuses latentes, ignorées..... 479

- Diagnostic. — La plaque muqueuse a-t-elle quelque attribut propre, spécial ?
 Diagnostic différentiel : Érosions simples, inflammatoires ou autres; — herpès buccal; — herpès récidivant buccal; — aphthe; — hydroa buccal; — glossite exfoliante marginée; — perlèche; — lésions mercurielles; — érosions ou ulcérations d'origine dentaire..... 490
 Traitement. — Médication interne n'exerçant sur ces accidents qu'une action des plus lentes. — Résultats bien plus hâtifs obtenus de la médication externe. — Cautérisations. — De quel caustique faire choix? — Indications et contre-indications du nitrate de mercure et du nitrate d'argent. — Accidents de pratique à conserver en souvenir. — Cautérisations fractionnées. — Hygiène buccale. — Gargarismes, collutoires, etc..... 504
 Dysphagie syphilitique secondaire..... 512

Syphilides ou parasymphilides leucoplasiformes de la bouche.

- Existence indéniable d'une leucoplasie secondaire. — Caractères cliniques de cette leucoplasie. — Types divers. — Évolution. — Résistance au traitement spécifique. — Diagnostic différentiel avec : plaques muqueuses diphthéroïdes; — leucoplasie nicotique; — énanthème buccal du lichen plan. — Traitement. — Vraisemblablement, cette leucoplasie rentre dans le cadre des affections parasymphilitiques..... 513

Syphilis secondaire du larynx.

- Formes diverses. — 1° Érythème laryngé. — 2° Plaques muqueuses. — 3° Laryngite hyperplasique. — 4° Laryngite ulcéreuse.
 Évolution. — Pronostic. — Traitement. — Indication formelle des injections de calomel dans les cas menaçants..... 522

- Syphilides muqueuses des narines et de la pituitaire; — de l'œil; — de l'oreille; — du sein; — de l'aisselle; — de l'ombilic; — des orteils. — Traitement..... 530

Indurations secondaires.

- Syphilides indurées. — Erreurs diagnostiques pouvant dériver de ces indurations secondaires. — Pseudo-chancres indurés de récidence. — Signification clinique de l'induration en syphilis..... 536

Métamorphoses du chancre in situ.

- Transformation du chancre en plaque muqueuse. — Importance autrefois attribuée à cette modification objective. — Ancienne doctrine de la plaque muqueuse primitive..... 540

ADÉNOPATHIES ET LYMPHANGITES SECONDAIRES.

- Échéance d'apparition.
 Adénopathies. — Sièges. — Prédilection singulière de la syphilis pour certains groupes ganglionnaires. — Pathogénie. — Formes cliniques : 1° Forme usuelle. — 2° Forme confluyente (glandage secondaire). — Prétendu rôle de protection attribué à ces adénopathies pour la défense de l'organisme. — 3° Forme strumeuse (écrouelles secondaires)..... 544
 Lymphopathies secondaires. — Lymphangite secondaire génitale. — Pseudo-chancres lymphangitiques..... 556

AFFECTIONS SECONDAIRES DU SYSTÈME LOCOMOTEUR.

- I. SYSTÈME OSSEUX. — Échéances d'apparition. — Étiologie. — Localisations. — Formes morbides :
- 1° Périostite.
 - 2° Périostose.
 - 3° Ostéalgie.

Céphalée osseuse. — Sternalgie. — Pleurodynie. — Périchondrite.....	558
II. ARTICULATIONS. — Trois modalités de manifestations articulaires : arthralgie ; — hydarthrose ; — arthropathie pseudo-rhumatismale.	
Diagnostic différentiel entre le rhumatisme syphilitique et le rhumatisme vulgaire.....	567
III. SYNOVIALES TENDINEUSES. — Deux formes : hydropisie simple des gaines tendineuses ; — ténosites ou synovites tendineuses. — Formes frustes.	
Hygroma secondaire.....	575
IV. MUSCLES. — Déterminations multiples et diverses :	
1° Myosalgies.	
2° Contracture musculaire. — Contracture secondaire du biceps brachial. — Pathogénie.	
3° Myosite.	
4° Affaiblissement, débilité musculaire. — Exploration dynamométrique. — Degrés. — Durée.	
5° Amaigrissement musculaire, amyotrophie.	
6° Tremblement musculaire.	
Troubles associés du système locomoteur. — Pseudo-rhumatisme syphilitique.	
Phénomènes douloureux de localisation indéterminable : courbature syphilitique ; — douleurs secondaires ; — engourdissement nocturne des membres ; paroxysmes vespérins ou nocturnes.....	580

SYPHILIS SECONDAIRE DE L'ŒIL.

I. PAUPIÈRES. — Syphilides. — Syphilide palpébrale en nappe.	
II. CONJONCTIVE. — Conjonctivite secondaire. — Dacryocystite.	
III. CORNÉE. — Kératite de trois formes : kératite ponctuée ; — kératite interstitielle ; — kératite papuleuse.	
IV. IRIS. — Iritis secondaire. — Étiologie. — Symptômes. — Période de début. — Trois signes dénonciateurs. — Période d'état. — Syphilides iriennes. — Formes. — Évolution. — Terminaisons. — Pronostic. — Complications choroidiennes. — Récidives. — Diagnostic de nature. — Trois caractères différentiels : teneur subaiguë de la maladie ; — indolence relative ; — énanthème irien. — Traitement.....	596

SYPHILIS SECONDAIRE DE L'OREILLE.

Syphilides du pavillon et du conduit auditif externe.	
Obstruction de la trompe d'Eustache.	
Otite moyenne purulente.	
Surdité foudroyante. — Trois particularités constitutives : incroyable rapidité d'évolution ; — absence de toute lésion appréciable ; — résistance à tout traitement. — Un seul cas de guérison jusqu'à ce jour.....	614

FIÈVRE SYPHILITIQUE.

Fréquence. — Division.	
I. Fièvre symptomatique. — Notamment, fièvre d'éruption.	
II. Fièvre essentielle ou fièvre syphilitique proprement dite. — Échéance d'invasion. — Trois formes cliniques :	
1° FIÈVRE INTERMITTENTE SYPHILITIQUE. — Caractère vespérin ou nocturne. — Analogies et différences avec accès palustre. — Diagnostic différentiel.	

2° FIÈVRE CONTINUE SYPHILITIQUE. — Durée. — Durée parfois considérable, s'élevant à plusieurs septénaires. — Analogies avec fièvre continue simple. — Diagnostic.	
Variété : Typhose syphilitique. — Comment ce type réalise parfois l'aspect clinique de la fièvre typhoïde. — Diagnostic.	
3° FORME DÉRÉGÉE, ATYPIQUE.	621

ACCIDENTS NERVEUX DE LA PÉRIODE SECONDAIRE.

Forme nerveuse de la syphilis secondaire. — Sa prédominance chez certains sujets et tout particulièrement chez la femme. — Manifestations multiples, des plus variées et parfois des plus bizarres. — Division.....	642
I. Céphalée. — Type continu avec exacerbations ; type intermittent. — Durée. — Traitement.....	644
II. Troubles du sommeil. — Insomnie essentielle secondaire.....	648
III. Asthénie nerveuse secondaire.	
1° Asthénie musculaire. — Diminution des forces. — Débilité et courbature musculaire.	
2° Asthénies splanchnique, circulatoire, digestive, nerveuse, nutritive.	
3° Asthénie générale. — Type de la femme accablée, aplatie, « éreintée » par la syphilis.	
Durée de ces curieux phénomènes.....	649
IV. Douleurs névralgiformes et névralgies. — Siège. — Types usuels (névralgies sus-orbitaire, intercostale, sciatique). — Types rares. — Isolées, ces névralgies sont souvent méconnues comme nature. — Traitement.....	653
V. Névrites et polynévrites secondaires.	
1° Névrites. — Symptômes constitutifs. — Localisations. — Névrite du cubital. — Névrite du sciatique.	
2° Polynévrites. — Types divers. — Parésie des membres supérieurs, des membres inférieurs, des quatre membres. — Exemples cliniques.....	657
VI. Troubles de la sensibilité générale. — Modalités cliniques diverses.	
ANALGÉSIE SECONDAIRE. — Forme de beaucoup la plus importante. — Variétés de siège et d'étendue. — Prédilection singulière pour deux régions : région mammaire et région dorso-métacarpienne. — Durée. — Nature. — Raisons multiples tendant à démontrer que cette analgésie n'est pas imputable à l'hystérie et procède directement de la syphilis. — Diagnostic différentiel entre l'analgésie hystérique et l'analgésie secondaire de la syphilis.....	664
VII. Tremblement musculaire.	670
VIII. Surexcitation ou réveil de névroses antérieures. — Genèse de névroses.	
i. La syphilis secondaire se traduit quelquefois par la stimulation ou le réveil de certaines névroses préexistantes. — Hystérie. — Épilepsie.	
ii. La syphilis secondaire peut provoquer et créer de toutes pièces des névroses qui n'existaient pas avant elle.	
Hystérie secondaire.	
Épilepsie secondaire	676
IX. Névroses du système sympathique.	
i. Troubles de caloricité. — Algidités périphériques. — Sensation générale de froid. — Troubles circulatoires connexes. — Pathogénie.	
ii. Hyperidroses secondaires.....	691