

RM 121

T 73

1898

V. 13

pte 2

TRAITEMENT
DES
MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF
ET DE SES ANNEXES

DEUXIÈME PARTIE
INTESTIN — FOIE — PÉRITOINE

CHAPITRE PREMIER
TRAITEMENT DE LA DYSPEPSIE
ET DES DIARRHÉES CHEZ LES ENFANTS

PAR

V. HUTINEL

Professeur à la Faculté de Paris.

I

Division du sujet.

Chez les nourrissons, les maladies de l'appareil digestif ont une fréquence et une gravité extraordinaires. Dans la première année de la vie, elles font à elles seules plus de victimes que toutes les autres affections réunies¹.

L'étude de leur traitement, basée en grande partie sur la

1. LAGNEAU a montré qu'en 1892 il était mort en France 135 603 nourrissons, ce qui équivaut au sixième de la mortalité totale; or, cette énorme mortalité a été causée, pour plus de moitié, par des affections intestinales.

connaissance de leurs causes, a fait, dans ces derniers temps, de très sensibles progrès.

On sait que, chez l'enfant, les conditions physiologiques de la digestion ne sont pas les mêmes que chez l'adulte; mais ces conditions ne sont pas encore parfaitement connues; on sait aussi que les micro-organismes de l'intestin prennent une part active aux différents actes de la digestion, aussi bien à l'état physiologique que dans les états pathologiques; mais si la lumière pénètre peu à peu dans ce chaos, combien de points restent encore obscurs!

Sur la nature, sur les causes, sur les formes cliniques des diarrhées infantiles, l'accord est loin d'être fait. Pourtant, on trouve dans les ouvrages français et étrangers, avec quelques variantes, une division qui semble assez naturelle, que nous avons adoptée depuis longtemps déjà et qui comprend six chapitres principaux.

1° *Dyspepsies gastro-intestinales et diarrhées simples d'origine dyspeptique*, tenant à une mauvaise élaboration des matières ingérées et à une exagération des mouvements péristaltiques de l'intestin, n'ayant, au début, qu'un retentissement assez faible sur la nutrition et l'état général, mais pouvant préparer des affections plus graves ou conduire l'enfant à la cachexie.

2° *Gastro-entérites catarrhales aiguës*, catarrhes gastro-intestinaux, que nous appellerions plus volontiers, avec Marfan, *diarrhées toxi-infectieuses fébriles*. Celles-ci sont caractérisées par de la fièvre, par un amaigrissement et un affaiblissement rapides, par du ballonnement du ventre, par des coliques, par des selles abondantes, verdâtres et muqueuses où dominent les éléments épithéliaux désagrégés et les micro-organismes virulents.

3° *Gastro-entérites cholériformes* ou *choléra infantile*, avec selles profuses, extrêmement fréquentes, amaigrissement rapide, algidité, etc.

4° Entérites caractérisées par une sécrétion muqueuse abondante et souvent par des selles muco-sanguinolentes ou

pseudo-membraneuses (*entérites muqueuses, dysentéroides, folliculaires*, etc.). Dans les formes aiguës, le gonflement et l'ulcération des follicules sont très étendus; dans les formes subaiguës, l'infection atteint surtout le gros intestin.

5° *Diarrhées chroniques*, simples ou diathésiques.

6° *Athrepsie*.

Sans doute, cette classification n'est ni parfaite ni complète. Dans les diarrhées dyspeptiques les plus simples, on note toujours une augmentation du nombre et de la virulence des bactéries intestinales, et toujours il se fait une résorption plus ou moins abondante de toxines. Pour être moins marqué que dans les entérites, le retentissement sur l'organisme entier est cependant indéniable. Où finit la diarrhée dyspeptique, où commence la diarrhée toxique? La délimitation est d'autant plus difficile à établir que souvent l'une prépare l'autre. Cependant, tout imparfaite qu'elle soit, cette division nous semble naturelle et acceptable.

II

Dyspepsies gastro-intestinales.

A. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Les troubles fonctionnels des voies digestives, que n'accompagne aucune altération organique appréciable, sont extrêmement communs chez les nourrissons.

Tantôt, c'est l'appareil digestif qui est incapable de faire subir aux aliments l'élaboration nécessaire à leur assimilation, tantôt c'est l'aliment lui-même qui est défectueux et indigeste.

À la naissance, les différents segments du tube digestif (bouche, estomac, intestin grêle, gros intestin) et les glandes qui y sont annexées, sont encore loin d'être arrivés à un développement complet. La fonction digestive, toujours très