

dixième modifie énergiquement la surface malade; on l'emploiera, même à doses plus fortes, lorsqu'il y aura de la dermite et un état végétant.

Nous pouvons recommander, d'autre part, l'emploi de la pommade suivante (Lassar) :

Cinabre .....	1 gramme.
Soufre précipité.....	25 grammes.
Vaseline.....	100 —

L'impétigo est souvent secondaire à des causes externes (pityriase, gale) qu'on devra traiter en même temps. Il se développe souvent sur des individus débilités. Les enfants atteints d'impétigo récidivant seront considérés comme lymphatiques et traités en conséquence (huile de foie de morue, hydrothérapie, aération continue, jour et nuit).

LEREDDE.

### INTERTRIGO

Les formes les plus simples d'*intertrigo*, celles qui ne sécrètent que légèrement et ne sont pas irritées, sont justiciables du glycérolé cadique faible (10 pour 100), des pommades à l'oxyde jaune ou au calomel (1 pour 30 à 1 pour 50). Ces pommades seront appliquées la nuit; le jour, on poudre au bismuth, au talc, au lycopode.

Mais lorsque les régions sont irritées, ce qui est fréquent en été et chez les obèses, il faut d'abord calmer toute inflammation (applications de compresses trempées dans l'eau bicarbonatée ou boratée à 1 pour 50, ou cataplasmes de fécule). Plus tard on fera des lavages répétés avec une solution astringente d'eau chargée d'alun à 1 pour 100 ou de permanganate de potasse à 1 pour 5000. Dans l'intervalle des lavages, on poudre au talc ou au dermatol. M. Brocq recommande, lorsque la transpiration est abondante, d'ajouter un peu d'acide salicylique (2 pour 100) et, s'il y a une odeur fétide, un peu de camphre.

Chez les individus obèses, qui sont sujets à l'intertrigo, il convient de laver les plis de la peau avec de l'alcool au tiers et de poudrer *larga manu*.

LEREDDE.

### KÉRATODERMIE PLANTAIRE ET PALMAIRE

Que la *kératodermie* ait pour origine l'eczéma, le psoriasis, le pityriasis rubra pilaire, ou la syphilis, ou qu'elle se montre à titre primitif ou essentiel, elle est justiciable du même traitement local et présente la même ténacité, la même tendance aux récidives perpétuelles.

On donnera à l'intérieur : l'arséniate de soude à hautes doses, comme dans le psoriasis, ou l'on administrera le traitement spécifique, si la *kératodermie* est de nature syphilitique.

Le traitement local consiste tout d'abord à ramollir l'épiderme au moyen de bains prolongés, d'enveloppements humides, de gants de caoutchouc; quand la carapace cornée est molle, on l'enlève avec les ongles ou avec une curette, puis on applique des emplâtres au savon noir ou à l'acide salicylique, ou l'emplâtre de Vigo, ou l'emplâtre rouge de Vidal.

Lorsque, par l'application plus ou moins prolongée de ce traitement, on est parvenu à détacher tous les amas cornés, on cesse l'usage des emplâtres, on continue les bains et on fait deux fois par jour une friction avec le glycérolé tartrique de Vidal ou avec le glycérolé d'amidon simple, si l'irritation cutanée est trop grande.

E. SERGENT.

### LICHEN PLAN

Le traitement interne comporte avant tout une hygiène alimentaire sévère, analogue à celle qui convient à l'eczéma, au psoriasis, etc., et l'administration de l'arsenic à doses élevées et progressivement croissantes pendant des semaines ou même des mois consécutifs.

Le traitement externe consiste dans l'emploi du glycérolé tartrique de Vidal (acide tartrique, 1 gramme; glycérolé d'amidon, 20 grammes) ou d'une pommade à l'acide salicylique au cinquantième.