

Sa mère ne savait rien sur la source d'une infection antérieure, mais le chirurgien qui pratiqua l'opération soignait à ce moment ses enfants atteints de l'affection. Il semble donc presque certain que le premier enfant prit la fièvre, soit immédiatement avant, soit immédiatement après l'opération, de l'enfant chez lequel le rash venait justement de sortir, et que le second fut infecté au même moment par les vêtements du chirurgien qui pratiqua l'opération. D'autre part, dans plusieurs cas, des recherches très-attentives n'ont pu découvrir aucune source d'infection; et alors l'explication probable semblait être, que les sujets « avaient auparavant absorbé le poison, qui n'aurait pas manifesté ses effets aussitôt, et peut-être pas du tout, à moins d'épuisement ou de troubles de leur santé. »

L'intervalle entre l'opération et l'apparition du rash a été tout à fait aussi court que le rapporte le texte. Dans plusieurs cas l'éruption est sortie le jour suivant, et la période (de 12 à 36 heures, Gee) par laquelle les vomissements et l'élévation de température précèdent communément l'éruption a été à peine marquée d'une façon distincte.

Pour répondre d'avance à l'objection que la fièvre peut avoir déjà été sur le point d'éclater lorsque l'opération fut pratiquée, je puis dire que cette source d'erreur a été admise dans mon esprit; c'est une règle d'examiner la température, et si on la trouve plus élevée que le point normal, l'opération est invariablement ajournée.

La fièvre scarlatine paraît être la seule parmi les fièvres éruptives qui ait une tendance à attaquer les sujets immédiatement après une opération; car bien que des éruptions de rougeole aient été notées dans des circonstances semblables, leur occurrence a été si rare qu'on peut bien les regarder comme de simples coïncidences; on peut en dire autant de la petite vérole volante.

On pourra s'aider beaucoup, dans l'étude de ce sujet, d'un travail du Dr Braxton Hicks; il y discute l'apparition de la fièvre scarlatine immédiatement après la parturition, dans le but d'examiner ses relations avec la fièvre puerpérale. Dans cet essai, il démontre: 1° Que les patientes sont fréquemment atteintes de scarlatine après l'accouchement; 2° que les troubles apparaissent très-rapidement, généralement dans les quatre jours; 3° que les symptômes prémonitoires ordinaires sont souvent absents; 4° que la contagion est dans certains cas transmise au moment de l'accouchement, et dans d'autres qu'elle a eu lieu, autant qu'on peut s'en assurer, quelque temps auparavant; 5° que dans beaucoup de cas les symptômes s'écartent du type normal.

## TABLE DES MATIÈRES (1)

	Pages.
I. — RISQUES DIVERS DES OPÉRATIONS. — The various Risks of operations ( <i>Lancet</i> , 1867, vol. II).	
<i>Première leçon.</i> — Risques des opérations chez les sujets robustes, chez les sujets affaiblis, chez les enfants, chez les vieillards, chez les scrofuleux, les syphilitiques, les rhumatisants, les gouteux, dans le cancer, dans la pléthore, chez les buveurs, chez les <i>teetotalers</i> , chez les grands mangeurs, chez les personnes nerveuses, dans l'érysipèle, dans le phlegmon diffus, dans les affections aiguës.....	1
<i>Deuxième leçon.</i> — Risques des opérations dans la dyspepsie, dans la diarrhée, la constipation, dans les affections du foie, du cœur, des vaisseaux, dans la bronchite et dans la phthisie.....	26
<i>Troisième leçon.</i> — Risques des opérations dans les maladies des reins, de la vessie, du système nerveux.....	42
NOTES	
NOTE I. — Risques des opérations chez les enfants: par la douleur, l'hémorrhagie, les convulsions, les exanthèmes, la pyohémie, les affections du foie et des reins, la tuberculose, la première dentition, la pierre dans la vessie.....	55
NOTE II. — Préparations des alcooliques aux opérations.....	60
NOTE III. — Résultats des opérations chez les indigènes de l'Inde.....	61
NOTE IV.....	62
NOTE V. — Résultats des opérations chez les aliénés.....	63
II. — CONSIDÉRATIONS SUR QUELQUES MALADIES CONSTITUTIONNELLES. — Notes for the study of some constitutional diseases (inédit).	
Considérations générales. — Significations des noms. — Tendances ou prédispositions constitutionnelles à la maladie. — Variations des maladies constitutionnelles par la transmission héréditaire. — Évolution des maladies. — Preuves de l'hérédité. — Transformation de maladies locales et constitutionnelles. — Signes <i>minimes</i> des affections constitutionnelles. — Découverte des constitutions par les blessures et les maladies. — Périodes des affections constitutionnelles: climax, décroissance, retour. — Successions et combinaisons des constitutions. — États constitutionnels moins importants.	65

(1) Quelques-unes des monographies qui composent ce livre et qui ont trait au même sujet se trouvant séparées par suite de l'ordre adopté par M. Paget, nous avons cru pouvoir changer cet ordre sans inconvénient, et rapprocher les chapitres qui ont entre eux une certaine analogie.

	Pag
III. — CALAMITÉS DE LA CHIRURGIE. — The Calamities of Surgery ( <i>Clinical lecture</i> , 1868).	
De la mort imprévue à la suite des opérations. — Affections graves consécutives à des opérations légères. — Importance de l'examen de l'état constitutionnel et des antécédents pathologiques des opérés. — Évaluation des risques causés par l'opération. — Des conditions dans lesquelles il faut opérer. — Choix du milieu. — Choix de la méthode thérapeutique et du procédé opératoire. — Nécessité de ne rien négliger de ce qui doit servir à l'opération et au pansement. ....	114
IV. — DU BÉGALEMENT AVEC D'AUTRES ORGANES QUE CEUX DE LA PAROLE. — Stammering with other organs than those of speech ( <i>British medical Journal</i> , 1868, vol. II, p. 43).	
Du bégaiement avec les organes urinaires, l'œsophage, le rectum. ....	140
V. — AFFECTIONS QUE LES REBOUTEURS GUÉRISSENT. — Cases that bone-setters cure ( <i>Brit. med. Journ.</i> , 1867, vol. I, p. 1).	
Moyens employés par les rebouteurs; leur ignorance; luxations des tendons, des fibro-cartilages; raideur musculaire des articulations; entorses; affections articulaires de nature hystérique; mémoire du docteur Hood sur la pratique des rebouteurs; dangers de l'immobilisation trop prolongée dans les affections articulaires; lésions des articulations du rachis. ....	148
NOTES VI à X. ....	168
VI. — DE LA HERNIE ÉTRANGLÉE. — On Strangulated hernia ( <i>Brit. med. Journ.</i> , 1872, vol. I et II).	
Première leçon. — Signes à l'aide desquels on peut reconnaître qu'il faut ou non opérer une hernie étranglée. Signes locaux, tous les caractères de la hernie elle-même; signes à distance, arrêt des matières fécales, état de l'abdomen, vomissements; signes généraux, pouls, respiration, état général. ....	169
Deuxième leçon. — Indications et contre-indications des tentatives de réduction avant d'opérer une hernie étranglée. — Moyens adjuvants de la réduction: bains chauds, repos au lit, anesthésie, etc. — Mode de réduction. — De la réduction incomplète. ....	18
Troisième leçon. — Opération de la hernie étranglée. — Indications générales: Quand faut-il opérer; siège de l'étranglement par rapport au point où il convient d'inciser; manuel opératoire. — Indications et contre-indications de la réduction: État du liquide, de l'épiploon et de l'intestin contenus dans le sac. ....	197
Quatrième leçon. — Du traitement après l'opération de la hernie étranglée; le traitement ancien comparé au traitement moderne: valeur de l'expectation. — Nécessité de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles se trouve l'opéré. — Accidents consécutifs à l'opération; vomissements; péritonite. — Opérations qui ne soulagent pas. ....	212
NOTES XI à XIII. ....	228
VII. — PYOHÉMIE CHRONIQUE. — Chronic pyæmia ( <i>St. Bartholomew's hospital Reports</i> , vol. I, p. 1).	
Analogies de la pyohémie chronique avec la pyohémie aiguë. — Leurs différences. — Observations de pyohémie chronique. — Marche lente; diagnostic facile; pronostic favorable; la guérison est la règle. — Indications thérapeutiques. ....	250
OBSERVATIONS. ....	
I. Ligature de l'artère sous-clavière. — Pyohémie le 18 <sup>e</sup> jour. — Arthrite pyohémique. — Pneumonie lobulaire et éruption pustuleuse. — Hémorrhagies secondaires. — Mort le 65 <sup>e</sup> jour. ....	232
II. Lithotomie. — Frissons le jour suivant. — Suppurations répétées dans la région sterno-claviculaire. — Frissons et convulsions épileptiformes. — Suppuration dans la prostate. — Phlébite. — Guérison. ....	234

III. Nécrose aiguë du calcanéum gauche. — Phlébite. — Abscess. — Inflammation aiguë du genou droit. — Nécrose du fémur gauche. — Inflammation du coude et de la hanche. — Symptômes durant trois années. — Guérison. ....	237
IV. Rétrécissement urétral. — Rétention. — Cathétérisme. — Frissons. — Abscess pyohémiques. — Apparence de tumeur au voisinage du fémur. — Liqueur de potasse. — Guérison. ....	240
V. Lithootritie. — Troubles généraux aigus. — Abscess dans l'avant-bras; menaces d'abscess dans la cuisse. ....	242
VIII. — AFFECTIONS ORGANIQUES SIMULÉES. — Nervous mimicry ( <i>Lancet</i> , 1873, vol. II).	
Première leçon. — Simulation nerveuse ( <i>nervous mimicry</i> , <i>neuromimésie</i> ). — De la constitution nerveuse. — Du sentiment de fatigue. — De l'état de l'intelligence et de la volonté dans leurs rapports avec la neuromimésie. ....	247
Deuxième leçon. — La simulation nerveuse dans ses rapports avec l'hérédité, l'âge, le sexe, le sang-froid ( <i>cold-blooded</i> ), la température, les conditions mentales, l'état constitutionnel. ....	262
Troisième leçon. — Affections neuromimétiques des articulations. — Douleur, raideur et déformations des articulations. Leur valeur comme éléments du diagnostic entre les affections réelles et les affections simulées. ....	274
Quatrième leçon. — Atrophie périarticulaire. — Claudication. — Tuméfaction et température des articulations. Leur valeur diagnostique. ....	287
Cinquième leçon. — De la neuromimésie des affections du rachis. — Étude de la douleur, de la raideur, de la faiblesse, de la déformation rachidiennes et de la paraplégie dans leurs rapports avec les affections du rachis. ....	300
Sixième leçon. — Simulation nerveuse ( <i>neuromimésie</i> ) de tumeurs. — Tumeurs musculaires. — Tumeurs pulsatiles abdominales. — Tumeurs simulant des anévrysmes, des cancers du sein et de la langue. — Traitement de la neuromimésie. ....	314
IX. — HYPOCHONDRIE SEXUELLE. — Sexual hypochondriasis ( <i>Clinical lecture</i> , 1870).	
Ce qu'il faut entendre par hypochondrie sexuelle. — Ignorance des choses sexuelles. — Troubles sexuels en rapport avec l'hypochondrie: mucus urétral pris pour du sperme dans l'urine. — Du varicocèle considéré comme cause d'impuissance. — Des pertes séminales. — Impuissance. — Rêves et pertes séminales. — Erreurs des opinions de Lallemand et autres. — Traitement moral. — Des affections nerveuses attribuées aux pertes séminales. ....	334
X. — TRAITEMENT DE L'ANTHRAX. — Treatment of carbuncle ( <i>Lancet</i> , 1869, vol. I).	
Traitement local, avec ou sans incisions. — Comment on incise d'ordinaire. — Raisons que l'on donne en faveur de l'incision: elle arrête l'extension de l'anthrax, fait cesser la douleur, accélère la cicatrisation; cela est faux: inutilité presque absolue des incisions. — L'anthrax étant l'expression d'un état général morbide, il faut insister sur le traitement général: régime, aliments, toniques, pansement, milieu. — Mortalité. — Considérations sur l'anthrax des lèvres. ....	359
XI. — PHLÉBITE GOUTTEUSE. — Gouty Phlebitis ( <i>St. Bartholomew's hospital Reports</i> , vol. II, p. 82).	
La phlébite goutteuse est une variété de la phlébite adhésive. — Symptômes: symétrie, métastases apparentes, récurrences fréquentes. Hypertrophie musculaire probable dans la région œdémateuse. — Terminaisons: guérison commune, mais la mort par embolie est possible. — Elle est héréditaire comme les autres formes de la goutte. — Traitement, rien d'actif; régime approprié. — Siège commun: membre inférieur. — Siège rare: veines caves. — Phlébite post-fébrile. — De la phlébite chez les enfants. ....	376

	Pages.
XII. — ABCÈS RÉSIDUEUX. — Residual Abscesses ( <i>St. Bartholomew's hospital Reports</i> , 1869, vol. V).	
Abcès qui se forment dans les foyers anciens d'inflammation. — On les rencontre surtout dans les affections du rachis, de la hanche, dans certains cas de nécrose de l'intérieur des os longs; dans les abcès ganglionnaires. — Intervalle souvent très-long entre les rechutes. — Ces abcès offrent tantôt les caractères des abcès aigus, tantôt ceux des abcès froids. — Difficultés du diagnostic dans ce dernier cas.....	395
XIII. — DES VIRUS CADAVERIQUES. — Dissection-poisons ( <i>Lancet</i> , 1871, vol. I, p. 735, 774).	
Différence de gravité des accidents consécutifs aux piqûres anatomiques. Causes : nature du virus, soins immédiats, susceptibilité individuelle, immunité acquise. — Cette immunité peut se perdre : exemple personnel de l'auteur et d'autres anatomistes. — Histoire de la maladie de sir James Paget. Influence de la fatigue, d'une affection antérieure, de la distribution des lymphatiques, de la constitution, sur le développement, la marche et les complications de cette maladie. — Virulence du pus des abcès pyohémiques.....	407
XIV. — NÉCROSE LATENTE. — Quiet necrosis ( <i>Clin. Soc. trans.</i> , vol. III, p. 138).	
Nécrose osseuse sans phénomènes inflammatoires locaux intenses, et sans symptômes généraux, depuis son début jusqu'à l'issue des séquestres. Analogie de cette affection avec certaines variétés des corps étrangers articulaires, au point de vue de la pathogénie de ces derniers. — Difficultés du diagnostic.....	427
XV. — SCROFULE SÉNILE. — Senile scrofula ( <i>St. Bartholomew's hospital Reports</i> , vol. III, p. 412).	
Existence indubitable de cette affection. Ses caractères sont à peu près les mêmes que ceux de la scrofula <i>juvénile</i> . Difficulté du diagnostic de la scrofula chez les vieillards; sa confusion possible avec les manifestations de la goutte et du cancer. Impuissance du traitement antiscrofuleux chez les vieillards.....	432
XVI. — APPARITION DE LA FIÈVRE SCARLATINE APRÈS LES OPÉRATIONS. — Scarlet fever after operations ( <i>Brit. med. journ.</i> , 1864, vol. III, p. 237).	
Modifications de la scarlatine qui survient après les opérations : brièveté de la période d'incubation; éruption générale simultanée, absence d'angine et de desquamation dans certains cas. — Influence de l'opération sur la production.....	438
NOTES	
NOTE XVII.....	442

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES



  
1030000756

