

QUATRIÈME PARTIE

ANTISEPSIE OBSTÉTRICALE

INTRODUCTION

	Pages
§ I. Délimitation du sujet. — Quelques indications bibliographiques. — Le médecin qui néglige l'antisepsie obstétricale est coupable.	244

CHAPITRE I

De l'antisepsie obstétricale en général.

Son importance n'est pas moindre que celle de l'antisepsie chirurgicale. — Elle doit sauvegarder l'accouchée de tout accident septique.

Qu'est-ce que la septicémie puerpérale au point de vue pathogénique? — État de nos connaissances actuelles en microbiologie sur la septicémie puerpérale. Pasteur, Doléris, Cornil et Babès, Arloing, Doyen. Prédilection de la femme enceinte à la septicémie.

L'antisepsie obstétricale doit: 1° empêcher la septicémie; 2° la combattre lorsqu'elle existe. — Elle doit donc être: 1° prophylactique (directe ou indirecte); 2° curatrice.

Il faut que l'accouchement soit aseptique: c'est le premier et principal but à atteindre par l'antisepsie.

Il ne peut y avoir de bonne antisepsie obstétricale sans une hygiène sévère.

Division du sujet. 251

CHAPITRE II

L'accoucheur.

Désinfection des personnes qui donnent des soins aux accouchées. — Désinfection des mains, des vêtements.

	Pages
De l'usage des manchettes et des vêtements de toile. — Des précautions à prendre par les praticiens.	
Un accoucheur peut-il faire des autopsies?	
L'instruction de l'accoucheur est un puissant auxiliaire de l'antisepsie.	
La devise de l'accoucheur doit-être: <i>science, patience, propreté.</i>	260

CHAPITRE III

Les antiseptiques en obstétrique.

Des principaux antiseptiques employés en obstétrique. — Du choix d'un bon antiseptique obstétrical dans une Maternité et en clientèle.

Alcool. — Sulfate de cuivre. — Acide borique. — Iodoforme. — Nitrate d'argent. — Acide phénique. — Bichlorure de mercure. — Biiodure de mercure. — Eau naphtholée.

De la coloration des différents antiseptiques. 270

CHAPITRE IV

Antisepsie de l'arsenal obstétrical.

De la désinfection des instruments en général. — Leur nettoyage.

Récipient pour vaseline.

Des injecteurs: qualités requises pour un injecteur — Canules vaginales. — Sondes intra-utérines. — Bassin.

Bout de sein. — Tire-lait.

Objets de pansement. 287

CHAPITRE V

Des injections.

Des injections vaginales Manuel opératoire.

Des injections intra-utérines. — Manuel opératoire. — Leurs dangers.

De l'irrigation intra-utérine prolongée et continue. 305

CHAPITRE VI

De l'antisepsie dans l'avortement.

- Les précautions à prendre pour l'avortement sont aussi importantes et nécessaires que pour l'accouchement.
 Antisepsie de l'avortement sans complications.
 Traitement antiseptique des complications de l'avortement : hémorragies, rétention du placenta, septicémie.
 Curage et écouvillonnage de l'utérus.
 Expectation antiseptique. 314

CHAPITRE VII

De l'antisepsie pendant la grossesse.

- Nécessité de l'examen des femmes enceintes. — Choix du local. — Bains. — Injections vaginales pendant la grossesse.
 Traitement antiseptique des écoulements vaginaux et des végétations pendant la grossesse.
 Propreté des seins.
 Du cathétérisme pendant la grossesse.
 Précautions antiseptiques générales. 325

CHAPITRE VIII

De l'antisepsie pendant le travail.

- Examen de la femme. — Garniture du lit. — Toilette de la femme. — Précautions à prendre pour le toucher vaginal.
 Des injections vaginales pendant le travail. — Les réservoirs (rectum, vessie) doivent être vides. — Le spray est inutile.
 Précautions à prendre au moment de l'expulsion du fœtus. 335

CHAPITRE IX

Antisepsie de la délivrance.

- La délivrance doit être complète. — Précautions à prendre après l'accouchement : s'abstenir du toucher.
 Des diverses méthodes de délivrance.

- Traitement antiseptique des hémorragies liées à la délivrance.
 La délivrance artificielle est une opération grave, pour laquelle une asepsie rigoureuse est indispensable.
 Nécessité de l'injection intra-utérine après la délivrance artificielle. 344

CHAPITRE X

Traitement de certaines complications qui surviennent pendant l'accouchement.

- L'antisepsie des plaies du canal vulvo-vagino-utérin doit être rigoureuse.
 Des hémorragies liées aux ruptures vasculaires.
 Déchirures vulvaires. Thrombus de la vulve.
 Traitement antiseptique des déchirures du périnée. — De l'emploi des serres-fines. — Suture immédiate. — Traitement des lésions du vagin.
 Traitement antiseptique des déchirures et des ruptures de l'utérus, de l'inversion utérine.
 Les plaies des éclampsiques 351

CHAPITRE XI

De l'antisepsie opératoire.

- De l'importance du diagnostic avant toute opération.
 Version par manœuvres internes. — Extraction du siège. — Forceps. — Basiotripsie. — Craniotomie. — Embryotomie.
 Opération césarienne. — Opération de Porro.
 Grossesse extra-utérine. — Gastro-élythrotomie.
 Rupture artificielle des membranes. — Accouchement prématuré artificiel.
 Tamponnement. 365

CHAPITRE XII

De l'antisepsie pendant les suites de couchés.

- Toilette de la femme après l'accouchement. — Son lit.

	Pages
Les suites de couches doivent être apyrétiques : nécessité de prendre la température matin et soir.	
De l'alimentation de la femme. — Q'est-ce que la fièvre de lait ?	
Une femme doit allaiter.	
Toilettes vulvaires. — Injections vaginales. — Injections intra-utérines.	
De la conduite à tenir pendant les suites de couches dans certains cas (rétention des membranes, cancer utérin, etc).	
Accidents fébriles non puerpéraux (fièvre intermittente, pyrexies).	
De la rétention d'urine et du cathétérisme.	
Des lymphangites du sein.	
Stercorémie et lavement.	
Pendant combien de temps durent les suites de couches ?	
De l'involution utérine.	
Du traitement antiseptique prolongé.	384

CHAPITRE XIII

Traitement antiseptique de septicémies puerpérales.

Des principaux symptômes qui révèlent l'infection puerpérale : élévation de température, accélération du pouls, fétidité des lochies, frissons, vomissements, douleur abdominale, etc.	
De la nécessité d'intervenir le plus rapidement possible après l'apparition des accidents.	
Du traitement antiseptique de la septicémie puerpérale. — Traitement général : alcool, toniques, diurétiques (lait, café). — Traitement antithermique : soit par les médicaments (sels de quinine, antipyrine, etc.); soit par les bains froids ; soit par l'application de glace sur le ventre. — Traitement local (cataplasme, sangsues, onctions mercurielles, etc).	
De la médication désinfectante locale : des injections vaginales ; de l'irrigation vaginale continue ; des injections intra-utérines répétées ; du drainage utérin ; de l'irrigation utérine continue.	
Traitement antiseptique des complications tardives.	
Mesures générales de désinfection.	403

CHAPITRE XIV

L'antiseptie du nouveau-né.

	Pages
Toilette du nouveau-né.	
Pansement du cordon ombilical.	
Pansement des plaies (contuses ou non) produites pendant l'accouchement.	
Pansement du céphalœmatome.	
Traitement prophylactique et antiseptique de l'érysipèle du nouveau-né.	
Traitement prophylactique et curatif de l'ophtalmie purulente des nouveau-nés.	
Antiseptie de la vaccination.	425

CHAPITRE XV

Antiseptie et hygiène de l'allaitement.

De l'allaitement naturel par <i>la mère</i> ou par une <i>nourrice</i> . — Une femme ne peut nourrir que si l'allaitement n'offre de danger ni pour elle ni pour l'enfant. — Précautions à prendre pour empêcher l'infection syphilitique. — Des soins de propreté à observer au moment de chaque tétée. — Traitement antiseptique des ulcérations, des lymphangites du sein. — Traitement prophylactique et antiseptique des abcès du sein. — De l'allaitement artificiel. — Le moins mauvais biberon ne vaut pas le sein. — De la manière de nettoyer le biberon. — L'allaitement au verre, à la cuiller est préférable au biberon. — Soins de propreté pour l'allaitement direct par les animaux	452
---	-----

CHAPITRE XVI

L'antiseptie et l'hygiène dans les maternités.

Dans une Maternité *construite, dirigée, entretenue* suivant toutes les règles de l'hygiène et de l'antiseptie, la sécurité est complète pour les accouchées.

	Pages
Une Maternité doit être en dehors de l'hôpital ou tout au moins isolée dans l'hôpital.	
Des progrès à réaliser au point de vue de l'hygiène et de l'antisepsie dans la plupart des Maternités françaises. — Projet de Maternité modèle.	
Soins antiseptiques et hygiène dans les principales Maternités de Paris.	
Les services externes des hôpitaux (accouchements chez les sages-femmes) doivent être peu à peu supprimés.	
Les statistiques montrent que la mortalité et la morbidité diminuent à mesure que l'antisepsie est mieux faite.	
C'est grâce à l'antisepsie que les épidémies de fièvre puerpérale ont cessé.	465

TABLE ANALYTIQUE

GÉNÉRALE

A	
Abcès du sein, II, 457.	Acnés, I, 178.
— froids, II, 131.	Affections ulcéreuses non spécifiques, I, 240.
— du foie, II, 201.	— spécifiques, I, 245.
Accidents dus à l'emploi du sublimé, II, 97.	— des tissus et des systèmes, II, 136.
Accommodation aux antiseptiques, I, 60.	Albuminate de mercure, I, 207.
Accouchement prématuré artificiel, II, 377.	Alcalins, I, 157.
Acétate d'alumine, I, 70.	Alcaloïdes de putréfaction (rôle des) dans les diarrhées, II, 361.
Acide acétique, I, 70.	Alcool camphré, I, 153.
— arsénieux, I, 71.	— éthylique, I, 69.
— benzoïque, II, 59.	Alimentation de la femme en couches II, 389.
— benzoïque et benzoates, I, 73.	Allaitement naturel, II, 453. Artificiel, II, 461. Par les animaux, II, 464.
— borique, I, 72, 154. — II, 274.	Alun, I, 70.
— chlorhydrique, I, 76.	Amphithéâtre d'opérations, II, 241.
— fluorhydrique, I, 85.	Amputations dans la continuité, II, 167.
— formique, I, 86.	— dans les tissus altérés, II, 170.
— lactique, I, 90.	Amygdalite herpétique, contagiosité, traitement antiseptique, I, 202.
— lactique dans la diarrhée verte microbienne, I, 367.	— infectieuse, I, 201.
— oxalique, I, 214.	— par infection, I, 198.
— oxynaphthoïque, I, 440.	Angine diphthérique, (traitements de l') I, 204.
— phénique, I, 100, 165. — II, 278.	Angine œdémateuse infectieuse, I, 199.
— phénique, (excipients), I, 101.	— diphtéroïde, I, 203.
— phénique dans la fièvre typhoïde, I, 414.	Antagonisme des microcoques phlogogènes et du charbon, I, 24.
— picrique, I, 104, 165.	— des microbes, I, 23.
— pyrogallique, I, 104.	Anthrax, I, 156. — II, 139.
— salicylique, II, 60.	Antisepsie chimique, II, 33.
— salicylique et salicylates, I, 106.	— chirurgicale, II, 1.
— salicylique, salicylate, I, 211.	— physique, II, 11.
— sulfureux, I, 110.	Antiseptiques en obstétrique, II, 270.
— picrique, I, 104.	32