

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Abaisse-langue, I, 347.

Abcès du cerveau, I, 132; de la cavité nasale, I, 327; de l'articulation temporo-maxillaire, I, 441; dentaire, I, 464; de la langue, I, 524.
— du cou, I, 629; incision, I, 637; abcès des muscles du cou, I, 632; abcès développé dans le tissu conjonctif de la base de l'épiglotte, I, 632; abcès rétro-pharyngien et rétro-œsophagien, I, 638 et II, 905; abcès préviscéraux, I, 633; abcès caséux du cou, I, 636.
— de la paroi thoracique, II, 48; du poumon, II, 49; rétrosternaux, II, 53; péripleurétiques, II, 54.
— du sein, II, 83; rétromammaires, II, 84.
— de la cavité abdominale, II, 128, 172; intrapéritonéaux, II, 178; parapéritonéaux, II, 172; prépéritonéaux, II, 173; périnéphritiques, II, 174; rétopéritonéaux, II, 175; sous-séreux des fosses iliaques, abcès paramétritiques et péritiphilitiques, II, 175, III, 334; périmétritiques, II, 179; abcès du foie, II, 181; de la vésicule biliaire, II, 186; abcès de la rate, para et périsplénitiques, II, 186; abcès consécutifs à un épanchement stercoral, II, 188; abcès périproctiques, II, 517; abcès disséquants de la fosse ischio-rectale, II, 517; abcès de la paroi vésicale, II, 679, 684; abcès urinaux, II, 474, 608, 679.
— du testicule, II, 753.
— dans la carie de la colonne vertébrale, II, 900; traitement, II, 926.
— périarticulaires de l'épaule, III, 68; de l'aisselle, III, 74.
— dans les affections du bassin, III, 334; intra-pelviens, III, 332; abcès de la région du cordon, III, 334; paravésicaux, III, 334.

— dans le domaine du psoas, III, 335.
— dans le domaine du muscle iliaque, III, 336.
— développés dans les muscles de la fesse, III, 338.
— dans les cas de coxite, III, 414; traitement, III, 448; abcès de la bourse séreuse trochantérienne, III, 422.
— dans les cas d'arthrite du genou, III, 566; traitement, III, 577.
— du tibia, III, 690.
— dans les cas de suppuration de l'articulation tibio-tarsienne, III, 736.
— de la région métatarsienne, III, 834.
Abcès par congestion, dans les affections de la colonne vertébrale, II, 900, 926; transformation kystique, II, 905; traitement, II, 926; dans l'arthrite tuberculeuse de l'épaule, III, 68; dans l'arthrite tuberculeuse du coude, III, 152; intra-pelviens, III, 332; dans la coxite, III, 414; traitement, III, 448; dans l'arthrite fongueuse du genou, III, 591.
Abdomen, maladies, II, 125; lésions traumatiques, remarques générales, II, 125; contusions, II, 129; plaies, II, 142; affections inflammatoires, II, 162; inflammations circonscrites, II, 172; ponction, II, 190; tumeurs, II, 195; diagnostic de ces dernières, II, 268; exploration, II, 268.
Abdominales (parois), lésions traumatiques, II, 129; plaies non pénétrantes, II, 142; plaies pénétrantes, II, 143; traitement, II, 150; abcès, II, 172; tumeurs, II, 196; kystes, échinocoque, II, 196; sarcome et fibrome, II, 197; lipome, papillome, carcinome, tumeurs de granulations chez les enfants, II, 198.

Abdominale (cavité), plaies pénétrantes, II, 143; épanchement de matières fécales, II, 188; accumulation du liquide, II, 190; accumulation de gaz, II, 194; tumeurs, II, 201; échinocoque, II, 202; diminution de capacité dans les cas de hernies volumineuses, II, 333.

Accouchement provoqué dans les cas de tumeur de l'ovaire, II, 224.

Acéphalie, I, 198.

Acéphalocystes, II, 204.

Acide lactique, inhalation à la suite de la trachéotomie, I, 825, 831.

— *nitrique*, son emploi comme caustique dans les tumeurs hémorroïdaires, II, 345.

— *salicylique*, son emploi comme moyen de prévenir la décomposition de l'urine, II, 643; son emploi dans les catarrhes de la vessie, II, 682.

— *succinique*, sa présence dans le liquide des kystes à échinocoques, II, 205.

— *urique*, son élimination dans l'arthrite goutteuse, III, 839.

Acinésie de la vessie, II, 693.

Acoustique (nerf), sa paralysie dans les lésions traumatiques du crâne, I, 48.

Acné rosacé du nez, I, 295.

Acromion, fractures, III, 21; solution de continuité sans fracture dans l'arthrite déformante, III, 21.

Actinomyose, I, 465, 631; des vertèbres, II, 901.

Adénite suppurée du cou à la suite de la diphtérie, I, 503; de l'aisselle, III, 74; de la région de l'aîne, III, 511.

Adénome des glandes sudoripares de la face, I, 248; de la cavité nasopharyngienne, I, 336, 343; du palais, I, 486; du sein, II, 100; de l'ovaire, II, 211; adénome cylindro-cellulaire de l'ovaire, II, 214; adénome polypeux du rectum, II, 764; du testicule, II, 356.

Adéno-fibrome de l'ovaire, II, 211; de la cavité naso-pharyngienne, I, 336.

Adéno-myxome de l'ovaire, II, 212.

Adéno-sarcome du sein, II, 98; de l'ovaire, II, 212.

Adhérences, du voile du palais avec la paroi postérieure du pharynx, I, 483; de la langue, I, 519.

— des kystes de l'ovaire avec le péritoine, II, 230.

— de l'intestin dans le sac herniaire,

II, 334; manière de détruire ces adhérences, II, 359.

— de l'épiploon dans le sac herniaire, II, 336.

— épithéliales de l'anus, II, 497.

— du prépuce avec le gland II, 716.

— des doigts, III, 241, 247; traitement, III, 247.

Agnathie, I, 362.

Aiguille à ligature de DESCHAMPS, I, 266.

Aiguille à manche de LANGENBECK, I, 497; de PASSAVANT, I, 497.

Air, injection forcée dans le rectum comme moyen de traitement de l'étranglement interne, II, 315.

— (entrée de l') dans les sinus de la dure-mère, I, 34, 197; dans les veines du cou, I, 616; dans la cavité thoracique, II, 19; dans la plèvre, lors de la thoracocentèse, II, 66.

Albuminurie consécutive aux lésions traumatiques du crâne, I, 113.

Alcool (injection d') dans le voisinage des orifices herniaires, II, 350.

Allongement du membre inférieur, apparent, III, 333; réel, III, 353, 482.

Amaurose à la suite des lésions traumatiques de la tête, I, 82; à la suite d'abcès dentaires, I, 446.

Amputation du sein, II, 118; du pénis, II, 725.

— du bras, III, 403.

— de l'avant-bras, III, 220; des métacarpiens, III, 300; des doigts, III, 303.

— de la cuisse, III, 324; transcondylienne, III, 663; de GRITTI, III, 665.

— de la jambe, III, 696.

— partielle du pied, III, 753; de LISFRANC, III, 755; de CHOPART, III, 757; astragalo-calcanéenne, III, 761; sous-astragalienne, III, 761; de PIROGOFF, III, 763; de Syme, III, 768; du métatarse, III, 849.

— des orteils, III, 850.

Amygdales, maladies, I, 505; processus inflammatoires, I, 506; érysipèle, I, 507; herpès, I, 508; diphtérie, I, 508; hypertrophie, I, 511; ablation partielle, I, 513; ulcérations catarrhales, syphilitiques, tuberculeuses, lupus, I, 513; abcès, phlegmon, I, 516; tumeurs, I, 518; extirpation (WEBER), I, 518.

Amygdalite folliculaire, I, 510.

Amygdalotomie, I, 514.

Anaspadias, II, 588.

Anatomie des lésions traumatiques

du crâne, I, 14; des lésions traumatiques des parties molles endocrâniennes, I, 32; du contenu de la boîte crânienne, I, 70; des circonvolutions du cerveau, I, 101; des sinus frontaux, I, 355; de la parotide, I, 571; de la glande thyroïde, I, 678; du larynx et de la trachée, I, 802.

— de la glande mammaire, II, 90.

Anatomie des hernies inguinales, II, 434; du canal inguinal, II, 437; des hernies crurales, II, 447.

— des organes génitaux de l'homme, II, 579; du testicule et de ses enveloppes, II, 735; de la prostate, II, 766.

— de la colonne vertébrale, II, 803, 831; des vertèbres de rotation du cou II, 843.

— de la clavicle, III, 1; de l'articulation de l'épaule, III, 34; de l'articulation du coude, III, 119; des veines du bras, III, 141; des nerfs du bras, III, 195; de l'articulation du poignet, III, 210; des articulations métacarpo-phalangiennes, III, 254.

— des abcès du bassin, III, 332; de l'articulation de la hanche, III, 343; de l'artère fémorale, III, 507; de l'articulation du genou, III, 530; des vaisseaux de la jambe, III, 700; de l'articulation tibio-tarsienne et du tarse, III, 702; de l'articulation de LISFRANC, III, 755; de l'articulation de CHOPART, III, 759; anatomie pathologique du pied-bot varus, III, 788; du pied-plat, III, 824.

Anencéphalie, I, 198.

Anesthésiation, dans la résection des maxillaires, I, 432, 451; dans la trachéotomie, I, 816; dans l'exploration de l'abdomen, II, 273; dans la réduction des hernies, II, 398; dans l'exploration du rectum, II, 486; dans le cathétérisme chez les individus affectés d'hypertrophie de la prostate, II, 785; dans la réduction des luxations de l'épaule, III, 48.

Anesthésie consécutive à la carie de la colonne vertébrale, II, 904; aux fractures de la colonne vertébrale, II, 816.

Anévrismes de la temporale, de l'auriculaire postérieure, I, 164; de la carotide cérébrale, I, 165, 255; cirsoïdes, I, 169; des artères de la face, I, 255; de la région palatine, I, 486; de la langue, I, 541.

— de l'aorte, II, 49; spontanés de la carotide, I, 602; de la sous-clavière,

I, 603; de l'artère axillaire, III, 55; de la région du bras, III, 101; de l'artère humérale au pli du coude, III, 144; des artères radiale et cubitale, III, 199.

— des artères du bassin, III, 325; traitement, III, 326 (méthodes d'ANEL, d'ANTYLLUS); de la région de la cuisse, III, 504; du creux poplité, III, 666; de la jambe, III, 700.

Angine catarrhale, I, 510; phlegmoneuse, I, 516; de LUDWIG, I, 633.

Angiomes du crâne, I, 166; simple, I, 166; caverneux, I, 167; fissuraux, I, 168; cirsoïde, I, 169, 255; de la face, I, 255; des lèvres, I, 390; du maxillaire inférieur, I, 444; du palais, I, 486; de la langue, I, 541; de l'oreille, I, 578; du cou, I, 653; plexiforme, I, 663; du rectum, II, 555; du pénis, II, 724; du scrotum, II, 733; de la main et des doigts, III, 296.

Ankyloblépharon, I, 277.

Ankylochilie, I, 399.

Ankylose faussée de la mâchoire, I, 407; de l'articulation temporo-maxillaire, I, 442; des vertèbres, II, 932; de l'épaule III, 71; de l'articulation du coude, III, 156; à la suite de la résection, III, 161; de l'articulation du poignet, III, 215; traitement, III, 219; des doigts, III, 287; de l'articulation de la hanche, III, 457; du genou, III, 618; de l'articulation tibio-tarsienne, III, 770.

Anomalies de position du testicule, II, 728.

Anorchidie, II, 727.

Anostose des os du crâne, I, 191.

Anthrax du dos, II, 48.

Antiseptisme dans les blessures de la tête, I, 3, 7, 14, 51, 121 et 137; dans l'ouverture des abcès du cou, I, 638; dans les blessures de la face et opérations, I, 216, 292; dans les opérations de bec-de-lièvre, I, 385; dans les opérations d'empyème, II, 69; dans l'ouverture des abcès du sein, II, 85; dans l'amputation du sein, II, 118; dans l'ovariotomie, II, 225; dans l'opération radicale des hernies, II, 360; dans la herniotomie, II, 405; dans la proctotomie, II, 498; dans l'extirpation du rectum, II, 574; dans les blessures de la main, III, 234; dans l'opération des panaris, III, 285; dans la résection de la hanche, III, 472; dans les fractures compliquées de la cuisse,