

- III, 275; syphilis, III, 277; lupus, III, 278.
- infection par le virus cadavérique et le charbon, piqûres d'insectes, III, 279; furoncles, III, 280; dermatite apyrétique, érysipèle, III, 280; panaris, III, 281; traitement, III, 283.
- ankylose, III, 288; doigt à ressort, III, 289.
- verrues, éléphantiasis, tumeurs vasculaires, lipomes, III, 295; autres tumeurs, III, 297.
- maladies des ongles, III, 298.
- opérations, III, 300.
- Dos** (région du), acné, furoncle, anthrax, II, 48; lipome, II, 50; fibrome, molluscum, II, 50.
- Douche nasale**, I, 326.
- Douglas** (cavité de), abcès, II, 477, 479.
- Douleur scapulaire à droite**, dans les lésions traumatiques du foie, II, 132, 459; dans l'abcès du foie, II, 183.
- réflexe dans les calculs vésicaux, II, 651; dans l'orchite, II, 732.
- Drainage** des kystes suppurés de l'ovaire, II, 221; de la cavité abdominale à la suite de l'ovariotomie, II, 237; suivant la méthode de BAR-DENHEUER, II, 571.
- Dure-mère**, blessure, décollement, I, 32, 91; syphilis, I, 481; tumeurs, I, 194.
- spinale, affection à la suite de la carie des vertèbres, II, 900.
- Dysenterie**, II, 528.
- Dysentériques** (ulcérations) de l'intestin, II, 293.
- Dysmorphostéopalinclaste**, III, 496.
- Dysphagie** de Valsava, I, 593; à la suite des lésions traumatiques de la face, I, 213.
- Dyspnée** dans les lésions traumatiques du poumon, II, 33.
- Dysurie**, II, 598; dans l'hypertrophie de la prostate, II, 780.

E

- Ecartement**, voir **Diastase**.
- Ecchymoses**, dans les fractures de la base du crâne, I, 44; de la paroi abdominale, II, 130; de la cuisse dans l'hématome sous-séreux, II, 430.
- Echinocoque**, II, 202; multiloculaire, II, 204; de la langue, I, 537; du cou, I, 654; de la glande thyroïde, I, 709 de la cavité pleurale,

- II, 75; de la glande mammaire, II, 100; de la paroi abdominale, II, 196; de la cavité abdominale, II, 202; du foie, II, 205; du rein, II, 250; de la rate, II, 262; dans les sacs herniaires, II, 331; du rectum, II, 555; de la vessie, II, 688; entre la vessie et le rectum, II, 783; de l'humérus, III, 76; du tissu cellulaire du bassin, III, 340; de la région fessière, III, 342; de la cuisse, III, 342.
- Eclampsiques** (convulsions) lors de la dentition, I, 437.
- Ecorce** du cerveau, centres moteurs, I, 105.
- Ecrasement** (fracture par) des corps vertébraux, II, 806; du calcanéum, II, 722.
- des fibromes naso-pharyngiens, I, 348.
- Ecraseur** de MAISONNEUVE, DES-GRANGES, I, 349.
- Ectasie** des sinus frontaux, I, 357; de l'œsophage, I, 732; des vaisseaux de l'avant-bras, III, 499.
- Ectopie** des organes thoraciques, du cœur, II, 4; de la vessie, II, 595; du testicule, II, 728.
- Ectropion** des paupières, des lèvres, I, 277.
- Eczéma** de l'oreille externe, I, 576; de la peau de la glande mammaire, II, 79; à la suite du port de bandages herniaires, II, 354; du scrotum, II, 733; de la jambe III, 677.
- Elasticité** de la boîte crânienne, I, 46.
- Electricité**, son emploi dans le traitement de la paralysie du sphincter de la vessie, II, 700; dans le traitement de l'hydrocèle, II, 743; dans l'impuissance, II, 791; dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 830.
- Electrolyse** dans les fibromes naso-pharyngiens, I, 349; dans le goître, I, 699.
- Eléphantiasis** des mâchoires, I, 424; de l'oreille externe, I, 578; du pénis, II, 725; du scrotum, II, 734; de la main et des doigts, III, 296; de la jambe, III, 684.
- Elongation** des nerfs, I, 261; du facial, dans la convulsion mimique de la face, I, 275; du plexus brachial, I, 619; de l'occipital et de la 3^e paire cervicale, I, 620; du sciatique, III, 510; à la suite des fractures de la colonne vertébrale, II, 830 des nerfs du bras, III, 57, 198.
- Embolie** des artères du pied, III, 840

- Empysème** des téguments, dans les fractures du crâne, I, 50; à la suite des blessures: du sinus maxillaire, I, 221; du sinus frontal, I, 227; des voies respiratoires, I, 594, 623; dans les plaies non pénétrantes de la région axillaire, II, 4; à la suite des fractures de côtes, II, 13; à la suite des blessures du poumon, II, 20, 25, 28.
- Empyème** du maxillaire supérieur, I, 419; de la cavité thoracique, II, 57; empyème perforant, II, 60; opération avec et sans résection des côtes, II, 68; traitement consécutif, II, 70.
- du genou, III, 566; érysipélateux, III, 569.
- Encéphalite aiguë**, I, 423; à la suite de plaies contuses du cerveau, I, 418.
- Encéphalocèle**, I, 202; au niveau du palais, I, 486.
- Encéphaloïde** du maxillaire supérieur, I, 424; de la parotide, I, 565; de la glande mammaire, II, 105; du rein, II, 239; de l'omoplate, III, 78.
- Enchondrome** de la cloison du nez, 343; de la glande sous-maxillaire, I, 573; du sinus maxillaire, I, 422; du rebord alvéolaire, I, 424; du corps du maxillaire supérieur, I, 426; du maxillaire inférieur, I, 445; du palais, I, 487; de la langue, I, 542; de la parotide, I, 563; du conduit auditif externe, I, 567, 578; de la paroi thoracique, II, 55; de la glande mammaire, II, 99; du pénis, II, 725; des tuniques vaginales du testicule, II, 748; du testicule, II, 761; de l'omoplate, III, 77; de l'humérus, III, 103; de la main et des doigts, III, 297; des orteils, III, 831.
- Enchondrosarcome** rétro-pharyngien, I, 726.
- Endoscope**, pour l'examen de l'urètre et de la vessie, II, 599.
- Enfoncement**, voir **Dépression**.
- Engouement**, II, 364.
- Enostoses** du crâne, I, 189.
- Entéroécèles**, II, 325.
- Entéro-épiplocèles**, II, 335.
- Entérotome**, de DUPUYTREN, de BLASIUS, II, 480.
- Entérotomie** pour corps étrangers, II, 280; dans les étranglements internes, II, 318; indication, II, 322; procédé opératoire, II, 323.
- iliaque, II, 573, 578.
- Entorse**, voir **Distorsion**.
- Entropion** des paupières, des lèvres, I, 277.
- Enurésie**, II, 697; dans les rétrécissements, II, 621; dans les calculs de la vessie, II, 651.
- nocturne des enfants, II, 698.
- dans l'hypertrophie de la prostate, II, 779.
- Enveloppes** du crâne, voir **téguments**.
- du sac herniaire, II, 326; de la hernie inguinale, II, 438.
- Epanchement** de matières stercorales, II, 148, 155, 161, 166.
- Epaule haute**, dans la scoliose, II, 881; abaissement dans les fractures de la clavicule, III, 5; blessures par armes à feu, III, 65; déformation dans la paralysie des muscles de l'épaule, III, 58; tumeurs, III, 77.
- (**articulation de l'**), anatomie et mécanisme, III, 34; luxations, III, 37; troubles fonctionnels, III, 58; névralgie, III, 63; inflammation aiguë, III, 64; blessures par armes à feu, III, 65; hydarthrose, III, 64; suppuration dans l'ostéomyélite et la syphilis de l'humérus, III, 65; tuberculose, III, 66; symptômes des inflammations, III, 67; pronostic, III, 70; traitement, III, 72; arthrite déformante, III, 70; ankylose, articulation ballante, III, 71.
- résection, indications et résultats, III, 80; procédés opératoires, III, 84.
- désarticulation, III, 89.
- Epaule** (luxations de l'), III, 34; préglonoidienne, III, 37; symptômes, III, 40; luxation verticale, sus-coracoïdienne, III, 42; rétroglonoidienne, III, 43; pronostic, III, 44; habituelle, III, 46; méthode de réduction, III, 48.
- Eperon** dans l'anus contre-nature, II, 473; sa destruction, II, 480.
- fémoral, III, 383.
- Epicondyle** de l'humérus, fracture isolée, III, 108.
- Epicystite**, II, 675.
- Epicystotomie**, II, 671.
- Epididyme**, lésions traumatiques, II, 749; inflammation aiguë, II, 753; inflammation chronique, II, 756; syphilis, II, 757; tuberculose, II, 758; kystes, II, 759; tumeurs, II, 760.
- Epididymite** aiguë, 753; chronique, II, 756.

Epiglote, plaies par instruments tranchants, I, 621.
— (bourrelet de l'), I, 763.

Epilepsie (accès d') par irritation de la couche corticale du cerveau, I, 108; à la suite des lésions traumatiques de la tête, I, 142.

Epine de l'omoplate, fractures, III, 20.

Épiphyes de l'articulation de la hanche, leur influence sur la croissance du membre, III, 467; du fémur, décollement dans l'ostéomyélite, III, 514; disjonction de cause traumatique, III, 557.

Épiploon, déchirure dans la contusion de l'abdomen, II, 131; hernie, II, 146; traitement, II, 150; tumeurs, II, 263; sa présence dans les sacs herniaires, II, 335; dégénérescence dans les hernies, II, 335, 338; adhérence fœtale avec le testicule, II, 335; adhérences dans le sac herniaire, II, 336; étranglement, II, 369; inflammation et suppuration dans le sac herniaire, II, 380; traitement dans la herniotomie, II, 421.

Épiplocèle, II, 335; diagnostic avec le lipome sous-séreux, II, 357.

Epispadias, II, 588; traitement, II, 590.

Epistaxis, I, 333.

Epulis, I, 423; malin, I, 425; intra-ossuse enkystée, I, 427.

Erections douloureuses dans la blennorrhagie, II, 614; traitement, II, 616; persistantes, II, 789; incomplètes, II, 790; dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 809.

Ergotine en injections dans le prolapsus du rectum, II, 553; dans l'hypertrophie de la prostate, II, 787.

Erysipèle à la suite des plaies du cuir chevelu, I, 11; de la face, I, 238; à la suite des opérations pratiquées sur la face, I, 292; de la langue, I, 523; du scrotum, II, 732; de la main, III, 280.

Erythème du scrotum, II, 733.

Espaces du tissu conjonctif du cou, I, 632; de la région du bassin, III, 332.
— sous-arachnoïdiens, I, 71.

Essence de térébenthine, son emploi dans l'érysipèle, I, 12.

Estomac, rupture, II, 138; plaies, II, 149; traitement, II, 158.
— fistule, II, 150; établissement

d'une fistule (gastrostomie) dans les cas de rétrécissement de l'œsophage, I, 730; II, 281; occlusion, II, 286.
— corps étrangers, substances toxiques, II, 278.
— carcinome, II, 286.
— extirpation partielle, II, 287.
— tiraillements dus à des hernies irréductibles, II, 357; à des hernies ombilicales, II, 467.
— sa présence dans les hernies diaphragmatiques, II, 469.

Etranglement interne, II, 304; symptômes, II, 309; traitement, II, 345; de l'intestin dans les hernies, II, 365; phénomènes anatomopathologiques et cliniques, II, 365; des hernies diverticulaires et pariétales, II, 370; causes et variétés d'étranglement, II, 374; symptômes cliniques, II, 375; diagnostic avec l'inflammation du sac herniaire, II, 378; étranglement élastique, II, 382; par engouement, II, 383; théorie et expériences, II, 384.
— traitement, II, 392; taxis, II, 394; ponction aspiratrice, II, 399; herniotomie, II, 400.
— persistance à la suite du taxis ou de la herniotomie, II, 426.
— des hernies diaphragmatiques, II, 470.
— de l'intestin en prolapsus, II, 478; du rectum en prolapsus, II, 550.
— (phénomènes d') à la suite de l'ovariotomie, II, 238; dans l'invagination, II, 298.
— des reins mobiles, II, 254.
— de l'ovaire dans les hernies, II, 370.

Eversion du rectum par le vagin, II, 487.

Excoision cunéiforme de parties de l'intestin, II, 413.
— de parties de la paroi des kystes de l'ovaire (BLANDELL), II, 222; des chancres, II, 723; des varices de la jambe, III, 687.

Excoriations du mamelon, II, 79.
— produites par le port de bandages herniaires, II, 354.

Excroissances papillaires, dans les kystes de l'ovaire, II, 212.

Exercices gymnastiques dans la scoliose, II, 887.

Exophtalmie pulsatile, I, 165; dans les ostéomes de l'orbite, I, 190; à la suite d'épanchements sanguins, I, 45, 223.

Exostoses du crâne, I, 189; du re-

F

bord alvéolaire, I, 424; de la paroi thoracique, II, 53; de la clavicule, III, 77; des épiphyses de l'humérus, III, 103; du fémur, III, 522; des os de la jambe, III, 696; sous-unguëale du gros orteil, III, 831.

Exploration digitale du pharynx, I, 713; de la cavité naso-pharyngienne, I, 320; du rectum, II, 485.

Extrophie de la vessie, II, 595.

Exsudats, dans la cavité pleurale, II, 39; traitement, II, 57; par thoracocentèse, II, 57, 66; par incision, II, 68; dans le péricarde, traitement, II, 74.

Extension à l'aide de poids, avec traction sur la tête dans la carie des vertèbres, II, 912; dans la coxite, III, 439; dans les contractions et attitudes vicieuses de la hanche, III, 459; dans les contractions et attitudes vicieuses du genou, III, 621; dans les fractures de la cuisse, III, 486, 493.

Extirpation du maxillaire inférieur, I, 455; de la langue, I, 545; de la parotide, I, 370; des tumeurs du cou, I, 675; des goitres, I, 702; intralaryngée des tumeurs du larynx, I, 769; du larynx, I, 787; des tumeurs du sein, II, 117; des glandes lymphatiques de l'aisselle, II, 119; des hydronéphroses, II, 248; du rein, II, 255; de la rate, II, 260; de parties de l'estomac, II, 286; du sac herniaire dans l'opération radicale des hernies, II, 361; du rectum, II, 567; du rein dans la néphrolithiase, II, 707; du testicule, II, 762; de la poche du spina bifida, II, 802; du coccyx, II, 938; de l'omoplate, III, 79; de la bourse séreuse prépatellaire, III, 654; de l'astragale, III, 746; du calcaneum, III, 752.

Extraction des dents, I, 469.

Extrémité supérieure, voir bras, avant-bras.
— inférieure, troubles de la motilité dans les fractures du bassin, 316; allongement apparent, III, 352; réel, 370; raccourcissement apparent, III, 352, réel, III, 354; troubles d'accroissement dans la coxite, 421; à la suite de la résection de la hanche, III, 475; à la suite de la résection du genou, III, 617; à la suite de l'ostéomyélite du tibia, III, 689; dans la paralysie spinale infantile, III, 773.

Face, blessures des parties molles, I, 211; lésions traumatiques des os, I, 219; maladies inflammatoires, érysipèle, I, 238; lupus, I, 242; furoncles, I, 239; syphilis, I, 246; néoplasmes, I, 247; carcinome, alveus rodens, I, 249; papillome inflammatoire de la peau, fibrome, lipome, I, 253; sarcome, myxome, cylindrome, etc., I, 254; névralgie, I, 256; opérations plastiques, I, 275; vices de conformation, I, 297, 360; fistules, pertes de substance, I, 277; asymétrie, dans le torticolis, I, 588.

Facial (nerf), paralysie, dans les fractures du crâne, I, 48; dans les blessures de la face, I, 214; section dans la névralgie faciale, I, 260; élévation dans la convulsion mimique de la face, I, 275.

Fascia cribrosa, II, 448; transversalis, II, 437.

Fausses membranes croupales, I, 773.

Fausses routes, dans l'urètre, II, 607; dans la prostate, II, 769, 785.

Fémur, métastases carcinomateuses dans le cancer du sein, II, 107; luxations, III, 356 (voir hanche); fractures du col, III, 382; fractures de la diaphyse, III, 480; traitement, III, 484; consolidation vicieuse, III, 494; fractures des condyles, III, 555; décollement traumatique des épiphyses, III, 557; fractures compliquées, par armes à feu, III, 489.
— pseudarthrose, III, 497; consolidation tardive, III, 497.
— ostéomyélite aiguë spontanée, III, 512; nécrose, III, 515; traitement, III, 516.
— ostéosarcome, sarcome myéloïde, exostose cartilagineuse, III, 522.
— résection cunéiforme, III, 497, 623, 639.

Fentes viscérales ou branchiales, I, 584.

Fer rouge, son emploi dans l'ovariotomie, II, 234; dans les fistules stercorales, II, 482; dans le prolapsus du rectum, II, 552.

Fermentation alcaline de l'urine, II, 677.

Fesse (région de la), kystes, échinocoques, hygroma, athérome, lipome,