

sarcome, III, 342; myxolipome, III, 520.

Feutre plastique, préparation, II, 923.

Fibro-adenome de la glande mammaire, II, 100.

Fibrome du cuir chevelu, I, 172; de la face, I, 253; du nez, I, 296; de la cavité naso-pharyngienne, I, 338; du sinus maxillaire, I, 422; du maxillaire inférieur, I, 444; du palais, I, 487; des amygdales, I, 518; de la langue, I, 542; de la parotide, I, 563; du cou, I, 664; rétropharyngien, I, 726; du larynx, I, 766; de la paroi thoracique, II, 50; du sein, II, 95; de la paroi abdominale, II, 197; de l'anus, II, 534; du rectum, II, 556; du scrotum, II, 733; des enveloppes du testicule, II, 748; du testicule, II, 760; du pénis, II, 724; de la vessie, II, 687; de l'aisselle, III, 77; de la main et des doigts, III, 297; de la cuisse, III, 520; du creux poplité, III, 666; du triceps sural, 695.

Fibromyome de l'utérus, II, 239.

Fibrosarcome du palais, I, 487; de la parotide, I, 563; rétropharyngien, I, 726.

Filaire du sang de l'homme, cause de calculs vésicaux, II, 647.

Fissures du crâne, I, 17, 40, 42; oblique de la face, I, 367; transversale, I, 367; du palais, I, 365; des lèvres, I, 362; du sternum, II, 1; du mamelon, II, 80; de l'anus, II, 512; de l'urètre, II, 586; syphilitiques des orteils, III, 843.

Fistules du sinus frontal, I, 359; de la joue, I, 214; de la lèvre inférieure, I, 388; de la face, I, 278; des glandes salivaires, I, 214, 534; de l'oreille, I, 574; congénitales du cou, I, 583; du tube laryngo-trachéal, I, 624; de l'œsophage, I, 628; provenant de vestiges des fentes branchiales, I, 583; de la langue, I, 523.

— de la cavité thoracique, II, 39, 72; de la glande mammaire, II, 83, 86.

— de l'intestin, II, 149, 187, 471; de l'estomac, II, 150; de la vésicule biliaire, II, 159; vésico-intestinales, II, 187; de la région ombilicale à la suite de la perforation d'abcès, etc., II, 173; du rectum, II, 519; tuberculeuses, II, 522; opération, II, 523; dans le carcinome du rectum, II, 561; congénitales de l'urètre, II, 587; acquises de l'urètre, II,

638; traitement, II, 640; de la vessie, II, 684; du scrotum, II, 733; à la suite d'épididymite, II, 756; dans la tuberculose du testicule, II, 758.

— dans le spina-bifida, II, 800; dans les cas de suppuration de l'articulation du coude, III, 150; dans la coxite, III, 414; traitement, III, 449; dans l'ostéomyélite du fémur, III, 515.

Fistules labiées de la face, I, 278; de la trachée, I, 624; de l'intestin, II, 149, 473; traitement, II, 482; de l'urètre, II, 641.

— *stercorales*, II, 471; symptômes et diagnostic, II, 476; cure radicale, 478; établissement dans les cas d'occlusion intestinale, II, 321; dans les hernies étranglées, II, 412.

Fixation de l'intestin au-devant de l'orifice herniaire, dans la hernie étranglée avec gangrène, II, 415.

Foie, rupture, II, 131; prolapsus, II, 147; lésions traumatiques, II, 159; abcès, II, 160, 481; échinocoque, II, 205; hypertrophie compensatrice, II, 206; sa présence dans les hernies du cordon ombilical, II, 461; métastases dans le carcinome du rectum, II, 557, 560.

Follicules dentaires, développement, I, 475.

Folliculaire (angine), I, 508.

Fongus de la dure-mère, I, 194; bénin du testicule, II, 756.

Fongueuse (arthrite) des vertèbres, II, 898; de l'épaule, III, 71; du coude, III, 151; du poignet, III, 217; des doigts, III, 267; de la hanche, III, 397; du genou, III, 584; du cou-de-pied, III, 736.

— (synovite) des gaines tendineuses de la main, III, 269, 297.

Fosse ovale, II, 448.

Foyers osseux, tuberculeux dans la coxite, III, 400; dans l'arthrite fongueuse du genou, III, 589; dans les os du tarse, III, 737; dans les métatarsiens, III, 835.

Fractures du crâne, I, 17; avec dépression, I, 19, 56, 87; de la base, I, 27; indirectes ou par contrecoup, I, 30, 43; diagnostic, I, 39, 41; de l'orbite, I, 44; avec plaie des parties molles, I, 53; avec déplacement des fragments, I, 55; chez les nouveau-nés, I, 148.

— des os de la face, I, 219; du maxillaire supérieur, I, 219; de l'os maxillaire, I, 223; du maxillaire infé-

rieur, I, 229; du squelette du nez, I, 224.

— des dents, I, 461.

— de l'oreille externe, I, 375.

— de l'os hyoïde, I, 592.

— du larynx, I, 593; de la trachée, I, 595.

— des côtes, II, 10; du sternum, II, 15.

— du pénis, II, 718.

— de la colonne vertébrale, II, 804; symptômes, II, 809; des deux vertèbres cervicales supérieures, II, 811; de l'apophyse odontoïde, II, 813; de la 3^e cervicale à la 2^e dorsale, II, 814; des vertèbres dorsales inférieures, II, 816; des vertèbres lombaires, II, 817; marche, II, 818; traitement, II, 824.

— de la clavicule, III, 1; traitement, III, 6.

— de l'omoplate, III, 19; du col de cet os, III, 21.

— de l'extrémité articulaire supérieure de l'humérus, III, 23; des tubérosités de l'humérus, III, 33; de la diaphyse, III, 92; traitement, III, 95; de l'extrémité inférieure de l'humérus, III, 105; au-dessus des condyles, III, 107; épicondyliennes, des deux condyles à la fois, II, 408; de la portion trochléenne, III, 109; disjonction épiphysaire, III, 109; traitement, III, 113.

Fractures des extrémités articulaires supérieures des os de l'avant-bras, III, 114; de l'olécrâne, III, 114; de l'apophyse coronoïde, III, 116; de la tête du radius, III, 118; compliquées du coude, III, 145; des deux os de l'avant-bras, III, 175; isolées de la diaphyse cubitale, III, 180; isolées de la diaphyse du radius, III, 181; de la région épiphysaire du radius, III, 181; symptômes, III, 184; traitement, III, 187; compliquées de l'avant-bras, III, 191.

— des métacarpiens, des phalanges, III, 251.

— de la ceinture osseuse du bassin, III, 307; de l'os iliaque, du sacrum, de l'ischion, III, 310; symptômes, III, 313; traitement, III, 317.

— du col du fémur, III, 382; extra-capsulaires, III, 384; intracapsulaires, III, 387; traitement, III, 391; du grand trochanter, des parois de la cavité cotyloïde, III, 394; fractures par armes à feu, III, 394.

— de la diaphyse du fémur, III, 480;

traitement, III, 484; compliquées, III, 489; traitement, III, 492; vicieusement consolidées, III, 494; pseudarthrose, III, 497.

— de la rotule, III, 548; traitement, III, 551.

— du genou, III, 555.

— de la jambe, III, 667; traitement, III, 670; compliquées, III, 668; isolées du tibia et du péroné, III, 676; provoquées dans les cas d'incurvation rachitique de la jambe, III, 692.

— de l'articulation tibio-tarsienne, des malléoles, III, 715; longitudinales, sus-malléolaires du tibia, III, 718; traitement, III, 720.

— du tarse, III, 721; compliquées, III, 723.

— du métatarse et des orteils, III, 833.

Fractures par arrachement, typiques du radius, III, 181; par chute sur le dos de la main, III, 189.

— de la phalange unguéale des doigts, III, 251.

— du col du fémur, III, 383; de la rotule, III, 548; de l'extrémité supérieure du péroné, III, 677.

— des malléoles, 715; de l'extrémité postérieure du calcaneum, III, 722.

Frein de la langue, brièvement anormal, I, 519.

Frémissement hydatique dans les kystes à échinocoques, II, 206.

Frisson, à la suite du cathétérisme, II, 604; à la suite de la lithotritie, II, 663.

Frottement des fragments, dans les cas de retard de consolidation des fractures, III, 498.

Funiculite aiguë, II, 755.

Furoncles des narines, I, 328; de la face, I, 239; du conduit auditif externe, I, 576; du dos, II, 48; de l'anus, II, 512; de l'aisselle, III, 74; de la main et des doigts, III, 278.

G

Gaines tendineuses du poignet, hygroma, II, 204; tuberculose, III, 205.

— de la main et des doigts, synéchies, à la suite de l'immobilisation prolongée, ténosynovite fongueuse, III, 269, 297; blennorrhagie, inflammation suppurée, III, 269; hydropisie,

- III, 270; hygroma, III, 297; tumeurs, III, 297.
- Gaine vasculaire** du cou, sarcome, I, 663.
- Galactocèle**, II, 100; (de VIDAL), II, 741.
- Galvanocaustique**, dans les opérations de fistules anales, II, 523; dans l'amputation du pénis, II, 726.
- (anse), I, 345, 348.
- appliqué à la trachéotomie, I, 836.
- Galvanocautère** de MIDDELDORPF, pour les rétrécissements de l'urètre, II, 630.
- Ganglions lymphatiques** du cou, hyperplasie, I, 655; tuberculose, I, 657; de l'aisselle, engorgement dans le carcinome du sein, II, 405, 419; bronchiques, lymphome malin, I, 664; de l'aîne, III, 511, 521.
- Ganglions** de la main, III, 207; du pied, III, 830; du genou, III, 653. (Voir **kystes synoviaux**).
- Gangrène** du scrotum, II, 732; foudroyante à la suite des blessures du pied, III, 724; sénile du pied, III, 840; du pied chez les diabétiques, par congélation, III, 841. (Voir **Nécrose**).
- Gargouillement** dans la réduction, des hernies, II, 395.
- Gastro-entérostomie** (WOELFLER) II, 291.
- Gastrostomie**, II, 284.
- Gastrotomie**, II, 280.
- Genou** (articulation du), anatomie et mécanisme, III, 530; bourses séreuses, III, 530; maladies de ces dernières, III, 649.
- luxations, III, 535; dans l'arthrite fongueuse, III, 593.
- fractures, III, 548, 555; entorse, III, 538.
- hémarthrose, III, 538; dans les fractures du fémur, III, 482.
- arthrite aiguë, III, 561; séreuse, III, 564; étiologie, III, 567; avec grains riziformes, III, 562, 565, 579; croupale (fibrineuse), III, 562; suppurée, II, 563, 566; septique, III, 563, 569, 577; symptômes, III, 563; étiologie, III, 567; arthrite blennorrhagique, III, 569, 577.
- inflammations chez le nouveau-né, III, 570.
- blessures, III, 570; par armes à feu, III, 572; traitement, III, 580.
- traitement des arthrites aiguës, III, 574; compression, III, 574; ponction, III, 576; injections, III, 576; incision, drainage, III, 577.
- tuberculose (arthrite fongueuse, tumeur blanche), III, 584; tumeur, tuberculeuses, III, 584; diagnostics III, 598; pronostic, III, 600; traitement, III, 602; incision, résection partielle, drainage, III, 607.
- contractures et ankyloses, III, 618; subluxation, III, 593; traitement, III, 620; attitudes vicieuses, d'origine paralytique, III, 778.
- arthrite déformante, III, 644; corps étrangers intra-articulaires, III, 644.
- résection, III, 635; cunéiforme dans l'ankylose, III, 623; indications dans l'arthrite fongueuse, III, 645; résultats, III, 615.
- amputations, désarticulations, III, 663.
- (douleur du) dans la coxite, III, 405.
- Genu valgum**, III, 624; symptômes, III, 625; traitement, III, 633; dans l'arthrite fongueuse, III, 594; à la suite de la luxation de la rotule, III, 546; opération d'Ogston, III, 639; ostéotomie, III, 641.
- varum, III, 643; dans l'arthrite fongueuse, III, 596.
- recurvatum, III, 779; dans l'arthrite fongueuse, III, 596.
- Gibbosité**, II, 871, 902.
- Gland**, adhérences avec le prépuce, II, 746; inflammation, II, 721; herpes, II, 723.
- Glandes**, sous-maxillaire, capsule, I, 632; inflammation, tumeurs, I, 573.
- *salivaires*, maladies, I, 553; fistules, I, 554.
- *sudoripares* (tumeurs des) de la face, I, 248.
- *thyroïdes accessoires*, I, 679; goitre, I, 684.
- *thyroïde*, I, 678; remarques anatomiques, I, 678; inflammation idiopathique, I, 681; tumeurs, anatomie pathologique, I, 683; sarcome, carcinome, I, 709.
- Glande mammaire**, anomalies congénitales, II, 79; glandes accessoires, II, 79, 100; inflammations, II, 81; excoriations, eczéma, II, 79; fistules, II, 83, 86; induration inflammatoire, II, 87; inflammation pendant la lactation, chez le nouveau-né, II, 87; abcès pyémiques, hématomas spontanés, abcès froids, II, 87; hypertrophie, II, 89; tumeurs, II, 90; anatomie, II, 90; mastite interstitielle, II, 91; kystes, II, 94, II, 96, 99; fibromes, II, 95, 97; sarcome,

- articulations des doigts, III, 266; des articulations des orteils, III, 839.
- Gouttière** de BONNET dans la coxite, III, 435.
- métallique de VOLKMANN pour la jambe, III, 672.
- Grains** riziformes dans l'hygroma des gaines tendineuses, III, 204; dans l'articulation du genou, III, 562; traitement, III, 579; dans la bourse séreuse prépatellaire, etc., III, 651; dans les hygromas du pied, III, 830.
- Graisse** (développement de) dans le tissu sous-séreux, son rôle dans la production et la guérison des hernies, II, 328, 341.
- Granulation** (tumeur de) du rebord alvéolaire, I, 423; au sommet de la racine des dents extraites, I, 465; dans la trachée à la suite de la trachéotomie, I, 832; dans le larynx, I, 768; à l'ombilic chez les nouveau-nés, II, 499.
- Granuleuse** (membrane) dans les abcès du cerveau, I, 134.
- Gravelle**, II, 702.
- Greffes** de REVERDIN, III, 682.
- Grenouillette**, I, 537.
- Griffe** (main en), III, 287, 291.
- Gros intestin**, évacuation de son contenu par l'estomac dans l'occlusion intestinale, II, 310; sa présence dans les sacs herniaires, II, 332; tumeurs, II, 292 (Voir **Intestins**).
- Gros orteil**, déviation en valgus, III, 836; exostoses sous-unguëales, III, 831; résection, III, 837; ongle incarné, III, 843; désarticulation, III, 849.
- Gueule de loup**, I, 362, 366.
- Gymnastique**, dans le traitement de la scoliose, II, 887.
- H
- Hanche** (articulation de la), anatomie et mécanisme, III, 343; mécanisme à l'état pathologique, III, 348.
- attitude vicieuse en flexion, III, 348; en abduction, III, 350; en rotation, III, 353; méthode d'examen, III, 354.
- luxations, III, 356; traumatiques, III, 356; en arrière, III, 357; en avant, III, 368; en haut, III, 374; en bas, III, 375; anciennes, III, 376; luxations congénitales, III, 376; déchirure de la capsule dans les luxations, III, 359;
- myxome, II, 95; cystosarcome prolifère, II, 96; (schéma des diverses formes de tumeurs), II, 97; fibroadénome, adénosarcome, adénome, II, 100; lipome, enchondrome, II, III; échinocoque, II, 99; carcinome, II, 101; développement et marche, II, 105; diagnostic et traitement des tumeurs, II, 110.
- mammaire rudimentaire chez l'homme, II, 112; carcinome, II, 112.
- extirpation partielle, II, 117; amputation, II, 118.
- névralgie, III, 123.
- Glandes** de COOPER, maladies, II, 700.
- Glande** de ROSENMULLER, II, 448; rétraction comme cause de hernies, II, 342; abcès, III, 512.
- Gliosarcome** de la cavité naso-pharyngienne, I, 342; du maxillaire supérieur, I, 426; de la glande mammaire, II, 95.
- Glossite**, I, 522; mercurielle, I, 522; à la suite des maladies infectieuses, I, 523; profonde (épidémique), I, 524.
- Glotte**, I, 763; blessures, œdème, I, 621, 784; spasme, paralysie, I, 790.
- Goitre** hypertrophique, hyperplasique, folliculaire, I, 683; des glandes thyroïdes accessoires, I, 684; folliculaire, fibreux, vasculaire, anévrismatique, I, 684; variqueux, amyloïde, gélatineux, kystique, multiloculaire, I, 686; osseux, I, 688; symptômes, I, 689; aigu, I, 695; congénital, rétrosternal, I, 707.
- diagnostic, I, 693; forme endémique, épidémique, étiologie, pronostic, I, 695.
- traitement, I, 696; extirpation, I, 702; énucléation intracapsulaire, I, 706.
- rétro-œsophagien, de Basedow, I, 707.
- Gommes** de la langue, I, 528; du sternum, II, 53; de l'intestin, II, 293; du péricrâne, I, 179; des vertèbres, II, 934; de la clavicule, III, 61; des doigts, III, 277; du tibia, III, 691; du triceps sural, III, 691.
- Gonococcus**, II, 612; III, 569.
- Gonorrhée**, II, 612; chronique, II, 617.
- Gorgeret**, II, 518; de BELMAS, II, 668.
- Goutte militaire**, II, 617.
- Goutteuse** (affection) de la bourse séreuse olécrânienne, III, 138; des