

- luxation spontanée dans la coxite, III, 417; à la suite de la fièvre typhoïde, etc., III, 420.
- fracture par armes à feu, III, 394; fractures de la cavité cotyloïde, III, 309, 394.
- perforation des abcès dans la cavité articulaire, III, 334, 431; flexion de la cuisse dans les abcès du psoas, III, 336.
- attitude moyenne pathologique (BONNET), III, 406.
- inflammations, III, 397; tuberculeuses (fongueuses), III, 397; anatomie pathologique, III, 398; symptômes, III, 403; formation d'abcès, II, 414; modifications de la température, III, 415; diagnostic, III, 421; marche, III, 425; étiologie, III, 428.
- inflammation aiguë dans le rhumatisme articulaire, l'ostéomyélite, III, 428; blennorrhagique, catarrhale, III, 428.
- traitement des inflammations, III, 433.
- arthrite déformante, III, 454.
- contracture et ankylose, III, 457.
- carcinome, sarcome, III, 424.
- névralgie, III, 424.
- carie sèche, III, 411, 454.
- résection, III, 450, 464; indications dans la coxite, III, 450; dans l'ankylose, III, 461; traitement consécutif, III, 473; résultats, III, 451, 474.
- désarticulation, III, 475.
- Hématangiome** de la langue, I, 532.
- Hématocèle** rétro et anté-utérine, II, 189; du cou, I, 651; des tuniques vaginales du testicule et du cordon, II, 736; chronique, II, 746; parenchymateuse du testicule, II, 749.
- Hémarthrose** du genou, III, 538; de l'articulation tibio-tarsienne, III, 723.
- Hématome** de l'oreille, I, 575; artériel à la suite de blessures des vaisseaux du cou, I, 598, 602; du sternum, II, 7; sous-séreux, II, 130; intra-péritonéal, II, 131; du scrotum, II, 731; des tuniques vaginales du testicule et du cordon, II, 736; du testicule, II, 749; de l'aisselle, III, 54; du bras, III, 101; de la bourse séreuse de l'olécrâne, III, 188; de l'avant-bras, III, 199; de la bourse séreuse trochantérienne, III, 422; des bourses séreuses du genou, III, 651; de la jambe, III, 700.
- Hématurie** dans les plaies de la vessie, II, 136; dans les lésions tra-

matiques du rein, II, 133; dans les tumeurs de la vessie, II, 688.

Hémopéricarde, II, 46.

Hémoptysie dans la thoracocentèse, II, 68; dans les blessures du poumon, II, 33.

Hémorragies dans les fractures de la base, I, 44; dans la cavité crânienne, I, 89; dans les opérations intéressant les amygdales, I, 513; dans les abcès du cou, I, 636; dans l'œsophage, I, 717; dans les voies respiratoires, I, 792; dans les blessures du poumon, II, 33; dans les kystes de l'ovaire, II, 216; spontanées dans la glande mammaire lors de la menstruation, II, 88; dans la cavité abdominale, II, 426, 431, 489; dans la paroi de l'intestin dans les cas d'étranglement de ce dernier, II, 366; dans la herniotomie, II, 422; dans les blessures du rectum, II, 506; dans la taille latéralisée, II, 669; dans la vessie, II, 691; dans l'hypertrophie de la prostate, II, 784; dans les fractures des vertèbres, II, 808; à la face palmaire de la main, III, 233; dans le domaine du bassin, III, 320; dans la désarticulation de la hanche, III, 477; dans l'articulation du genou, III, 482, 538.

Hémorroïdes, II, 537; fluentes, II, 540; traitement, II, 544.

— de la vessie, II, 778.

Hémorroïdaires (tumeurs), II, 537; variétés, II, 540; traitement, II, 542; prolapsus, II, 542; cautérisation, II, 544; ligature, II, 545.

Hémothorax, II, 19, 24; à la suite des fractures des côtes, II, 12.

Hémostase dans l'amputation du pénis, II, 726; dans la désarticulation de l'épaule, III, 89; dans la résection du coude, III, 167; dans la désarticulation de la hanche, III, 477; dans l'amputation de la cuisse, III, 528.

Hépatite suppurée, II, 181.

Hérédité des hernies, II, 339; des luxations congénitales de la hanche, III, 377.

Hernies du pharynx, I, 734; de LITRE, II, 370; du poumon, II, 2, 49;

— de l'abdomen, II, 325; leur contenu, II, 331; statistique et étiologie, II, 338; pathogénie, II, 341; symptômes, II, 344; marche, II, 345; opération ou cure radicale, II, 347; taxis, II, 351, 358; contention au

moyen de bandages, II, 351; à l'aide d'un suspensoir, II, 356.

— irréductibles, II, 356; dangers de l'irréductibilité, II, 357.

— opération radicale antiseptique, II, 359.

— étranglement, II, 365; traitement des hernies étranglées, II, 392; taxis, II, 394; ponction aspiratrice, II, 398; herniotomie, II, 399.

— réduction apparente, en masse, II, 426.

— avec double sac herniaire, II, 432.

— comme complication de l'hydrocèle, II, 742.

Hernie rétro-péritonéale, mésogastrique interne, sous-cœcale, rétro-cœcale, II, 302.

— cruro et inguino-propéritonéale, II, 432.

— inguinale, remarques anatomiques, II, 434; externe, II, 435; intersti-

tielle, II, 438; intra-péritonéale, II, 439; rapport avec le scrotum, II, 439; étranglement, contenu, II, 440; interne, directe, II, 440; dia-

gnostic, II, 442; chez la femme, II, 436, 444; opération, II, 444.

— crurale, II, 447; externe, II, 450; crurale pectinée ou rétro-vasculaire, II, 450; étranglement, II, 452.

— obturatrice, II, 455.

— ischiatique, II, 458.

— périnéale, sacro-rectale, ischio-rectale, rectale, vaginale, II, 458; lombaire, II, 459.

— ombilicale, II, 461; du cordon ombilical, II, 461; de la ligne blanche, II, 467.

— diaphragmatique, II, 304, 469.

Hernio-laparotomie dans les cas de hernie en bissac, II, 433.

Herniotomie, mortalité, II, 399; indications, II, 402.

— externe, II, 403; méthode sous-cutanée, II, 405; avec ouverture du sac, II, 405; traitement consécutif, II, 425.

— modifiée à la suite de la réduction en masse, II, 431.

— dans la hernie inguinale, II, 440; dans la hernie crurale, II, 452; dans la hernie obturatrice, II, 457.

Herpès, tonsillaire, I, 508; du pénis, II, 723.

Hétérocèle, II, 548.

Hoquet dans les blessures du foie, II, 132, 159; dans la péritonite septique, II, 166.

Humérus, fracture du col, III, 24; disjonction de l'épiphyse supérieure,

III, 28; traitement, III, 29; arrachement des tubérosités, III, 33.

— luxation, III, 34; préglénoïdienne, III, 37; symptômes, III, 40; luxatio-

erecta, III, 42; supra-coracoïdienne, III, 42; rétro-glénoïdienne, III, 43;

sous-acromiale, sous-épineuse, III, 43; luxation habituelle, III, 46;

obstacle à la réduction, III, 45; procédés de réduction, III, 48.

— troubles d'accroissement dans l'ostéomyélite III, 65.

— fractures de la diaphyse, III, 92; traitement, III, 95.

— pseudarthrose, III, 98.

— fractures de l'extrémité inférieure, III, 103; étiologie, III, 109; diagnostic, III, 111; traitement, III, 113.

— affection tuberculeuse en foyers, III, 66, 151.

— résection, III, 80, 97, 103.

— (tête de l'), luxation avec fracture, III, 31; son mode de fixation dans la cavité glénoïde, III, 35; ce qu'elle devient dans les cas de luxation non réduite, III, 47; carie, III, 66; luxation spontanée dans l'arthrite chronique, III, 69; résection, III, 80.

Hydarthrose de l'articulation temporo-maxillaire, I, 441; de l'épaule, III, 68; du coude, III, 149; de la hanche, III, 398.

— du genou, III, 561; étiologie, III, 567; séro-fibrineuse, III, 561; tuberculeuse, III, 568, 584; syphilitique, III, 568; intermittente, III, 568; traitement, III, 574.

— de l'articulation tibio-tarsienne, III, 736.

Hydatides des sinus frontaux, I, 358, de la vessie, II, 688.

Hydrocèle du cordon spermatique, diagnostic avec la hernie inguinale, II, 443; congénitale, II, 730; aiguë, II, 737.

— vaginale, II, 740; caractères du liquide, II, 740; communicante, II, 742; multiloculaire, diffuse, II, 742; herniaire, II, 742; complication avec les hernies, II, 742; transparence, II, 743.

— kystique ou du cordon spermatique, II, 747.

— ponction, II, 744; injections, incision, II, 745.

Hydrocéphale, I, 198; externe, I, 202.

Hydrencéphalocèle, I, 202.

Hydroméningocèle, I, 205.

Hydronephrose, II, 241; diagnostic,

II, 245; traitement, II, 248; nature du liquide, II, 276; dans les rétrécissements, II, 623; dans la néphrolithiase, II, 703; dans les cas de calculs de la vessie, II, 632.

Hydrorachis, II, 797.

Hygroma de la bourse séreuse du génio-glosse, I, 539; congénital, kystique du cou, I, 647; de la région thyro-hyoïdienne, I, 653; de la région coccygienne, II, 936; de la bourse sous-deltoidienne, III, 62; de la bourse séreuse de l'olécrâne, III, 158; des gaines tendineuses de la main, III, 204; des gaines tendineuses des doigts, III, 297; des bourses trochantérienne et iliaque, III, 422; kystique du genou, III, 651; prépatellaire et du creux poplité, III, 649, 654; au niveau de la tubérosité de l'ischion, III, 342; du pied, III, 830.

Hypercinésie de la vessie, II, 691.

Hyperesthésie de la vessie, II, 691; du testicule, II, 794; du plexus hypogastrique, III, 796; à la suite des fractures de la colonne vertébrale, II, 811; dans la carie des vertèbres, II, 904.

Hyperplasie des glandes du cou, I, 655; de nature scrofuleuse, tuberculeuse, I, 655; de la glande thyroïde, I, 683; du testicule, II, 728.

Hyperostose du crâne, I, 188; du rebord alvéolaire, I, 424; de la clavicule, III, 77.

Hypoplasie du testicule, II, 727.

Hypospadias, II, 586; traitement, II, 589.

Hypertrophie des os du crâne, I, 187; concentrique et excentrique des amygdales, I, 511; de la langue, I, 530; des papilles de la langue, I, 542; de la parotide, I, 566; de la musculature de l'œsophage, I, 719; des glandes mammaires, II, 89; compensatrice d'un rein, II, 434, 244; compensatrice du foie, II, 206; compensatrice de la musculature de l'intestin, II, 334; de l'épiploon dans les sacs herniaires, II, 335, 356; de la vessie, II, 622, 685; de la prostate, II, 775.

Ictère, à la suite des lésions traumatiques du foie, II, 132; dans les kystes à échinocoques, II, 207.

Ichthyose linguale, I, 527.

Iliaque (os), fractures, luxations, III,

307; périostite, ostéomyélite, III, 330; nécrose, III, 330; sarcome, III, 341.

— (fosse), abcès sous-séreux, II, 175; abcès profonds, II, 179.

Iléon, formation d'un nœud avec l's iliaque du côlon, II, 307; torsion suivant l'axe, II, 305; sa présence dans les hernies, II, 331.

Ileus, II, 301; dans les tumeurs de l'ovaire, II, 238.

Immersion de la main à la suite de blessures, III, 237.

Imperforation du prépuce, II, 711.

Implantation des dents extraites, I, 461.

Impuissance, II, 790; psychique, II, 790; paralytique, II, 790.

Incision des épanchements sanguins du crâne, I, 9; dans le céphalématome, I, 147.

— des kystes de la glande thyroïde, I, 701; de l'hydrocèle, II, 746; de la spermatocèle, II, 760; du phimosis, II, 712.

Incisions de détente dans la confection des lambeaux cutanés, I, 28, 236, 289; dans les opérations sur le palais, I, 496, 500.

Incision exploratrice pour le diagnostic des tumeurs abdominales, II, 276.

Incontinence d'urine, II, 693; dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 809, 816.

Indican, élimination par l'urine, variations dans les rétrécissements de l'intestin, II, 376.

Induration fibreuse de la langue, I, 525; de la parotide, I, 560; bénigne des glandes mammaires, II, 91.

Infarctus uratique, II, 702.

Infundibulum dans les fistules de l'intestin, II, 474.

Injections, d'acide phénique, d'iode, (voir plus loin), d'alcool dans les goîtres, I, 698; forcée d'eau et d'air dans les cas d'étranglement interne, II, 315; dans les hernies étranglées, II, 393; dans l'invagination, II, 300; d'alcool dans le voisinage des orifices herniaires, II, 350; d'ergotine, de strychnine dans les prolapsus du rectum, II, 533; de substances médicamenteuses dans la blennorrhagie, II, 615; de liquides colorés dans la vessie pour le diagnostic des fistules de l'urètre, II, 640; froides dans la vessie, II, 696; dans l'hydrocèle congénitale,

II, 731; dans l'hydrocèle acquise, II, 745; dans la spermatocèle, II, 760; dans la prostatite, II, 774.

— parenchymateuses dans la prostate, II, 786; parostales d'acide phénique dans la carie des vertèbres, II, 910; dans l'articulation du coude, III, 154; de perchlorure de fer dans les anévrysmes, III, 326; parenchymateuses d'acide phénique dans la coxite, III, 435; dans l'arthrite fongueuse du genou, III, 603.

— dans l'articulation du genou, III, 576.

Injection iodée, dans la pneumato-cèle du crâne, I, 163; dans les kystes athéromateux, I, 672; dans les goîtres, I, 697; dans les kystes de la glande thyroïde, I, 699; dans la cavité abdominale, II, 194; dans les kystes de l'ovaire, II, 220; dans les poches d'hydronephrose, II, 248; dans les sacs herniaires, II, 348; dans les hydrocèles, II, 745; dans la spermatocèle, II, 760; dans la prostate, II, 786; dans l'hydro-rachis, II, 801; dans l'articulation du coude, III, 154; dans l'articulation du genou, III, 576.

Inoculation avec le pus blennorrhagique (RICORD), II, 614.

Insolation, I, 239.

Instruments pour les corps étrangers de l'œsophage, I, 745; pour la laryngoscopie, I, 750; pour la trachéotomie, I, 80; pour l'ovariotomie, II, 225; pour la lithotritie, II, 657; pour la lithotomie, II, 665.

Interposition de parties molles dans les fractures du col de l'humérus, III, 27; des os sésamoïdes dans les luxations du pouce, III, 261.

Intestin, rupture par contusion, II, 138; plaies, II, 138, 147; hernies dans les plaies de l'abdomen, II, 146; traitement de la hernie, II, 150; traitement des plaies, II, 153.

— suture, II, 154; de JOBERT et LEMBERT, II, 155; de GELY, II, 156; invagination (RAMBDOHR-JOBERT), II, 158.

— occlusion intestinale, II, 286; corps étrangers, II, 278, 292; rétrécissement par les polypes, le sarcome, le carcinome, II, 292; gommes, tubercules, ulcérations, II, 293.

— invagination, II, 295.

— étranglement interne, II, 301; torsion, II, 305; formation d'un nœud, II, 307; traitement de ces affections, II, 314.

— sa présence en masse dans les sacs herniaires, II, 331; altérations de l'intestin hernié, II, 334; adhérence avec le sac herniaire, II, 334, 358.

— étranglement dans les hernies, II, 365; gangrène due à l'étranglement, II, 366; rétrécissement, siège de ce dernier, II, 373; occlusion, expériences, II, 383; diminution de résistance de l'intestin dans les hernies étranglées, II, 396; réduction et obstacle à cette dernière dans la herniotomie, II, 411.

— gangrené, traitement dans la herniotomie, II, 412.

— excision cunéiforme et suture, II, 416; fixation au devant de l'orifice herniaire, II, 420; perforation à la suite de la herniotomie, II, 424.

— fistules stercorales, II, 471.

— rétrécissement par défaut d'usage, II, 479.

— paralysie dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 810, 821.

Intestinale (fistule), II, 149, 187, 471; établissement dans l'étranglement interne, II, 321; fistule tubulée, guérison spontanée, II, 474; symptômes et diagnostic, II, 476; cure radicale, II, 478; fistule labiée, traitement, II, 482; occlusion par opération plastique (DIEFFENBACH), II, 483; résection, II, 484.

Intestinales (an-es), leur aspect dans les hernies étranglées, II, 366; gangrène par anémie (ROSER), II, 368; vides dans les hernies étranglées, II, 382; coudure, II, 386.

Intestinale (paroi) distension comme cause de gangrène, II, 369; formation de valvules comme cause d'étranglement, II, 386.

Intestin grêle, rupture par contusion, II, 138; plaies, II, 147; tumeurs, II, 292 (voir **Intestin**).

— longueur variable chez les différents peuples, II, 305; diverticules formant des nœuds, II, 310; sa présence dans les sacs herniaires, II, 332.

— fistules, II, 476.

Interstices du tissu conjonctif du cou, I, 632.

Invagination de l'intestin sectionné (RAMBDOHR-JOBERT), II, 158; de l'intestin, II, 295; simple, II, 296; double, II, 297; traitement, II, 299, 316.

— (procédé d') pour la guérison des hernies, II, 348.

Invaginateurs de WUTZER et ROTHMUND, II, 349.