

**Inversion** de la vessie, II, 595; du testicule, II, 728.  
**Iodisme**, I, 696.  
**Irréductibilité** des hernies, causes, II, 356; traitement, II, 359; comme symptôme d'étranglement, II, 375.  
**Irrigation** froide dans les congestions du cerveau, I, 85; continue à la suite de l'extirpation du rectum, II, 572; dans le phlegmon du bras, III, 239.  
**Ischion**, fractures, III, 310; ostéite tuberculeuse, III, 331.  
**Ischurie**, II, 598; paradoxale, II, 622, 779; inflammatoire, II, 678; subite dans l'hypertrophie de la prostate, II, 785.  
**Isthme** de la glande thyroïde, abaissement dans la trachéotomie, I, 818.  
**Ivoire** (chevilles d'), leur emploi dans les pseudarthroses, III, 499.

## J

**Jambe**, rotation en dehors dans l'arthrite fongueuse du genou, III, 594; subluxation dans cette même affection, III, 596.  
 — fractures, III, 667; traitement, III, 670; blessures par armes à feu, III, 670; traitement, III, 675.  
 — fractures compliquées, III, 669; traitement, III, 675.  
 — ulcères, III, 677; traitement, III, 680; éléphantiasis, III, 684; varices, III, 677.  
 — ostéomyélite, III, 688.  
 — abcès osseux, III, 690.  
 — pseudarthrose, III, 694.  
 — carcinome, fibrome, sarcome, III, 695; exostoses épiphysaires, III, 696; sarcome myéloïde, III, 696.  
 — rétraction cicatricielle de la peau, III, 783.  
 — troubles d'accroissement à la suite de l'ostéomyélite du tibia, III, 689; à la suite de la résection du genou, III, 617; incurvations rachitiques, III, 691.  
 — Anévrismes, hémorragies, III, 700.  
 — Amputation, III, 696.  
**Joues**, fistules, I, 214; plaies, I, 212; gangrène, I, 240 (voir **Face**).  
 — (muqueuse des), cicatrices, I, 407; carcinome, I, 406.

## K

**Kératite**, à la suite de l'extirpation de la parotide, I, 570.

**Kystes** du cerveau, à la suite de congestions, I, 114; du cuir chevelu, I, 172; provenant d'une méningocèle, I, 205.  
 — folliculaire des maxillaires, I, 475; périostaux, I, 475; congénitaux, I, 477; du palais, I, 486; de la langue, I, 536; de la région sous-linguale, I, 537; du foramen cœcum, I, 539; de la parotide, I, 566; du cou, I, 646; des fentes branchiales, kystes séreux, I, 649; multiloculaires du cou, I, 647; du larynx, I, 768.  
 — de la glande mammaire, II, 94, 96, 99; de la paroi abdominale (prépéritonéaux), II, 196.  
 — de la cavité abdominale, procédé opératoire, II, 202; de l'ovaire, II, 214; du parovaire, II, 214; du rein, II, 244; traitement, II, 248; rétropéritonéaux, II, 259; de la rate, II, 262; du ligament large, de la trompe, II, 276.  
 — dans le sac herniaire, après oblitération de ce dernier, II, 334; de l'épiploon dans le sac herniaire, II, 338.  
 — de la région anale, II, 554; du rectum, II, 555; de la vessie, II, 688; du scrotum, II, 733; du testicule et de l'épididyme, II, 739; entre la vessie et le rectum, II, 783.  
 — provenant d'abcès par congestion, II, 905.  
 — de la région sacrée, II, 936.  
 — du bassin, III, 340; de la région fessière, III, 342.  
 — de la cuisse, III, 520; du creux poplité, III, 654, 666; du pied, III, 830.  
 — synoviaux de la main, III, 207.  
**Kystes dermoïdes** du crâne, I, 172; du palais, I, 486; de la langue, I, 537; du cou, I, 651; sous-sternaux, II, 57; de l'ovaire, II, 214; du testicule et de l'épididyme, II, 739; entre la vessie et le rectum, II, 783, III, 340.

## L

**Lambeau** (confection du) dans la rhinoplastie, aux dépens du front, I, 302, 309; aux dépens des joues, I, 304; lambeau emprunté au bras, I, 305; dans l'uranoplastie suivant le procédé de LANGENBECK, I, 499.  
**Langage** (troubles du) dans l'hypertrophie de la langue, I, 534; dans les fissures du palais, I, 489; dans

l'hypertrophie des amygdales, I, 512.  
**Langue**, chute en arrière à la suite de la résection du maxillaire inférieur, I, 451; dans l'anesthésie par le chloroforme, I, 791.  
 — maladies, I, 519; pertes de substance et malformations, I, 519.  
 — blessures, I, 520; ulcérations dentaires, I, 521.  
 — processus inflammatoires, I, 522; glossite mercurielle, I, 522; ulcérations, I, 522, 523; diphthérie, charbon, I, 523; érysipèle, I, 523; abcès, phlegmon diffus, I, 524.  
 — fistules, induration fibreuse, I, 523; processus inflammatoires circonscrits, I, 525; muguet, ichthyosis, psoriasis, I, 527.  
 — syphilis, I, 528; tuberculose, I, 529; lupus, I, 530.  
 — hypertrophie, I, 530; lymphangiome, I, 531.  
 — tumeurs, I, 536; kystes muqueux cysticerques, kystes bronchiaux, échinocoque, I, 536; athérome, kystes dermoïdes, grenouillette, I, 537; anévrismes, angiomes, fibromes, enchondromes, lipomes, hypertrophie des papilles, carcinome, I, 541.  
 — opérations, I, 545; extirpation avec section du maxillaire sur la ligne médiane (SEDILLOT), I, 546; avec section latérale du maxillaire (LANGENBECK), I, 546; avec résection temporaire du maxillaire (BILLROTH), I, 546; par la région sus-hyoïdienne (CLOUET-REGNOLI, BILLROTH), I, 547, 551.  
**Laparotomie**, dans l'invagination, II, 300; pour le diagnostic des tumeurs abdominales, II, 276; dans l'étranglement interne, II, 318; à la suite d'une herniotomie insuffisante, II, 428; après la réduction en masse, II, 434; dans les hernies diaphragmatiques étranglées, II, 470; dans les fistules vésico-intestinales, II, 477.  
**Laryngite** croupale, I, 733; œdémateuse, I, 781; sous-muqueuse, I, 779.  
**Laryngofissure**, I, 803.  
**Laryngoscopie**, I, 749; instruments, I, 750; obstacles, I, 760.  
**Laryngotomie**, I, 769, 800; partielle, I, 771, 801.  
**Larynx**, fracture, I, 593; commotion, I, 594; plaies, I, 622.  
 — rétrécissement, I, 624.  
 — blessures par armes à feu, I, 623.

— maladies, I, 773.  
 — examen, I, 749; image laryngoscopique normale, I, 762; altérations pathologiques, I, 766.  
 — fibrome, polype fibreux, papillome, I, 766; carcinome, syphilis, tuberculose, I, 767, 783; tumeurs kystiques, I, 768; granulations, I, 768.  
 — inflammations aiguës, I, 773; diphthérie, I, 773; croup, I, 774; cataracte, I, 775; périchondrite, I, 784; inflammations chroniques, I, 785; sarcome, I, 787; corps étrangers, I, 791.  
 — artificiel, I, 789.  
 — laryngotomie, I, 800; dilatation, I, 786; extirpation, I, 787.  
 — granulome à la suite de la trachéotomie, I, 835.  
**Leontiasis** des mâchoires, I, 419, 445.  
**Leptothrix buccalis**, I, 509.  
**Lésions traumatiques**, voir les différents organes.  
**Lèvres**, maladies, I, 388; gerçures, I, 388; scrofuleuse, kystes muqueux, hypertrophie, I, 389; angiome, I, 380; carcinome, I, 391; fissures, I, 362.  
 — autoplastie suivant les procédés de DIEFFENBACH, IASCHE, BUROW, I, 393; suivant les procédés de WEBER, CELSE, BRUNS, LANGENBECK, I, 396; suivant le procédé de SEDILLOT, I, 397.  
**Lèvre double**, I, 389.  
**Lèvre inférieure**, fissure médiane, I, 387; fistule, I, 388; carcinome, I, 391.  
**Ligament** aryléno-épiglottique, érysipèle, I, 507; blessure, œdème, I, 621.  
 — ventriculaire, I, 763.  
 — rond, comme point de départ de kystes et de tumeurs, II, 196; large, kystes, II, 276; de Berlin, III, 346; rotulien, rupture, III, 547; croisé, rupture, III, 558; latéraux du genou, III, 532; section du ligament latéral externe, III, 637.  
**Ligature** des artères, voir **Artères**.  
 — des fibromes naso-pharyngiens, I, 347; du sac herniaire dans l'opération radicale des hernies, II, 360; des fistules rectales, II, 525; des tumeurs hémorroïdaires, II, 545; des prolapsus du rectum, II, 551; des polypes du rectum, II, 560; des poches d'hydrorachis, II, 802; dans la palmature des doigts, III, 247; des varices de la jambe (SCHEDE), III, 687.

**Ligne** ilio-ischiatique ou de ROSER-NELATON, III, 343.  
 — blanche, hernies, II, 467.  
**Lipome** de la face, I, 233; de la langue, I, 342; de la région parotidienne, I, 568; du cou, I, 664; du pharynx et de l'œsophage, I, 728; de la paroi thoracique, II, 50; rétro-mammaire, II, 50; du sein, II, 99; des parois abdominales, II, 498; sous-séreux, son rôle dans la production et la guérison des hernies, II, 328, 344; intra-péritonéal, pédiculé dans les sacs herniaires, II, 329; sous-séreux, diagnostic avec les hernies épiploïques, II, 357; du pénis, II, 724; du scrotum, II, 733; des enveloppes du testicule, II, 748; de la région sacrée, II, 936; de la région de l'épaule, III, 76; de l'aisselle, III, 76; du bras, III, 103; de la main et des doigts, III, 296; de la région fessière, III, 342; de la cuisse, 320.  
**Liquide cérébro-spinal**, son rôle physiologique, I, 71.  
 — écoulement dans les fractures ouvertes du crâne, I, 46; dans les blessures de la moelle, II, 865.  
**Liquide** des kystes à échinocoques, II, 275.  
 — des tumeurs abdominales, examen, II, 275.  
 — des kystes de l'ovaire, II, 275.  
**Lisfranc** (amputation de), III, 735.  
 — (articulation de), synovite tuberculeuse, III, 834.  
**Lit iase** vésicale, II, 646; rénale, II, 702.  
**Lithofacteur** ou **lithoclaste** (LUER, CHARRIÈRE), II, 667.  
**Litholapaxie**, II, 662.  
**Litholyse**, II, 654.  
**Lithophone** (MATHIEU), II, 653.  
**Lithoscope** (BROKE), II, 652.  
**Lithotritie**, II, 656; indications, II, 660; procédé opératoire, II, 661.  
**Lithotriteur** (CIVIALE, JACOBSON, DUPUYTREN, HEURTELOUP, etc.), II, 657.  
**Lithotome**, II, 663.  
**Lithotomie**, voir **Taille**.  
**Lits à extension**, pour le traitement de la scoliose, II, 893.  
**Litre** (hernie de), II, 370; expérience sur l'étranglement de cette hernie, II, 371.  
**Lombaires** (hernies), II, 459; vertèbres, II, 817, 862, 909.  
**Longuettes** (compresses), dans le

traitement des fractures de l'avant-bras, III, 178.  
**Lordose**, II, 871; III, 350, 413.  
**Loup**, II, 541.  
**Luette**, tuméfaction, I, 483; ulcérations syphilitiques et lupus, I, 480; allongement, I, 483; division, I, 488.  
**Lumière** de Drumond pour la laryngoscopie, I, 750.  
**Lupus** de la face, I, 242; phénomènes cliniques, I, 244; du nez, I, 296; de la cavité nasale, I, 328; du palais, I, 480; de la muqueuse du pharynx et des amygdales, I, 545; de la langue, I, 530; du pénis, II, 725; des doigts, III, 278.  
**Luxations** du maxillaire inférieur, I, 234; des dents, I, 460; des côtes, II, 15; du pénis, II, 719; du testicule, II, 749.  
 — des vertèbres, II, 830; unilatérales, II, 834; bilatérales, II, 835; mécanisme, II, 834; bilatérales en arrière, II, 837; latérales, II, 837; symptômes, II, 840; réduction, II, 842; de la tête, II, 846; de l'allas, II, 847; des 6 dernières cervicales, II, 852; II, symptômes, 856; réduction, II, 859; des vertèbres dorsales et lombaires, II, 861; du coccyx, II, 937.  
**Luxation de la clavicule**, III, 11; de l'extrémité sterrate, III, 11; incomplètes, III, 12; présternales, III, 13; rétrosternales, en haut, III, 13; de l'extrémité acromiale, III, 15; de l'omoplate, III, 15; de la clavicule sous l'acromion, III, 18; de la tête humérale fracturée, III, 31.  
 — de l'épaule, III, 34.  
 — *preglénoidiennes*, III, 37; sous-coracoïdiennes, III, 38; intracoranoïdiennes, sous claviculaires, coracoclaviculaire, III, 39; axillaires, III, 39; symptômes, III, 41; verticale, III, 42; sus-coracoïdienne, III, 42.  
 — *rétroglénoidiennes*, III, 43; sous acromiales, sous épineuses, III, 43; pronostic, III, 44; habituelles de l'épaule, III, 46; manœuvres de réduction, III, 48; luxation spontanée dans l'arthrite chronique de l'épaule, III, 69.  
 — du tendon du biceps, III, 98.  
 — de l'avant-bras, en arrière, III, 121; réduction, III, 125; latérale incomplète, III, 127; réduction, III, 129; en dedans, III, 129; en avant, III, 130; divergente, du radius en avant, du cubitus en arrière, III,

132; isolée du cubitus, III, 133; isolée du radius, III, 134; en arrière, III, 136; en dehors, III, 138; incomplète, III, 139; congénitale, III, 140; pathologique du coude, III, 140; compliquée, III, 145.  
 — de l'articulation radio-cubitale inférieure, III, 212.  
 — de la main, III, 213; du carpe, III, 233; du métacarpe, III, 233; des articulations phalangiennes, III, 254; du pouce, dorsale, III, 256; en avant, III, 263.  
 — de la ceinture pelvienne, III, 307; de l'os iliaque, du sacrum, etc., III, 311.  
 — de l'articulation de la hanche, traumatiques, III, 356; *retrocotyloïdiennes*, iliaques, III, 362; ischiatiques, III, 362; réduction, III, 365; obturatrices, III, 368; périméales, III, 370; réduction, III, 370; *precoyloïdiennes*, ilio-pubiennes, iliopectinées, III, 371; réduction, III, 373; *supra-cotyloïdiennes*, III, 374; *infra-cotyloïdiennes*, III, 375; *anciennes*, III, 376; *congénitales*, III, 376; *spontanées*, dans la coxite, III, 417; dans la fièvre typhoïde, etc., III, 420.  
 — du genou, III, 535; des ménisques, III, 537; congénitales du tibia, III, 539; isolée du péroné, III, 539.  
 — de la rotule, III, 539; congénitales, III, 546; pathologiques, III, 546.  
 — du pied, au niveau de l'articulation tibio-tarsienne, III, 707; sous-astragaliennne, III, 711; complète de l'astragale, III, 713; des os de la rangée antérieure du tarse, III, 715.  
 — des tendons péroniers, III, 728; du tendon du jambier postérieur, III, 729.  
 — des articulations métatarsiennes, III, 831.  
 — des orteils, III, 833.  
**Lymphadénite** blennorragique de l'aîne, II, 614; de l'aisselle, III, 74.  
**Lymphangiectasie** congénitale du cou, I, 648.  
**Lymphangiome** kystique de la langue, I, 530; du cou, I, 647; de la paroi thoracique, II, 50; kystique de la glande coccygienne, II, 936; de l'aisselle, III, 76; de la cuisse, III, 521.  
**Lymphangite** blennorragique du pénis, II, 722; du bras dans les panneris, III, 282.  
**Lymphatiques** (ganglions) voir **Ganglions**.

— (kystes) au niveau du collet du sac herniaire, II, 334.  
 — (varices) de la cuisse, III, 521.  
**Lymphome** de la région parotidienne, I, 567; hyperplasique du cou, I, 655; leucémique, I, 659; malin, I, 660; de l'aisselle, III, 76.  
**Lymphorrhée** de la cuisse, III, 521; de la jambe, III, 685.  
**Lymphosarcome** des glandes de la région parotidienne, I, 568; du cou, I, 662; de l'aisselle, III, 76.

## M

**Macrochilie**, I, 388.  
**Macroglossie**, I, 530; acquise, I, 534.  
**Macrostomie**, I, 368.  
**Macrotie**, I, 574.  
**Main**, attit de dans la paralysie du radial, III, 100; troubles trophiques à la suite des blessures de nerfs, III, 196.  
 — hygroma des gaines tendineuses, III, 204.  
 — tuberculose, III, 205; ganglions, III, 207.  
 — luxation, III, 212; subluxation, III, 220.  
 — désarticulation, III, 221.  
 — troubles congénitaux de développement, III, 229; main bote, III, 229.  
 — blessures, III, 234; plaies de l'arcade palmaire, III, 233; traitement, III, 234; brûlure, rétraction cicatricielle, III, 239.  
 — rétraction de l'aponévrose palmaire, III, 243; opération, III, 245.  
 — fractures et luxations des métacarpiens et des phalanges, III, 251.  
 — ténosynovites, III, 268.  
 — ostéomyélite et périostite, III, 274; (spina ventosa), tuberculose des os, III, 275.  
 — inflammations infectieuses par le virus cadavérique, III, 279; piqûres d'insectes, charbon, III, 279; abcès, furoncles, III, 280; panaris, III, 281; traitement, III, 283.  
 — verrue, éléphantiasis, angiomes, carcinomes, lipomes, III, 295.  
 — tumeurs des gaines tendineuses, tumeurs diverses, II, 297.  
 — opérations, III, 300.  
**Magnésite** et silicate de potasse (mélange de) pour la confection d'appareils, III, 798.  
**Mal perforant** du pied, III, 846.  
 — de Fott, II, 898.