

- 492, 532; inflammatoires, II, 533; calleux, cicatriciels, II, 533; traitement, II, 535.
- hémorroïdes, II, 537; traitement, II, 541.
- prolapsus, II, 546; inflammatoire, II, 527; traitement, II, 549.
- rupture dans les fractures du bassin, III, 316.
- néoplasmes, II, 554; kystes, II, 555; échinocoques, sarcomes, fibromes, myomes, adénomes, II, 556; carcinomes, II, 557, 560; extirpation, II, 567; polypes, II, 555, 558.
- extirpation, II, 560.
- Redressement** dans les attitudes vicieuses de la hanche, III, 436, 439; du genou, III, 609, 621; dans le genu valgum, III, 634, 637; dans l'incurvation rachitique de la jambe, III, 692; dans le pied-bot varus, III, 794; dans le pied plat, III, 828; dans la déviation du gros orteil, III, 837.
- Réduction** de l'intestin dans les hernies traumatiques, II, 452; de l'intestin dans l'invagination, II, 299.
- des hernies, II, 351; tentatives de réduction dans les hernies irréductibles, II, 358; dans les hernies étranglées, II, 394; dans la herniotomie, II, 444; en masse, II, 426.
- du prolapsus du rectum, II, 550.
- des luxations de la colonne vertébrale, II, 842.
- des luxations de l'épaule, III, 48; méthodes de réduction, III, 51; obstacles qui s'y opposent, III, 45; réduction sanglante, III, 53.
- des luxations du coude, III, 126, 129; de la luxation dorsale du pouce, III, 258; des luxations de la hanche, III, 365.
- Régénération** des nerfs sectionnés, I, 261.
- Rein**, plaies, II, 432; affection sympathique, II, 134, 244; contusion, II, 432; hypertrophie consécutive, II, 134, 244; prolapsus, II, 147.
- tumeurs, II, 239; sarcome, carcinome, II, 239; kystes, II, 240; traitement, II, 248; échinocoque, II, 250.
- déplacement, rein flottant, II, 252.
- corps étrangers, calculs, II, 701; inflammation, II, 707.
- extirpation, II, 707; dans les cas d'hémorragie, d'abcès, II, 434; de rein flottant, II, 254.
- en forme de fer à cheval, II, 252.
- Replis** de Douglas, II, 563.
- Résections** de la voûte crânienne, I, 153.
- des nerfs, voir les différents nerfs et Neurectomie.
- de l'arcade zygomatique pour l'excision de la deuxième branche du trijumeau, I, 268.
- du palais pour l'extirpation des tumeurs naso-pharyngiennes, I, 350; ostéoplastique de la branche montante du maxillaire supérieur (LANGENBECK), I, 351; des os du nez (LINHART, OLLIER, BRUNS), I, 351; du maxillaire inférieur dans la constriction cicatricielle des mâchoires, I, 410; des maxillaires dans la périostite phosphorée, I, 418.
- du maxillaire supérieur, totales, I, 430, 434; partielles, I, 437; temporaires, I, 268, 352; de l'articulation temporo-maxillaire, I, 443.
- du maxillaire inférieur, I, 450; d'après le procédé de RHEA BARTON, I, 454; temporaires, I, 318, 516.
- de l'œsophage, I, 732.
- des côtes, II, 52, 72, 73.
- de la portion pylorique de l'estomac, II, 286; de parties de l'intestin dans les cas de rétrécissements et de tumeurs, II, 294; — dans les hernies étranglées, II, 443.
- Résections** du coccyx dans la proctotomie, II, 498; dans l'extirpation du rectum, II, 569.
- de la clavicule, III, 61, 77; de l'omoplate, III, 78.
- de la tête de l'humérus, III, 81; par l'incision postérieure partant de l'aisselle, etc., III, 87; dans les cas de fracture avec luxation, III, 33; dans les cas de luxation irréductible, III, 53; résultats, III, 82; de la diaphyse humérale, III, 103.
- *partielles du coude* dans les affections tuberculeuses des os, etc., III, 164, 168.
- *du coude*, indications, III, 159; résultats, III, 161; méthodes, III, 165; temporaires de l'olécrâne, III, 168; avec incision longitudinale du côté radial (HUETER), III, 170; traitement consécutif, III, 171.
- des os de l'avant-bras, III, 202.
- *de l'articulation du poignet*, III, 221; résultats, III, 221; méthodes, III, 224.
- pratiquées sur la main et les doigts, III, 305.

- *de la hanche*, III, 464; avec incision antérieure transversale, III, 471; indications dans la coxite, III, 433; dans l'ankylose, III, 463; résultats, III, 474; du grand trochanter, III, 469.
- *du genou*, III, 655; partielles, III, 660; cunéiformes, III, 623; indications, III, 615, 623; résultats, III, 615; du tibia, III, 694.
- *de l'articulation tibio-tarsienne*, III, 744; dans les blessures par armes à feu, dans l'arthrite fongueuse, III, 727, 742; mortalité, III, 727; résultats, III, 748.
- *des os du tarse*, III, 751; à la suite des blessures par armes à feu, III, 728; dans la carie du tarse, III, 743; cunéiformes dans le pied-bot varus, III, 808; du métatarse, III, 835, 850; de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, III, 837.
- Réséction** des nerfs, voir **Neurectomie**.
- Respiratoire** (ligne) de l'abdomen, II, 177; III, 335.
- Respiratoires** (mouvements) des tumeurs de l'abdomen, II, 269.
- (troubles) dans les affections bulbaires, I, 113; dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 815; dans l'hypertrophie des amygdales, I, 512.
- Rétention** d'urine dans la péritonite, II, 167.
- du testicule, II, 728.
- Rétraction** cicatricielle de la région du coude, III, 140; de la main, III, 234; des doigts, III, 239, 268, 287; des tendons, III, 289; de la peau et des muscles, du mollet, III, 783; de la peau de la face antérieure de la jambe, III, 786.
- de l'aponévrose palmaire (DUPUY-TREN), III, 243.
- Retracteur** de la luette (VOLTO-LINI), I, 319.
- Rétrécissements** du pharynx et de l'œsophage, I, 719; calleux, cicatriciel, I, 719; par épaissement du cartilage cricoïde, I, 721; spasmodique, I, 722; par compression produite par le goître, I, 722; cancéreux, I, 730.
- de la trachée de cause syphilitique, I, 785.
- cicatriciels du pylore, II, 286; de l'intestin, II, 293, 314; progressif de l'intestin dans les hernies, II, 334; dans les fistules stercorales, II, 475.
- cicatriciels du rectum, II, 529, 533; inflammatoires de l'anus et du rectum, II, 533; congénitaux du rectum, II, 532; traitement, II, 535.
- de l'urètre, II, 619; organiques, II, 620; diagnostique et pronostic, II, 624; traitement, II, 626.
- Rhinite**, I, 321.
- Rhinoscopie** antérieure, I, 314; postérieure, I, 316.
- Rhinoplastie**, I, 299; méthode indienne, I, 299; méthodes italienne, allemande, I, 305.
- totale, I, 301; avec lambeau frontal, I, 302; méthode française avec lambeaux empruntés aux joues, I, 304; méthode de BUROW, I, 305; avec lambeau emprunté au bras, I, 305.
- partielle, I, 306.
- Rhumatisme** articulaire, voir les différentes articulations.
- Rotule** (adhérences de la), obstacles qu'elles apportent au redressement du genou, III, 620.
- luxations, III, 539; congénitales, III, 546.
- fractures, III, 548.
- suture, III, 553.
- (choc de la) dans l'hydarthrose, III, 564.
- blessures, III, 570.
- bourses séreuses, affections, III, 649.
- section transversale dans la résection du genou, III, 657.
- Ruban** frontal de LANGENBECK, I, 498.
- Rumination** dans les diverticules de l'œsophage, I, 736.
- Rupture** des sinus de la dure-mère, I, 34; de l'œsophage, I, 716; du poumon, II, 9; du cœur et des gros vaisseaux, II, 9; des muscles de l'abdomen, II, 130; du péritoine, II, 130; du foie, II, 131; de la rate, II, 132; de la vessie, II, 136; de l'intestin, II, 138; du muscle droit abdominal, II, 173; des kystes de l'ovaire, II, 222; des kystes du rein, II, 244.
- du sac herniaire avec réduction apparente de la hernie, II, 433; sous-cutanée du biceps, III, 99; de la vessie et de l'urètre dans les fractures du bassin, III, 312; du ligament rotulien, III, 547; du triceps crural, III, 548; du tendon d'Achille, III, 750; du plantaire grêle, III, 733.

## S

**Sable urinaire**, II, 702.  
**Sac herniaire**, II, 326; son absence dans les hernies coccale et vésicale, II, 326, 333; enveloppes accessoires, II, 326; altérations inflammatoires, poches accessoires, sac herniaire en forme de sablier, II, 327; oblitération, formation de kystes, II, 329; sac préformé dans les hernies inguinales, II, 328, 341; enveloppes externes, II, 330; contenu, II, 331; formation du sac herniaire, II, 341.  
 — moyens propres à déterminer l'oblitération du sac, II, 347; invagination, II, 348; formation d'adhérences, II, 356.  
 — traitement du sac dans l'opération radicale des hernies, II, 359.  
 — étranglement de l'intestin dans le sac herniaire, II, 364.  
 — inflammation, II, 378; traitement, II, 380; dénudation du sac dans la herniotomie externe, II, 403.  
 — ouverture dans la herniotomie, II, 405; adhérences cicatricielles avec les téguments, II, 406.  
 — double dans les hernies inguinales, II, 439.  
 — déchirures, II, 433.  
 — des hernies inguinales, II, 434; des hernies crurales, II, 447; de la hernie obturatrice, II, 455; des hernies diaphragmatiques, II, 469.  
**Sac synovial** du poignet, suppuration dans les lésions traumatiques des doigts, III, 274.  
**Sacro-coxalgie**, III, 330.  
**Sacrum**, tumeurs congénitales, II, 934; fractures, luxations, III, 310; sarcomes, extirpation, III, 341; hygroma, II, 936.  
**Saignée**, III, 141; dans la compression cérébrale, I, 85; accidents de la saignée, III, 143.  
**Salivation** à la suite des fractures du maxillaire inférieur, I, 231; dans la stomatite mercurielle, I, 405.  
**Sarcomes** de la face (WEBER), I, 254; folliculaire, I, 253; de la cavité nasale, I, 342; des téguments du crâne, I, 172; des os du crâne, I, 193; myélogène des os du crâne, I, 193; de la dure-mère, I, 194; de la cavité naso-pharyngienne, I, 342; du sinus maxillaire, I, 422; du rebord alvéolaire, I, 423; du corps du maxillaire supérieur, I, 426; du maxillaire inférieur, I, 446; des

dents, I, 478; des amygdales, I, 518; de la parotide, I, 562; des gaines vasculaires du cou, I, 663; de la glande thyroïde, I, 709; rétropharyngiens, I, 726; du larynx, I, 787.  
 — de la paroi thoracique, II, 55; de la glande mammaire, II, 95.  
 — de la paroi abdominale, II, 197; de l'ovaire, II, 212; du rein, II, 240; rétro-péritonéaux, II, 258; de l'épiploon, II, 263; du tube digestif, II, 292; du rectum, II, 555; de la vessie, II, 687; des tuniques vaginales du testicule, II, 748; du testicule et de l'épidyme, II, 764; de la prostate, II, 789; du coccyx, II, 935.  
 — de l'aisselle, III, 76; de la clavicule, III, 77; de l'humérus, III, 103; de la main et des doigts, III, 297.  
 — des os du bassin, III, 341; de la région de la fesse, III, 342; de la cuisse, III, 521; du creux poplité, III, 666; du gastrocnémien, III, 695; du tibia et du péroné, III, 696; du pied, III, 831.  
**Sarcome myéloïde** du rebord alvéolaire, I, 423; du maxillaire inférieur, I, 446; du sternum, II, 55; de la colonne vertébrale, II, 933; de la clavicule, III, 77; de l'humérus, III, 103; de la main, III, 297; du bassin, III, 341; du col du fémur et du trochanter, III, 424; du fémur, III, 522; du tibia, III, 696.  
**Satyriasis**, II, 789.  
**Scarification** des orifices herniaires, II, 348; dans la stase veineuse des lambeaux d'autoplastie (DIEFFENBACH), I, 293.  
**Scissure** de Sylvius, I, 101; centrale de Rolando, I, 102.  
**Schéma** des tumeurs du sein, II, 97.  
**Schistoprosopus**, I, 362.  
**Sclérose** des os et du crâne, I, 188.  
**Scolex** de l'échinocoque, II, 203.  
**Scoliose** à la suite du torticolis, I, 587; à la suite de pleurésie, II, 65; à la suite des opérations d'empyème, II, 885.  
 — physiologique, II, 870; habituelle, II, 877; étiologie, II, 877; symptômes, II, 881.  
 — totale, II, 884.  
 — statistique, II, 870, 886; III, 352; rachitique, II, 884.  
 — pronostic, II, 886; traitement, II, 887; au moyen d'appareils, II, 893.  
**Scrotum**, vices de conformation, II, 727; lésions traumatiques, II, 731;

inflammations, II, 732; gangrène, œdème, II, 732; fistules, corps étrangers, eczéma, syphilis, lipomes, fibromes, angiomes, kystes, athéromes, papillomes, éléphantiasis, carcinomes, II, 733; névralgie, II, 794.  
**Section** cunéiforme double dans l'hypertrophie de la langue (BOYER) I, 535.  
 — médiane dans la lithotomie, II, 670.  
 — cunéiforme du fémur, voir **Ostéotomie**.  
**Sein**, voir **Glandes mammaires**.  
**Septicémie** péritonéale, II, 166, 377.  
**Septum** crural (CLOQUET), II, 448.  
**Séquestres** du crâne, I, 183; des os palatins, extraction, I, 414; tuberculeux de la hanche, III, 401; du genou, III, 589.  
 — ostéomyélitiques du fémur, III, 515; du tibia, III, 690.  
**Séquestrotomie** du fémur, III, 518; du tibia, III, 693.  
**Serre-nœud**, II, 232.  
**Sésamoïdes** (os), leur rôle dans la luxation du pouce, III, 256.  
**Shock** dans les lésions traumatiques du rein, II, 135; dans les contusions de l'abdomen, II, 139; dans la ponction des kystes de l'ovaire, II, 220; dans les hernies étranglées, II, 377; dans les contusions du testicule, II, 749.  
**Siège** incliné dans le traitement de la scoliose habituelle, II, 888.  
**Sillons** ou scissures du cerveau, I, 101.  
**Sillon** de constriction de l'intestin dans l'étranglement herniaire, II, 367, 427; dilatation par invagination, II, 427.  
**Sinus** de la dure-mère, déchirure, I, 33, 97; entrée de l'air, I, 34, 197.  
 — sous-arachnoïdiens, I, 72.  
 — **frontaux**, fracture, I, 229; anatomie, I, 355; blessures, I, 356; formation de fistules, corps étrangers, concrétions, larves, catarrhe, I, 357.  
 — ectasie, hydropisie, hydatides, I, 357.  
 — suppuration, I, 357.  
 — trépanation, I, 359.  
 — polypes, carcinomes, ostéomes, I, 360.  
 — **maxillaire**, fractures, I, 219; empyème, hydropisie, I, 419; kystes muqueux, I, 420; tumeurs, I, 422; symptômes de ces dernières, I, 428.

**Solution de continuité** de l'œsophage, I, 716.

**Sondes** urétrales, exploratrices, II, 601; désinfection, II, 603; à demeure de HOLT, NAPIER, DITTEL, II, 605.

— évacuation pour la lithotritie, II, 662; à double courant, II, 683; pour l'incontinence de l'urine, (SQUIRE), II, 699; pour l'hypertrophie de la prostate, II, 781; de SO-CIN, pour le lavage de l'urètre, II, 784.

**Sonde** de Belloc, I, 334.

— œsophagienne, I, 745; de DUCAMP, CHELIUS, I, 724.

— laryngienne (DUBOIS), I, 835.

— aillée de HEISTER, II, 410.

**Soulier** de Scarpa, III, 802.

**Sous-cuisse** des bandages herniaires, II, 353.

**Sparadrap** (appareil au) de SAYRE pour les fractures de la clavicule, III, 10; pour les luxations de la clavicule, III, 17; pour l'extension du bras, III, 72; pour l'extension de la jambe, III, 442.  
 — (pansement au) des ulcères de la jambe, III, 681.

**Spéculum** du nez, I, 314, 315.

— naso-pharyngien de ZAUFBALL, I, 316.

— de l'oreille de WILDE, TOYNBEE, POLITZER, etc., I, 579.

— dilateur de VOLTOLINI, I, 315.

buccal, I, 407.

— rectal, II, 487; de WEISS, STEFFENS, FERGUSSON, 488.

— vaginal (SIMS, SIMON), II, 488.

**Spermatite aiguë**, II, 755.

**Spermatocèle**, II, 759.

**Spermatorrhée**, II, 791.

**Spermatozoïdes** dans le liquide de l'hydrocèle, II, 740; leur absence dans le liquide éjaculé, II, 793.

**Sphincter** anal, sa dilatabilité, II, 486; section dans les blessures du rectum, II, 507; dans la fissure anale, II, 515; rupture dans un but thérapeutique, II, 515; section dans les fistules uréthro et vésico-rectales, II, 642; dans la prostatite, II, 772.

**Spina bifida**, II, 797; ventosa, III, 275.

**Squelette** du nez, fractures, I, 224; redressement, I, 310; artificiel, I, 312.

**Squirre** de la parotide, I, 566; de la glande thyroïde, I, 709; du sein, II, 102; de l'ovaire, II, 212; du rectum, II, 558.