

Staphyloraphie, historiques, indications, I, 490; manuel opératoire, I, 494; procédés de DIEFFENBACH, de FERGUSSON, I, 496.

Stase veineuse dans les anses intestinales étranglées, II, 366.

Statistique des carcinomes du sein, II, 113; des hernies, II, 338; des hernies étranglées, II, 399; des calculs de la vessie, II, 648; des luxations de l'épaule, III, 37; de l'arthrite fongueuse du coude, III, 451; des luxations de la hanche, III, 357; des fractures du col du fémur, III, 386; de l'arthrite fongueuse du genou, III, 604; des affections du tarse, III, 739; des amputations partielles du pied, III, 754; du pied plat, III, 818.

Sténose, voir **Rétrécissement**.

Sténochorie, I, 399.

Stercoral (abcès), II, 149, 159, 188, 367.

Stercorale (fistules), II, 474; symptômes et diagnostic, II, 476; cure radicale, II, 478; établissement dans les rétrécissements de l'intestin, II, 294; dans les hernies étranglées, II, 413.

— (tumeur), II, 272.

Sternum, déformation en carène dans l'hypertrophie des amygdales, I, 512; fissure médiane, absence, II, 4; hématome, II, 7; fractures, diastases, II, 15; processus inflammatoires, nécrose, II, 53; gommes, II, 53; trépanation, II, 54; tumeurs, II, 56.

Stomatite due à l'éruption de la dent de sagesse, I, 403; mercurielle, I, 404, 522.

Stomatoplastie par les procédés de KRUGERHANSEN, DIEFFENBACH, VELPEAU, ROSER, I, 400; par les procédés de LANGENBECK, SZYMANOWSKY, JAESCHE, GUSSENBAUER, I, 401.

Strangurie, II, 598.

Stricture, voir **Rétrécissement**.

Strumite, I, 682.

Subluxation du radius, III, 139; de la main, II, 220; du genou, III, 537; dans l'arthrite fongueuse, III, 596.

Support pelvien pour l'application des appareils plâtrés, III, 436.

Surdité dans l'hypertrophie des amygdales, I, 513; dans la parotidite, I, 539; due à l'oblitération du conduit auditif externe par le cérumen, I, 578.

Suspension (appareil à) dans le traitement de la scoliose, II, 890.

— de SAYRE, II, 919.

— du bras dans le but d'éviter des hémorragies, III, 167, 236; verticale dans le phlegmon, etc. (VOLK-MANN), III, 238, 274, 285.

— de la jambe dans le phlegmon du pied, III, 726; dans la gangrène, III, 842.

Suspensoir, son emploi dans les grosses hernies incoercibles, II, 356.

Suture de la vessie, II, 138; des parois abdominales, II, 145; de l'intestin, II, 154, 416.

— de JOBERT et LEMBERT, II, 155; de GELY, des 4 maîtres, II, 155; royale du sac herniaire, II, 348; de l'orifice herniaire, II, 362; de l'intestin après l'excision cunéiforme des parties gangrenées, II, 417; à deux étages de CZERNY, II, 449; de l'olécrâne fracturé, III, 116; des tendons sectionnés, III, 493; des nerfs divisés, III, 196; de la rotule fracturée, III, 553; du tendon d'Achille, III, 730.

Syme (amputation de), III, 768.

Symphyse pubienne, diastase, fracture, III, 310; tuberculose, III, 331.

Synchondrose sacro-iliaque, diastase, III, 310; métastases pyémiques, inflammation chronique (sacro-coxalgie), III, 330.

Syncope dans les exsudats pleurétiques, II, 58; à la suite de la thoracocentèse, II, 68; à la suite du cathétérisme, II, 604.

Synostose entre le radius et le cubitus à la suite de fracture, III, 477.

Synoviaux (kystes de la main, III, 207).

Synovite aiguë séreuse de l'articulation de l'épaule, II, 64; suppurée, III, 65; fongueuse, III, 66; traitement, III, 72.

— de l'articulation du coude, suppurée, III, 150; fongueuse, III, 151; de l'articulation du poignet, suppurée, catarrhale, III, 216; fongueuse, III, 217.

— de la hanche, fongueuse, III, 399; suppurée, infectieuse, blennorrhagique, III, 429.

— du genou, tuberculose, granuleuse, III, 584; aiguë, séreuse, sérofibrineuse, III, 561; traitement, III, 574; aiguë suppurée, III, 563; catarrhale, III, 563; septique, III, 563.

— de l'articulation tibio-tarsienne,

aiguë, suppurée, III, 733; tuberculose, III, 736.

— de l'articulation de Lisfranc, tuberculeuse, III, 834.

Syphilis du crâne, I, 178; des mâchoires, I, 412; de la face, I, 246; du nez, I, 296, 329; du palais, I, 480; du pharynx et des amygdales, I, 515; de la langue, I, 528; du larynx, I, 785; de la trachée, I, 786.

— du sternum, II, 53; du mamelon, II, 80.

— de l'intestin, II, 293; du rectum, II, 529.

— du pénis, II, 723; du scrotum, II, 733; du testicule et de l'épididyme, II, 931.

— de la clavicule, III, 61; du coude, III, 153; des doigts, III, 277.

— de la jambe, III, 678; des orteils, III, 843; de la face plantaire du pied, III, 846.

T

Tabatière anatomique (ligature de la radiale dans la), III, 204.

Table interne ou vitrée du crâne, fragilité, I, 22; fractures, I, 41.

Tænia échinococcus, II, 202.

Taille, II, 663; méthodes, II, 667; position de l'opéré, II, 668; latéralisée, II, 668; médiane, II, 674; hypogastrique, II, 671; vésiculaire (LISFRANC), II, 673; chez la femme, II, 673.

Talon, rétraction à la suite de l'amputation de CHOPART, III, 758.

Tamponnement de la cavité nasale, I, 334; de la trachée, I, 432.

Tarsalgie des adolescents, III, 820.

Tarse, luxations, III, 711; fractures, III, 721; compliquées, par armes à feu, III, 723; contractures et attitudes vicieuses, III, 769; excision cunéiforme dans le pied-bot varus, III, 808.

Tartre dentaire, I, 468.

Taxis des hernies, II, 351; des hernies irréductibles, II, 358; dans l'engouement, II, 365; dans les hernies étranglées, II, 394; forcé, II, 397; des hernies crurales, II, 453.

Taylor (appareil de) dans la coxite, III, 446; dans la cyphose, II, 915.

Téguments du crâne, tumeurs, I, 161; provenant du tissu conjonctif, I, 172; de l'épithélium, I, 172.

Télangiectasie, voir **Angiomes**.

Température (état de la) dans la coxite, III, 432; dans l'arthrite fon-

gueuse du genou, III, 598; élévation, à la suite des fractures de la colonne vertébrale, III, 814.

Tendons de la main, blessures, III, 233; nécrose, III, 272; ténotomie dans les cas de rétraction dans le sens de la flexion, III, 290.

— (suture des), III, 193.

— d'Achille, lésions traumatiques, III, 730; suture, III, 729; rupture, III, 730; ténotomie, III, 731; dans le pied-bot varus, III, 799.

— (gainés des), voir **Gainés**.

Ténésme vésical, II, 691; rectal, II, 527.

Tenettes, II, 666.

Ténosynovite des extenseurs du pouce, III, 203; des tendons des doigts, aiguë suppurée, III, 271.

— crépitante, III, 203, 268.

Ténotomie du sterno-cléido-mastoi-dien, I, 488; des fléchisseurs de la main, III, 290; de fléchisseurs de la cuisse, III, 662; du tendon d'Achille, III, 734; dans le pied-bot varus, III, 799; du jambier postérieur, III, 800.

Testicule, inflammation dans la parotidite épidémique, I, 558; dégénérescence kystique dans les sacs herniaires, II, 331; adhérences fœtales avec l'épiploon, II, 335, 437; inflammation blennorrhagique, II, 751.

— maladies congénitales, II, 727; hypoplasie, hyperplasie, anomalies de position, II, 727; enveloppes, II, 735; situation dans l'hydrocèle, II, 741.

— lésions traumatiques, II, 749; luxations, II, 749.

— inflammation aiguë, II, 751; chronique, II, 755; fungus bénin, II, 756.

— syphilis, II, 757; tuberculose, II, 758.

— névralgies, II, 794.

— kystes, II, 759; fibromes, myxomes, enchondromes, myomes, sarcomes, adénomes, carcinomes, II, 760; mélanomes, II, 762.

— extirpation, II, 762.

Tétanos à la suite de l'ovariotomie, II, 238; à la suite des blessures des doigts, III, 251.

Tête, lésions traumatiques des parties molles, I, 4; contusion, I, 4; érysipèle, I, 11; lésions traumatiques chez les nouveau-nés, I, 144; tumeurs, I, 161.

— pendante (ROSE), I, 433; position

dans la laryngoscopie, I, 758 ; mobilité, II, 843 ; luxations, II, 846 ; luxations dans la carie des deux premières vertèbres cervicales, II, 909.

Thoracocentèse, II, 27, 57, 66.

Thorax, vice de conformation, II, 4 ; lésions traumatiques des parties molles, II, 4 ; plaies par armes à feu, II, 5 ; contusions, II, 7 ; fractures par contre-coup, dépression, II, 9 ; fractures, II, 10.

— processus inflammatoires et tumeurs, II, 48 ; pustule d'acné, furoncles, anthrax, II, 48 ; abcès, II, 48 ; lipome, fibrome, lymphangiome, molluscum, II, 50.

— résections partielles dans les fistules d'empyèmes, II, 73.

Thoracique (cavité), lésions traumatiques, II, 48 ; mécanisme et anatomie pathologique, II, 48 ; lésions sous-cutanées, II, 24 ; plaies pénétrantes, II, 29 ; modes de terminaison et pronostic, II, 34 ; traitement, II, 40 ; corps étrangers, II, 37 ; ponction, II, 66 ; échinocoque, II, 73 ; blessures par armes à feu, II, 35, 44.

Thrombose des sinus de la dure-mère, I, 38, 425 ; des veines du cou, I, 613 ; thrombose des petits vaisseaux terminaux du pied, causées par le marasme, III, 840.

Thyroïde (glande), I, 678 ; considérations anatomiques préliminaires, I, 678 ; inflammation idiopathique, I, 681 ; tumeurs, anatomie pathologique, I, 683 ; voir **Goitre**.

Thyroidite idiopathique, I, 681.

Thyrotomie, I, 803.

Tibia, subluxation dans l'arthrite fongueuse du genou, III, 596 ; traitement, III, 613 ; luxations, III, 535 ; congénitales, III, 539.

— fractures condyliennes, III, 556 ; disjonction épiphysaire, de cause traumatique, III, 557 ; fractures de la diaphyse, III, 667 ; fractures par armes à feu, III, 670 ; fractures isolées, III, 676 ; fractures des malléoles, III, 745 ; fractures longitudinales, III, 748 ; fracture sus-malléolaire, III, 748.

Tibia, incurvation dans le genu valgum, III, 625 ; incurvation rachitique, III, 694 ; traitement, III, 692 ; épaississement dans l'ulcère chronique de la jambe, III, 678 ; en forme de fourreau de sabre, III, 691.

— ostéomyélite, III, 688 ; nécrose, III, 690.

— pseudarthrose, III, 694 ; abcès, III, 690.

— gommages, III, 694 ; exostose épiphysaire, III, 696 ; sarcomes myéloïdes, endostaux, périostaux, III, 696.

— résections dans la continuité, III, 694 ; excision cunéiforme dans le genu valgum, III, 642 ; résection partielle de l'extrémité inférieure de l'os, III, 744.

Tibio-tarsienne (articulation), voir **Articulations**.

Tic consécutif de la face, I, 275.

Tire-fond, I, 460.

Tonsillotome, I, 545.

Tonsillotomie, I, 545.

Torsion du pédicule des kystes de l'ovaire, II, 216 ; de l'intestin, II, 305, 427.

Torticolis, I, 585 ; dans les affections des vertèbres cervicales, II, 908.

Tour de maître dans le cathétérisme, II, 603.

Trachée, fistules, I, 583, 624 ; fractures, I, 595 ; plaies, I, 623 ; — rétrécissement, I, 624, 627 ; compression par le goitre, I, 689 ; atrophie du cartilage, coudure dans le goitre, I, 691 ; déformation en fourreau de sabre, I, 691

— maladies, I, 773 ; inflammations aiguës, I, 773 ; diphtérie, I, 773 ; croup, I, 775 ; inflammations chroniques, I, 785 ; syphilis, I, 785 ; corps étrangers, I, 791.

— tubage, I, 838.

— granulome à la suite de la trachéotomie, I, 832.

Trachéotome, I, 800.

Trachéotomie, I, 775, 844 ; avant la résection du maxillaire supérieur, I, 432 ; dans les blessures du larynx, I, 625 ; dans le goitre, I, 708 ; dans la diphtérie, I, 773 ; dans l'œdème de la glotte, I, 783 ; dans la syphilis, I, 786 ; dans le spasme et la paralysie de la glotte, I, 790 ; dans l'asphyxie par le chloroforme, I, 790 ; dans les corps étrangers des voies respiratoires, I, 797.

— mortalité, I, 797.

— remarques anatomiques préliminaires, I, 802 ; méthodes opératoires, I, 811 ; préparatifs, I, 815 ; manuel opératoire, I, 817.

— traitement consécutif, I, 822 ; pronostic, I, 830.

— par la galvanocautique, I, 836.

— comme opération préliminaire, I, 836.

Traineau de VOLKMANN pour l'extension de la jambe, III, 443 ; idem de KOENIG, III, 443.

Traitement consécutif dans la résection du maxillaire supérieur, I, 439 ; dans le torticolis, I, 590 ; dans la trachéotomie, I, 822.

— de l'empyème, II, 74 ; de la suture intestinale, II, 459 ; de l'ovariotomie, II, 236 ; de la herniotomie, II, 425 ; de la proctoplastie, II, 503 ; des blessures du rectum, II, 507 ; de l'extirpation du rectum, II, 572 ; de la taille hypogastrique, II, 673 ; des abcès par congestion, II, 930 ; de la résection de la hanche, III, 473.

Transfusion du sang dans les veines du bras, III, 444.

Transparence des hydrocèles, II, 743.

Transplantation d'épiderme, suivant la méthode de REVERDIN, III, 682.

Transudation dans le sac herniaire dans les cas d'étranglement, III, 366.

Trématocine (CAREY), II, 764.

Trepanation, I, 453 ; instrument, I, 459 ; dans les fractures du crâne avec déplacement des fragments, I, 61, 89, 122 ; dans les hémorragies par la méningée moyenne, I, 96 ; dans les cas d'abcès du cerveau, I, 439 ; du sternum, II, 54 ; du fémur dans l'ostéomyélite, III, 546 ; dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 829.

Triangle de MITTELDORPF, III, 30.

— de J. L. PETIT, II, 439 ; de SCARPA, tumeurs, III, 524 ; lombaire supérieure, II, 439.

Trijumeau, résection de la 1^{re} branche, I, 262 ; de la 2^e branche, I, 263 ; de la 3^e branche, I, 269.

Trocart de SCHUH, II, 67 ; de THOMPSON, II, 219 ; de SPENCER-WELLS, II, 229 ; par la position de la vessie (FRÈRE-COSMÈS), II, 635.

Trochanter (grand), fracture isolée, III, 394 ; déplacement dans la coxite, III, 417 ; tuberculose, III, 422 ; tumeurs, III, 424 ; excision cunéiforme, III, 464 ; résection, III, 467.

Trompe d'Eustache (hémorragie par la) dans les fractures de la base, I, 46.

Trou optique, fractures, I, 83 ; borge de la langue, comme point de départ de tumeurs, I, 539 ; oval ou obturateur, hernies, II, 435.

Troubles fonctionnels des organes

génitaux de l'homme, II, 789 ; de la main et des doigts, III, 287 ; de la hanche à la suite de la coxite, III, 457.

— **psychiques**, à la suite des lésions traumatiques de la tête, I, 140.

— **d'accroissement** du membre inférieur dans la coxite, III, 424 ; à la suite de la résection de la hanche, III, 475 ; à la suite de la résection du genou, III, 617.

— de la hanche à la suite de l'ostéomyélite du tibia, III, 689 ; dans la paralysie essentielle de l'enfance, III, 773.

Tube intestinal, rupture par contusion, II, 438 ; hernie traumatique, II, 446 ; blessures, II, 447 ; voir, du reste, **Intestins**.

— rachidien, dilatabilité, I, 74.

Tubage de la trachée, I, 838.

Tuberculose des os du crâne, I, 484 ; de l'apophyse mastoïde, I, 186 ; de la cavité nasale, I, 328 ; des maxillaires, I, 412 ; du pharynx et des amygdales, I, 545 ; de la langue, I, 529.

— des ganglions du cou, I, 655 ; du larynx, I, 782.

— des côtes, II, 51 ; du sternum, II, 53.

— de l'intestin, II, 293 ; du rectum, II, 549, 528.

— de la vessie, II, 688 ; du testicule et de l'épididyme, II, 758 ; des vésicules séminales, II, 766 ; de la prostate, II, 788.

Tuberculose de la colonne vertébrale, II, 898.

— de la clavicule et de l'omoplate, III, 61 ; de l'articulation de l'épaule, III, 66 ; des ganglions de l'aisselle, III, 75 ; de l'articulation du coude, III, 151 ; des gaines tendineuses de la main, III, 205, 269 ; de l'articulation du poignet, III, 217 ; des articulations des doigts, III, 267 ; des phalanges des doigts (spina-ventosa), III, 275.

— des os du bassin, III, 330 ; de l'articulation de la hanche, III, 397 ; de la bourse séreuse trochantérienne et du trochanter, III, 422.

— de l'articulation du genou, III, 584 ; de l'articulation tibio-tarsienne et du tarse, III, 736 ; des os et articulations du métatarse, III, 834.

Tubercule de LISFRANC, I, 607 ; carotidien, I, 608.

Tubérosité de l'extrémité supérieure de l'humérus, fractures, III, 33.