

laissée par l'incision de détente; mais il faut bien se garder d'aller trop loin sous ce rapport, si l'on veut éviter une trop forte tension du




Fig. 28.




Fig. 28 a.

lambeau et obtenir une guérison par première intention (Fig. 30 et 30 a).

Dans les cas de pertes de substance très étendues de forme rectangulaire, on peut agir comme si l'on se trouvait en présence de plusieurs




Fig. 29.




Fig. 29 a.

rectangles réunis, et chercher alors à tailler un lambeau pour chacun de ces derniers, d'après les règles établies plus haut (Fig. 31 et 31 a).

La méthode opératoire de BUROW peut être également employée




Fig. 30.




Fig. 30 a.

dans les cas de pertes de substance rectangulaires. Après avoir taillé le lambeau suivant la méthode de CELSE (Fig. 28), on enlève deux triangles équilatéraux de peau saine au niveau de l'extrémité des incisions limitant le lambeau rectangulaire (Fig. 32 EFG et HIK), puis on réunit de la façon indiquée dans la figure 32 a.

Souvent aussi on fait usage, pour combler les pertes de substance rectangulaires, de lambeaux en partie arrondis, et que l'on est obligé de




Fig. 31.




Fig. 31 a.

tordre plus ou moins à leur base pour leur faire prendre leur nouvelle




Fig. 32.




Fig. 32 a.

position. On peut réparer de cette manière une perte de substance qui ne serait pas trop considérable (LETENNEUR).

Si la plaie à recouvrir est plus étendue, on taillera deux lambeaux semblables, un de chaque côté. S'agit-il d'une perte de substance ayant la forme d'un quadrilatère




Fig. 33.




Fig. 33 a.




Fig. 34




Fig. 34 a




Fig. 34 b.

non rectangulaire, comme, par exemple, dans les cas de destruction de l'une des lèvres, on peut alors tailler deux lambeaux verticaux et les réunir comme l'indiquent les figures 34, 34 a et 31 b. C'est le procédé de BRUNS (Voir plus loin le § 73 sur la cheiloplastie de la lèvre supérieure).

Les pertes de substance laissées par les deux lambeaux peuvent être réunies également par suture.

c. Pertes de substance de forme elliptique ou semi-lunaire. —




Fig. 35.




Fig. 35 a.

Lorsqu'elles ne sont pas trop larges on peut les réunir en ligne droite, après en avoir décollé légèrement les bords. Si la perte de substance est plus considérable, on peut faciliter le glissement de la peau à l'aide d'une




Fig. 36.




Fig. 36 a.

incision de détente ayant la forme d'un V, et prenant celle d'un Y après qu'elle a été réunie par des points de suture. On diminue ainsi la tension des bords de la plaie principale.




Fig. 37.




Fig. 37 a.

Au moyen d'incisions on peut très facilement tailler des lambeaux dans le voisinage des plaies elliptiques ou semi-lunaires. Le procédé le plus simple consiste à faire une incision AB dirigée perpendiculairement sur le milieu de l'ellipse (LISFRANC) (Fig. 36 et 36 a).