

détail et la conduite à tenir en présence de certains accidents inconstants.

Les *croûtes*, les *fuliginosités* qui encombrant la bouche et immobilisent la langue et le voile du palais doivent être enlevées, autant que possible, mais sans violence, au moyen d'un nettoyage qui doit être répété matin et soir; le meilleur procédé consiste à employer en guise d'éponges des tranches de citron ou d'orange.


L'état de la miction doit être attentivement surveillé; la *rétenion d'urine* peut survenir brusquement, et le cathétérisme biquotidien doit être pratiqué pendant toute sa durée.

Lorsque la maladie est longue et grave, on doit redouter la formation d'*eschares*. Pour les prévenir, dès que les points soumis à la pression présentent une rougeur persistante, je les fais revêtir d'une couche épaisse de poudre de quinquina, et il convient en même temps de disposer le lit et le malade de manière que les points menacés supportent la moindre pression possible. L'*eschare* survient-elle néanmoins, il faut la panser avec du vin aromatique et de la poudre de quinquina, et quand l'élimination est achevée, je traite la plaie avec l'alcool, avec ou sans addition d'acide phénique.

L'*hémorrhagie intestinale* est combattue par les applications permanentes de glace sur le ventre, par l'ingestion de la glace et par le perchlorure de fer à la dose de 20 à 40 gouttes dans une potion appropriée. — En présence des symptômes qui dénotent une *perforation*, il faut supprimer les boissons, maintenir le malade immobile dans le décubitus dorsal, avec des cerceaux qui soutiennent les couvertures, et donner l'opium selon la méthode de Graves et Stokes : 40 centigrammes en une seule dose dès le début, puis 5 centigrammes d'heure en heure jusqu'à production de narcotisme. Le succès est bien exceptionnel, mais il a été obtenu. — A la fin de la maladie et au début de la convalescence, il y a parfois une *constipation* opiniâtre avec *météorisme* croissant; ces accidents sont dus à la paralysie des muscles de l'intestin. Ils sont assez rares, je ne les ai observés jusqu'ici que quatre fois; ils ont rapidement cédé sous l'influence de quelques centigrammes de noix vomique (deux, puis trois par jour).


Dès que la fièvre commence à diminuer, je fais ajouter un potage au bouillon que les malades ont pris dès le début, et, lorsque le cycle fébrile est terminé, je prescris aussitôt de la viande grillée en très-petite quantité, sans me préoccuper de la *febris carnis*. Les accidents d'indigestion, de dyspepsie pendant la convalescence, sont certainement plus rares chez les malades qui n'ont pas été astreints à une diète absolue pendant toute la durée de la fièvre. Du reste, l'accroissement de l'alimentation doit être très-graduel; il faut savoir résister à l'appétit insolite des convalescents, et obéir au précepte : Souvent, mais peu.

Fig. 83. Fièvre typhoïde. — Homme de 21 ans.



(1) Perturbation critique. — 2 Déterescence brusque. — 3 Febris carnis.

Fig. 84. Fièvre typhoïde. — Homme de 26 ans. Température très élevée : isothermalité prolongée de la ligne vespérale.



OBSERVATIONS :
 (1) Sueurs profuses avec aggravation de l'adynamie. Suppression des lotions. Elevation de la dose d'alcool à 60 grammes.

CHAPITRE VII.

TYPHUS EXANTHÉMATIQUE.

La non-identité du typhus exanthématique (1) et de la fièvre typhoïde est depuis nombre d'années définitivement établie; ce serait méconnaître

(1) Synonymie : typhus de Hongrie, — fièvre épidémique, — typhus pétéchiâl, — typhus tacheté, — typhus fever, — typhus d'Irlande, — typhus des camps, des prisons, des navires, des lazarets, — typhus nerveux.

JACQUES DESPARTS, *Comment. ad Avicenna. Tract. IV* (Epidémie de Tournay en 1450). — FRACASTOR, *Op. omnia. De morbis contagiosis*. Venet., 1555. — DE CARMONA, *Tractatus de peste et febribus cum punctulis, vulgo Tavadillo*. Sevilla, 1581. — COYTARUS, *De febre purpura epidemica*. Lut. 1578. — WITTICHIUS, *De febre epidemica maligna petechiali*. Lipsiæ, 1592. — ESPICHT, *Bericht von den Fleckfebern*. Botzen, 1598. — PANSA, *Von den giftigen Fiebern welche malignæ genannt werden*. Leipzig, 1618. — MORELLI, *De febre purpurata epidemica et pestilente*. Lugd., 1641. — GROSSIS, *An morbi qui in Italia et præsertim in Gallia cisalpina hoc anno vagantur, sub nomine pestis, an vero inter febres pestilentiales numerari debeant*. Venet., 1691. — CLEMENTINI, *Op. omnia*. Basileæ, 1695.

CONRADINI, *Febris hungarica*. Augsb., 1574. — OBERNDORF, *Bericht von der Natur und Ursache der ungarischen Krankheit*. Francf., 1607. — BURGGRAV, *Von der ungarischen Hauptschwachheit*. Frankfurt, 1627. — DANKWERTH, *De lue hungarica cognoscenda et curanda*. Basileæ, 1633. — LANGE, *De morbo castrensi hungarico*. Lipsiæ, 1649. — GRABEN, *Vom Fleckfeber, von der ungarischen Krankheit*. Leipzig, 1664. — PETRUS AD HARTENFELS, *De febre militari seu morbo hungarico*. Erfurt, 1665. — MAJOR, *De febre maligna kiloniensi*. Kil., 1665. — MELCHIOR, *De morbo castrensi*. Giessen, 1675. — WILLIS, *De morbis castrensibus internis*. Hafniæ, 1676. — CARMONA, *De Danicæ epidemii*. Helmstadt, 1679. — MORLEY, *De morbo epidemico obs.* London, 1686. — MOREAU, *Traité de la véritable connaissance des fièvres continues, pourprés et continues*. Dijon, 1683. — DONKER, *Idea febris petechialis seu tractatus de morbo punctulari*. Lugd. Bat., 1686. — PANTHÉON, *Réflexions sur l'état présent des maladies qui règnent dans la ville de Lyon*. Lyon, 1695. — WEDELIUS, *De febre maligna*. Ien., 1696.

MONICHEN, *De febre maligna pestilenti*. Hafniæ, 1700. — EYSEL, *De febre petechiali*. Erf., 1700. — *Medicinisches Consilium und Bedenken über die in lieblicher Stadt Freyburg im Breyssgau, sowohl unter deren Burgeren, als der Guarnizon zu regieren angefangene hitzige Fleckenfeber*. Freyburg im Breyssgau, 1710. — HAHN, *Comment. febrium continuarum quæ anno 1729 Uratislaviæ grassatæ sunt*. Uratislaviæ, 1731. — FABRICIUS, *Diss. obs. quædam circa constitutionem epidemicam anni 1750 adnotatam*. Helmst., 1751. — GLASSER, *Von der Fleckfeberseuche*. Hildburg-Hausen, 1758. — HASENOERHL, *Hist. med. morbi epidemici*, etc. Vindob., 1760. — STRACK, *Obs. med. de morbo cum petechiis*. Karlsruhe, 1766. — BUCHOLZ, *Nachricht von dem jetzt herrschenden Fleck- und Frieselfeber*. Weimar, 1773. — FOURNIER, *Obs. sur les f. putrides malignes*. Dijon, 1775. — LEPECQ DE LA CLOTURE, *Obs. sur les maladies épid.* Paris, 1776. — PRINGLE, *Diseases of the army*. London, 1777. — PRATOLONGO, *Delle febbri che si dicono putride*,

les faits acquis, abandonner ou ignorer le bénéfice des progrès réalisés que de reprendre incessamment au même point les mêmes discussions, et prétendre élucider à nouveau une question désormais complètement résolue. Étant admis que ces deux maladies, par cela même qu'elles appartiennent à un même GENRE, ont en commun une fièvre continue, une stu-

etc. Genova, 1787. — CHAMBON DE MONTAUX, *Traité de la fièvre maligne simple*. Paris, 1787. — LIND, *Essay on the most effectual means of preserving the health of seamen in the R. navy*. London, 1774. — CAMPBELL, *Medical obs. on the typhus*. Lancaster, 1785. — RENWICK, *Inquiry into the nature and causes of sickness in ships of war*. London, 1792. — SMYTH, *On the jail-distemper*. London, 1795. — J. FRANK, *Beschreibung des Nervenfiebers*, etc. Ulm, 1798. — RATIN, *Instruction sur la maladie la plus commune dans les légions de la république française*. Paris, 1798. — LIPSCOM, *Essay on the nature and treatment of a putrid malignant fever which prevailed at Warwick*. London, 1799. — FODÉRE, *Hist. de la fièvre épid. de Nice de 1799 à 1800*. Paris, 1800. — TROUSSET, *Hist. de la f. qui a régné à Grenoble en 1800*. Grenoble, 1800. — MARQUIS, *Diss. sur les maladies pendant et après le siège de Toulon*. Paris, 1803. — HARLESS, *Neue Untersuchungen über das Fieber überhaupt, und die Typhusfeber insbesondere*. Leipzig, 1804. — HILDENBRAND, *Ueber den ansteckenden Typhus*. Wien, 1810-1815. — GEOFFROY et NYSTEN, *Obs. sur l'épidémie des prisonniers espagnols* (*Ann. Soc. méd. de Montpellier*, XIX, 1809). — MASDEVAL, *Relation des épidémies qui ont régné dans la Catalogne*. Marseille, 1809. — RUETTE, *Obs. cliniques sur une maladie qui a régné à l'hospice du Nord*. Paris, 1811. — MASSUYER, *Obs. suites à l'hôpital milit. de Strasbourg*. Paris, 1811. — KOLBANY, *Bemerkungen über den ansteckenden Typhus*, etc. Presburg, 1811. — WEDEMEYER, *De febre petechiali*. Göttingen, 1812. — HARTMANN, *Theorie des ansteckenden Typhus*. Wien, 1812. — MARCUS, *Ueber den jetzt herrschenden Typhus*. Bamberg, 1813. — RASORI, *Storia della febbre petechiali di Genova*. Milano, 1813. — BISCHOFF, *Beobacht. über den ansteckenden Typhus*. Prag, 1814. — ACKERMANN, *Von der Natur des ansteckenden Typhus*, etc. Heidelberg, 1814. — HUFELAND, *Ueber die Kriegspest älterer und neuerer Zeit*. Berlin, 1814. — HORN, *Erfahrungen über Heilung des ansteckenden Nerven- und Lazarethfiebers*, etc. Berlin, 1814. — EISENOHR, *Ueber die Natur und Behandlung des epidemischen und contagiösen Nervenfiebers*, etc. Karlsruhe, 1814. — WEBER, *Bemerkungen über die in Kiel herrschenden Krankheiten, besonders den Typhus*. Kiel, 1814. — MÜTZENBRECHER, *Vorläufige Nachricht von den jetzt herrschenden Krankheiten dieser Stadt*. Altona, 1814. — WEDEMEYER, *Erkenntniss und Behandlung des Typhus*. Halberstadt, 1814. — BECKER, *Ueber die Erkenntniss und Heilung des Petechialfiebers*. Göttingen, 1814. — WACKER, *Ueber den Typhus und die herrschenden Krankheiten*. Dillingen, 1815. — WOLFF, KOPP, *Hufeland's Journal*, 1814. — THILENIUS, *Himly, Eodem loco*, 1815. — MENDE, *Eodem loco*, 1818.

BUCHANAN, *Treatise upon the typhus fever*. Baltimore, 1738. — GAMAGE, *Some account of the fever which existed in Boston*, etc. Boston, 1818. — SMITH, *A practical essay on typhus fever*. New-York, 1824.

CALLANAN, *On the pathology and treatment of typhus fever*. Cork, 1817. — PERCIVAL, *Dublin hosp. reports and communic.*, 1817. — BATEMAN, *Succinct account of the contagious fever of this country*. London, 1818. — JACKSON, *A sketch of the history of contagious fever*. London, 1819. — HAVILAND, HARRISON, *Fièvre de Cambridge* (*Med. Trans.*