

FORMULAIRE

THÉRAPEUTIQUE ET PROPHYLAXIE

DES

MALADIES DES ENFANTS

A

ABCÈS A L'ANUS

On distingue des abcès inférieurs, entre la peau et le releveur de l'anus, et des abcès supérieurs, entre le releveur et le péritoine. Les causes sont d'ordre local : grattages avec des ongles malpropres, oxyures vermiculaires, contact de thermomètres malpropres, etc. J'ai vu 7 cas d'abcès à l'anus à la suite de la fièvre typhoïde et de la scarlatine, chez des enfants de mon service. Un thermomètre mal lavé avait servi d'agent de transmission. On trouve, dans ces abcès, le bacille du côlon uni aux pyogènes (strepto et staphylocoques). Quand l'abcès est froid, le bacille de Koch est en cause. Il y a trois classes d'abcès : 1° les abcès tubéreux, superficiels, petits, arrondis, presque indolents, prenant naissance dans les glandes sudoripares et sébacées ; 2° les abcès margellaires, sous-cutanéomuqueux, plus gros, douloureux, pouvant aboutir à la fistule ; 3° les abcès ischio-rectaux beaucoup plus rares chez les enfants.

TRAITEMENT

La collection reconnue et ses connexions étudiées, on ouvrira au bistouri ou au thermocautère ; l'incision sera large, compre-