

En cas de cris, d'agitation, de signes de douleur, on fera des frictions avec un sirop de dentition :

℥ Safran	3 grammes.
Tamarin	30 —
Miel	200 —
Eau	100 —

(DELABARRE.)

℥ Miel rosat	60 grammes.
Miel de mercuriale	20 —
Teinture de safran	20 —
— de myrrhe	10 —
— de coca	5 —
— de vanille	5 —

(YVON.)

℥ Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 10.
Borax	1 gramme.
Sirop diacode	5 —
Sirop simple	20 —

℥ Sirop simple	20 grammes.
Eau de laurier-cerise	5 —
Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 05.

Faire des frictions légères avec le doigt propre ou un petit tampon d'ouate hydrophile.

℥ Miel blanc	10 grammes.
Glycérine	10 —
Chloroforme	X gouttes.

℥ Sirop de fleurs d'oranger	10 grammes.
Sirop de miel	10 —
Teinture de belladone	X gouttes.
Chloroforme	X —

℥ Glycérine	20 grammes.
Borate de soude	1 —
Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 05.
Laudanum de Sydenham	11 gouttes.

Frictionner les gencives quatre fois par jour avec un petit bourdonnet d'ouate hydrophile trempé dans ces mixtures.

℥ Baume de tolu	1 gramme.
Safran	1 —
Borate de soude	1 gr. 25.
Vanilline	0 gr. 10.
Codéine	0 gr. 05.
Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 15.
Sirop de miel	40 grammes.
Glycérine	210 —

Tremper la pulpe du doigt dans ce mélange et frotter doucement les gencives. (COMBE.)

Pour ce qui est du traitement des différentes stomatites qui peuvent compliquer la dentition, voyez les mots STOMATITES, APHTES, MUGUET.

S'il y a de l'agitation, de l'insomnie, on donnera des bains tièdes et on fera prendre 15 à 20 centigrammes de bromure de potassium dans une cuillerée à café de sirop.

DERMATITE CONTUSIFORME

(Voyez ÉRYTHÈME NOUEUX)

DERMATITE EXFOLIATRICE

Outre les dermatoses de la seconde enfance, qui peuvent s'accompagner d'une desquamation de la peau (eczéma aigu, pityriasis rubra, etc.), on a décrit en Allemagne (RITTER) une *dermatite exfoliatrice des nouveau-nés* dont j'ai vu plusieurs cas et qui se distingue de la desquamation physiologique des premières semaines de la vie. Il se produit d'abord une rougeur diffuse de la peau avec démangeaisons ; puis l'épiderme se fissure, se fendille, se ride et tombe par lambeaux ; parfois il se forme des vésicules ou des bulles qui crèvent, se dessèchent et desquament. La maladie dure trois ou quatre semaines ; l'état général reste bon dans quelques cas ; ailleurs il est très mauvais et la mort survient par une véritable septicémie cutanée.

TRAITEMENT

On poudrera les surfaces suintantes avec un mélange de talc et d'acide borique ; on donnera des bains antiseptiques (sublimé 1 gramme, chlorure de sodium 1 gramme pour 10 litres d'eau dans une baignoire en bois). Enfin on assurera à l'enfant un bon allaitement, si cela est possible. La guérison ne se fait pas attendre quand l'hygiène alimentaire est suffisante.

DESQUAMATION LINGUALE

La desquamation linguale, dite encore glossite exfoliatrice marginée, desquamation en aires, langue géographique, eczéma de la langue (BESNIER), est une affection sans gravité de la première enfance, qui n'a rien de commun avec la syphilis,

quoi qu'en ait dit Parrot, et qui pourrait bien être de nature parasitaire. Elle se présente sous forme de surfaces arrondies, polycycliques, souvent limitées par une marge, un bord saillant, occupant la surface dorsale de la langue; au niveau des parties malades, il est facile de constater que la langue est dépouillée de son épithélium. Il ne paraît d'ailleurs résulter aucune gêne de la présence de cette lésion. Le diagnostic est des plus faciles : impossible de confondre la desquamation linguale avec une autre variété de stomatite.

TRAITEMENT

Le traitement est jusqu'à présent absolument nul; et, d'ailleurs, aucune indication urgente ne se pose : la découverte de la desquamation linguale est le plus souvent l'effet du hasard. On se bornera à faire de fréquents lavages de la bouche avec une solution de chlorate de potasse ou de borax à 5 p. 100. On veillera à la propreté des tétérilles quand l'enfant sera élevé au biberon : la plupart des nourrissons que j'ai observés, atteints de desquamation linguale, étaient élevés au biberon; les enfants au sein y échappent presque constamment. M. Besnier prescrit la pommade suivante :

℥ Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 05.
Baume du Pérou	} aa. 1 gramme.
Acide borique	
Vaseline	40 —

Applications locales deux fois par jour.

℥ Glycérine	50 grammes.
Hyposulfite de soude	4 —

Oncions matin et soir.

DIABÈTE SUCRÉ

Le diabète est rare chez les enfants et ne s'observe guère que dans la seconde enfance; il serait plus commun chez les filles que chez les garçons. L'hérédité similaire ou dissemblable (diabète, goutte, asthme, migraine, névrose des ascendants) est à l'origine de la plupart des cas; mais il faut tenir compte aussi des traumatismes craniens, des lésions cérébrales, de l'alimentation vicieuse, des maladies infectieuses (fièvres éruptives,

impaludisme). La maladie, dont le début peut échapper à cause de son insidiosité, s'annonce par de la polyurie avec azoturie, par de la polyphagie et de la polydipsie. Le diabète de l'enfant est un *diabète maigre* et à marche rapide. Tout enfant diabétique, dit Sénac, est destiné à disparaître à bref délai; la gravité du diabète est en raison inverse de l'âge. Pour faire le diagnostic du diabète, il faut y penser et analyser les urines.

TRAITEMENT

L'enfant est-il encore à la mamelle, on ne peut lui supprimer le régime lacté; on agit sur sa peau par les bains salés ou sinapisés, les frictions sèches ou stimulantes (alcool camphré, eau de Cologne, baume de Fioravanti). Si l'enfant est sevré, on le soumet au régime azoté des diabétiques : pain de gluten ou pain de Soya, pain grillé en petite quantité (100 à 200 grammes par jour), pommes de terre bouillies (3 ou 4 seulement), œufs, fromages, viandes, poissons, légumes verts, beurre et graisses, vin rouge coupé d'eau alcaline. On supprime les féculents, les pâtisseries, les aliments sucrés, le lait. Parmi les fruits, on interdira les plus sucrés (raisins, oranges, cerises), et on ne donnera les autres qu'avec beaucoup de discrétion. On permettra les fruits huileux (noix, noisettes, olives, pistaches, etc.). On conseillera l'exercice, la promenade, la gymnastique.

Parmi les médicaments, ceux qui ont donné les meilleurs résultats sont : l'arsenic, le bicarbonate de soude, l'opium.

℥ Arséniate de soude	0 gr. 10.
Eau distillée	250 grammes.

Une à quatre cuillerées à café par jour.

Suspendre pendant une semaine tous les mois.

℥ Bicarbonate de soude	1 gramme.
----------------------------------	-----------

Pour un paquet; en donner deux par jour dans un peu d'eau ou de vin.

℥ Extrait thébaïque	0 gr. 01.
Excipient et glycérine	q. s.

Pour une pilule; en prendre 1 à 5 par jour, suivant l'âge de l'enfant.

Surveiller ce médicament de très près, à cause de la susceptibilité présentée par les jeunes sujets.

Begbie aurait guéri en sept semaines une enfant de 13 ans,

BIBLIOTECA
FACULTAD DE MEDICINA
HABANA

diabétique depuis neuf mois, par l'huile de morue et le bromure de potassium, sans modifications du régime.

℞ Bromure de potassium	10 grammes.
Glycérine	50 —
Eau de fleurs d'oranger	10 —
Eau distillée	130 —

Une à quatre cuillerées à café par jour.

L'antipyrine agit quelquefois bien sur la polyurie :

℞ Antipyrine	10 grammes.
Glycérine	30 —
Eau de menthe	20 —
Eau distillée	100 —

On sucre les boissons et les potions avec la glycérine; la saccharine associée au bicarbonate de soude (pastilles) peut servir au même usage, mais on lui a reproché des troubles digestifs qu'il faut éviter.

℞ Saccharine	3 grammes.
Bicarbonate de soude	2 —
Mannite	50 —
Mucilage	q. s.

Pour 100 pastilles.

Chaque pastille (3 centigrammes de saccharine) représente un morceau de sucre de 10 grammes.

Les injections sous-cutanées d'extrait glyciné de pancréas, essayées dans quelques cas de diabète maigre, n'ont encore donné aucun résultat appréciable. Il y aurait lieu de faire ingérer la glande pancréatique crue ou peu cuite.

L'huile de foie de morue sera prescrite à haute dose chez tous les enfants qui pourront la supporter. Aux autres, on donnera le vin de quinquina et, à son défaut, de faibles doses de quinine (10 à 30 centigrammes par jour).

Les eaux minérales qui conviennent aux enfants diabétiques sont principalement les eaux alcalines, Vichy, Vals. D'après Sénac, Vichy serait impuissant contre le diabète infantile. On essaiera cependant cette station, indiquée avant toute autre; si elle ne réussit pas, on s'adressera à la Bourboule, qui peut agir à la fois par son arsenic, par son bicarbonate de soude,

par son chlorure de sodium. Après la Bourboule, on peut indiquer Royat, Saint-Nectaire et les chlorurées sodiques froides (Salies-de-Béarn, Salins) ou chaudes (Bourbonne).

DIARRHÉE

La diarrhée existe quand les selles sont plus fréquentes, plus abondantes et plus liquides qu'à l'état normal. Ce syndrome est extrêmement commun dans la première enfance, et son importance est capitale. J'aurai surtout en vue la diarrhée des enfants âgés de moins de deux ans.

Il faut distinguer, au point de vue des causes, du traitement, de la prophylaxie, diverses espèces de diarrhée.

1° DIARRHÉE DES ENFANTS NOURRIS EXCLUSIVEMENT AU SEIN

Les enfants élevés au sein de leur mère ou d'une nourrice n'ont que très rarement la diarrhée, et cette diarrhée est d'ordinaire peu grave.

La diarrhée peut dépendre de l'abondance du lait, de la fréquence trop grande des tétées, de la qualité du lait (régime défectueux de la nourrice, abus des spiritueux, des aliments indigestes, des choux, menstruation). Quelquefois le lait de la nourrice, sans qu'on sache pourquoi, ne convient pas à l'enfant et le changement de nourrice s'impose.

Pour traiter cette variété de diarrhée, on en cherchera la cause et on y remédiera de la façon suivante :

Si les tétées sont trop rapprochées, si l'enfant prend trop de lait, s'il a des régurgitations fréquentes, on prescrira 7 ou 8 tétées seulement en 24 heures ainsi réparties : 6 dans la journée (toutes les deux heures ou toutes les deux heures et demie), 2 dans la nuit. Si, malgré la réglementation des tétées, le lait est mal digéré, soit parce qu'il est trop vieux, soit pour une autre cause, on essaiera du moyen suivant : après chaque tétée, on fera prendre à l'enfant, à l'aide d'une petite cuiller, quelques gouttes d'eau de chaux, d'eau de Vichy (Célestins, Hauterive) ou d'eau de Vals (Saint-Jean).

On veillera sur le régime de la nourrice, on recommandera les promenades au grand air; si la nourrice vient à être

BIBLIOTECA FACULTAD DE MEDICINA BIBLIOTECA