202. Hieracium umbellatum L. 203. Cichorium intybus L. 204. Jasione montana L.
205. Phyteuma orbiculare L. 206. Campanula glomerata L.

202. **Hieracium umbellatum** L. (*Epervière en ombelle*). Souche dépourvue de stolons; tige ordinairement élevée, de 30 à 120 cm., robuste, dressée, dure et non fistuleuse, rameuse au sommet. Feuilles glabres sur les 2 faces ou un peu hérissées en dessous, presque coriaces, desséchées à la base avant la maturité des fruits: les caulinaires très nombreuses, entièrement sessiles, allongées-linéaires; les inférieures courtement pétiolées à limbe largement denté. Capitule sur des rameaux dressés, réunis en panicule ombelliforme; folioles du sommet de l'involucre réfléchies; fleurs jaunes, brunissant par la dessication. Août—Septembre. Très commun dans les bois et sur les coteaux ombragés, sauf dans la région méditerranéenne.

203. **Cichorium intybus** L. (*Chicorée sauvage*). Herbe de 30 à 100 cm., dressée, à rameaux raides, étalés, presque horizontaux. Feuilles à dents très inégales, dont la terminale est grande, aiguë; les supérieures sont plus allongées et un peu embrassantes. Capitules disposés tantôt à l'aisselle des feuilles et sessiles, tantôt à l'extrémité de longs pédoncules nus et, dans ce cas, toujours solitaires. Fleurs grandes, bleues, rarement blanches ou rosées; akènes comprimés à 4 arêtes et surmontés d'une petite couronne de courtes écailles. Juillet—Septembre. Spontanée sur le bord des chemins et dans les lieux incultes, cette espèce, usitée comme fourrage est aussi cultivée pour l'alimentation de l'homme (*Chicorée améliorée*); étiolée, c'est la »*Barbe de Capucin*«. Ses racines et ses feuilles jouissent de propriétés amères et dépuratives. Le **C. indivia** L. (*Endive*), originaire de l'Inde, présente deux variétés alimentaires très répandues: la »*Scariole*« ou »*Escharole*« et la »*Chicorée crépue*«.

CAMPANULACÉES.

Herbes à feuilles isolées, rarement opposées, simples, sans stipules. Fleurs ⚥, régulières ou non, 5-mères; calice et corolle régulières ou bilabiées; étamines parfois soudées par leurs anthères; ovaire à loges plus ou moins nombreuses et multiovulées. Elles habitent surtout les contrées tempérées et subtropicales de l'Hémisphère nord; elles renferment des laticifères à contenu laiteux composé de principes âcres et mucilagineux, mais elles sont peu importantes au point de vue alimentaire ou médicinal.

204. **Jasione montana** L. Plante de 15 à 20 cm., à feuilles lancéolées, ondulées, velues, sessiles. Fleurs bleues sur des pédoncules nus et disposées en têtes globuleuses, entourées d'un involucre; corolle rotacée à 5 lobes linéaires; anthères soudées entre elles à la base. Juin—Juillet. Lieux secs et sablonneux, manque sur les sols calcaires.

205. **Phyteuma orbiculare** L. (*Raiponce orbiculaire*). Racine fibreuse produisant des tiges de 15 à 80 cm.; feuilles radicales oblongues-lancéolées, tronquées ou plus ou moins cordées à la base, les supérieures, lancéolées-linéaires, sessiles. Fleurs bleues, 5-mères, agglomérées en capitules arrondis puis ovoïdes, avec un involucre à folioles ovales acuminées; corolle à divisions profondes, rotacée; capsule à 2 à 3 loges, s'ouvrant par un pore. Mai—Juillet. Montagnes boisées, mais surtout calcaires; rare dans la région méridionale.

206. **Campanula glomerata** L. (*Campanule agglomérée*). Herbe à tige mince, pubescente ou glabre; feuilles presque toujours pubescentes, les inférieures longuement pétiolées, ovales-oblongues, arrondies et cordées à la base, les supérieures amplexicaules. Fleurs sessiles réunies en capitules terminaux et latéraux, peu serrés, de couleur bleue, parfois blanche. Mai — Septembre. Plante assez commune sur les coteaux et dans les paturages secs, sauf dans le Nord-Ouest et la plaine méditerranéenne.

BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. N. L.

207. **Campanula rapunculoides** L. (*Campanule Fausse-Raiponce*). Souche émettant de longs stolons; tige arrondie velue ou presque glabre, de 40 à 100 cm.; feuilles rudes, pubescentes, dentées-crénelées, ovales-lancéolées: les supérieures presque sessiles, les inférieures plus ou moins longuement pétiolées et cordées à la base. Fleurs parfois blanches, généralement bleues, pédicellées, penchées, disposées en grappe non feuillée, ayant en général plus de 2 cm. de longueur; corolle campanulée, ciliée; divisions du calice renversées en dehors après la fécondation, style assez longuement exsert, à stigmate trifide. Juillet—Août. Cette plante est assez commune dans les endroits cultivés, mais rare dans l'ouest et presque tout le midi de la France. Les racines et les jeunes pousses peuvent être mangées, mais elles sont moins estimées que celles d'une espèce voisine, le **C. rapunculus** L. (*Raiponce*); plusieurs Campanules se cultivent pour l'ornementation des jardins et des pelouses.

208. **Campanula rotundifolia** L. (*Clochette, Campanule à feuilles rondes*). Plante à souche cespiteuse, émettant des tiges de 15 à 50 cm., grêles, nombreuses, presque glabres. Feuilles à peine pubescentes: les radicales, réniformes ou cordées, crénelées, longuement pétiolées; les caulinaires lancéolées-linéaires, atténuées aux deux extrémités. Fleurs relativement larges, bleues, rarement blanches, pédonculées, généralement penchées et disposées en panicule; calice à divisions linéaires-sétacées; corolle glabre. Juin—Septembre. Commune dans les lieux herbeux et sur le bord des chemins, sauf dans les plaines du centre, de l'ouest et du midi de la France.

209. **Campanula persicæfolia** L. (*Campanule à feuilles de Pêcher*). Racine grêle rampante; tige simple, arrondie, glabre, de 30 à 80 cm.; feuilles glabres, fermes, luisantes: les inférieures oblongues, longuement pétiolées; les supérieures lancéolées-linéaires, sessiles. Fleurs peu nombreuses, de 1 à 6, en forme de cloche évasée, de couleur bleue plus ou moins pâle, parfois blanches, peu penchées, et groupées en une simple grappe lâche; calice à divisions linéaires-lancéolées, séparées par des angles aigus; corolle très grande et glabre; capsule dressée. Juillet—Août. Assez commune dans les prés, les bois, les taillis, sauf dans l'ouest de la France.

210. **Campanula patula** L. (*Campanule étalée*). Jolie plante rameuse de 30 à 50 cm., à feuilles inférieures obovales-arrondies au sommet, entières ou légèrement crénelées et atténuées à la base, les supérieures lancéolées-linéaires, sessiles. Fleurs d'un rouge violacé, largement ouvertes; calice divisé en 5 lobes étalés, linéaires; corolle découpée au moins jusqu'au milieu en 5 pétales. Juin—Septembre. Elle existe çà et là dans toute l'Europe sauf vers le nord; elle manque en France dans la région est et nord-est.

211. **Specularia speculum** A. D. C. ou **Campanula** L. ou **Prismatocarpus** L'Herm. (*Miroir de Vénus*). Petite plante de 15 à 30 cm., velue, dressée, très ramifiée à la base. Feuilles ondulées, crénelées: les inférieures obovales, atténuées en pétiole: les supérieures oblongues et semi-embrassantes. Fleurs d'un pourpre violacé, plus rarement blanches, groupées en panicule terminale, pourvue de feuilles; calice à divisions linéaires dressées; corolle grande, ouverte rayonnée, égalant au moins les divisions calicinales. Mai—Août. Elle est abondamment répandue dans les moissons, à travers l'Europe entière.

207. Campanula rapunculoides L. 208. Campanula rotundifolia L. 209. Campanula persicifolia L. 210. Campanula patula L. 211. Specularia speculum A.D.C.