| | *Pro dosi* | *Pro die* |
|---|---|---|
| Hidroclorato de cocaína | 0 gr. 10 | 0 gr. 30 |
| Gaiacol (*) | 0 gr. 10 | 0 gr. 50 |
| Haschish | 0 gr. 10 | 0 gr. 30 |
| Tanato de mercurio | 0 gr. 10 | 0 gr. 30 |
| Hidroquinona | 0 gr. 80 | 1 gr. 5 |
| Hipnona | 0 gr. 50 | 1 gr. 5 |
| Yodol (*) | 0 gr. 20 | 1 gr. » |
| Tricloruro de yodo (*) | 0 gr. 20 | 1 gr. » |
| Osmiato de potasa (*) | 0 gr. 20 | 1 gr. » |
| Kairina | 1 gr. » | 4 gr. » |
| Metheal | 4 gr. » | 8 gr. » |
| Piridina (*) | 4 gr. » | 8 gr. » |
| Resorcina (*) | 3 gr. » | 10 gr. » |
| Sulfato de esparteína | 0 gr. 03 | 0 gr. 10 |
| Sulfonal | 4 gr. » | 8 gr. » |
| Sulfato de talina (*) | 0 gr. 50 | 1 gr. 5 |
| Tartrato de talina (*) | 0 gr 50 | 1 gr. 5 |
| Tintura de estrofanto | 1 gr. 5 | 5 gr. » |

# TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA

### Tratamiento abortivo del furúnculo por las inyecciones parenquimatosas

Desde 1875, Bidder ha empleado como cien veces una medicación qne él considera como capaz de contener el curso de los furúnculos. Su método consiste en inyectar una solución á 2 por 100 de ácido fénico en los furúnculos. En los furúnculos pequeños basta una sola inyeción de algunas gotas. En los de mayor tamaño, se puede inyectar media jeringa de Pravaz ó una jeringa entera. En los furúnculos muy gruesos, cuyo tamaño alcanza casi el del puño de un adulto, se necesitan dos ó cuatro jeringas. La inyección se hace de una sola vez, después se tapa el furúnculo con una compresa fenicada. En la mayor porte de los casos hasta basta poner un pedazo de diaquilón en lugar de una compresa fenicada. Este método evita las incisiones, la supuración, la cicatrices. La infiltración desaparece muy pronto y nunca queda una cicatriz extensa



del tejido celular. Según Bidder, se podría proceder del mismo modo con el furúnculo y el antrax, solamente, sería preciso hacer inyecciones más numerosas que en el furúnculo simple.

(*Münchener Med Wochenschr.*, *y Paris medical.*)

### Del empleo cual antiséptico del alquitrán con yodoformo

Este producto se obtiene por la mezcla del alquitrán con los polvos de yodoformo. Examinado con el microscopio, él no presenta ya el aspecto cristalino de este último producto.

El yodoformo alquitranado se presenta en forma de escamas micáceas, transparentes, de color oscuro, fácilmente reductibles en unos polvos absolutamente privados del olor del yodoformo y que tienen un leve olor no desagradable de alquitrán. Éste desaparece si se añade un poquito de estoraque líquido á una gran cantidad de yodoformo alquitranado.

Esta preparación posee propiedades antisépticas que M. Ehrman ha experimentado sobre veintidos enfermos de la clínica sifilítica de Viena.

Para ello él curaba con esa substancia cancros y bubones, y obtenía una curación tan rápida como si huberia empleado yodoformo puro, pero con las ventajas que no había mal olor ni irritaciones cútaneas. Además la cicatrización era más regular sobre toda la superficie de la llaga.

### Mezcla antiséptica para facilitar la extracción de los tapones ceruminosos

En razón de la posibilidad de que un furúnculo sea la consecuencia de la extracción de un tapón ceruminoso por el simple empleo de la jeringa, el Dor Lœrvenberg piensa quc es prciso en todos esos casos tratar anticipadamente las masas acumuladas durante veinticuatro ó cuarenta y ocho horas con instilaciones antisépticas preparadas con arreglo á la fórmula siguiente :

| | |
|---|---|
| Acido bórico | 3 gr. 50 cent. |
| Glicerina neutra | 50 — |
| Agua destilada | 50 — |

Hágase calentar é instílese en el oído por medio de un tubo para ensayos; consérvesé el líquido durante quince minutos y repítanse estos baños por la mañana y por la noche durante uno ó dos dias.

Es bien advertir al enfermo que estas instilaciones que aumentan el volumen del tapón por la imbibición, podrán volverlo por algún tiempo más sordo.

# FORMULARIO

### Píldoras contra las hemoptisis.

Yodoformo. . . . . 5 centigramos.
Tanino. . . . . 10 —
Para una píldora. — 3 á 5 al día.

### Enfermedad de Bright.

Para culquier forma de albuminuria unida á una nefritis, el doctor Semmola recomienda el tratamiento siguiente:

Yoduro de potasium . . . . . 1 gr.
Fosfato de sosa . . . . . 1 gr. 80
Cloruro de sodio . . . . . 5 gr. 50

Disueltos en agua y administrados en las veinticuatro horas ya sin mezcla, ya con leche.

### Tratamiento simple de la sarna
(LAMBERT.)

Háganse tres ó cuatro fricciones con la pomada siguiente, y tómese después un baño alcalino:

Axungia. . . . . 125 gramos.
Benzina . . . . . 30 —
M. S. A.

### Ungüento para las almorranas.
(V. AUDHOUI.)

Ungüento populeum. . . . . 30 gramos.
Cerato saturnado . . . . . 10 —
Extracto de belladona . . . . } 1 —
Extracto de tebaica . . . . . }
Antipirina . . . . . 3 —

Unciones sobre los tumores hermorroidales irritados, dolorosos y que no fluyen.

### Tratamiento preventivo.
(V. ROBERT.)

Píldoras de podofila de 2 centigr., 1 ó 2 cada noche y más si es necesario para obtener cada mañana una evacuación blanda.

Suspéndanse y vuélvanse á tomar según haya desaparecido ó vuelto el estreñimiento que es uno de los grandes factores de las hemorroides.

*Gerente* : E. PIERRE.

Imp. D. Dumoulin y Cia, calle des Grands-Augustins, 5, Paris.

# TERAPÉUTICA MÉDICA

### Tratamiento de la difteria por el hielo.

Recibimos del Sñr. Dr Bleynie la siguiente carta que completa el artículo que hemos publicado en nuestra última entrega y tenemos el gusto de insertar en ésta.

« Mucho le agradezco de haberme querido ayudar en la propagación del tratamiento de la difteria por el frío, y le doy las gracias por haberse complacido remitirme varios ejemplares de la entrega del *Monitor terapéutico* que contiene la análisis de mi nueva publicación sobre este argumento.

« En ocasión de esta análisis, Vd manifesta el temor de que la necesidad de hacer el remedio de día y de noche, cada diez minutos sea un grande obstáculo, y que la lentitud del remedio desaliente antes que se produzca el efecto.

« El obstáculo que Vd teme *a priori*, mi apreciable colega, no existe en la prática; nunca ha impedido el tratamiento en la nuestra, ni en la de nuestros colegas, que hemos publicado, ya que todos los enfermos tratados han sido curados.

« Si el administrar hielo ó agua fría del modo que indicamos es la condición necesaria para conseguir el objeto *cito et tute* con el *jucundum*, por añadidura, cosa que no sucede con algunas medicaciones cuyos buenos resultados no justifican su violencia, añadiremos que algunas veces hemos presenciado retrasos de una ó dos horas que no han hecho más que retardar la cura. Pero téngase presente que esas suspensiones prolongadas podrían favorecer la invasión de la laringe por la falsa membrana.

« Las observaciones de que doy cuenta en mi folleto no son de las que puedan merecer el reproche de *lentitud del resultado* que Vd cree deber dirigir al tratamiento. Si Vd se digna, muy apreciable colega, tomarse la molestia de abrir mi opúsculo, Vd leerá en él que tan luego como se principia á administrar el hielo, los fenómenos locales mejoran de un modo sensible aún en los casos más graves; que la falsa membrana se detiene en su desarollo, disminuye progresivamente y desaparece algunas veces en menos de treinta y seis horas (véanse las 1ra y 2da observaciones y *pas-*