II. *Pomada* (Kortum).

Creolina.	0 30 á	1 gramo.
Axungia.		30 —

III. *Polvos* (Neudorfer).

Creolina.	2 á	4 gramos
Ácido bórico.	100 á	4 —

M. y redúzcase á polvos finos. — Para usar en las curaciones secas.

IV. *Píldoras compuestas*

Creolina.	10 á	30 centigramos.
Cera blanca.		1 gramo.
Polvos de opio.		20 centigramos.
— de clavo.		2 —
Mucilago.		q. s.

M. y h. s. a 30 píldores, para tomar en las veinticuatro horas en la tisis tuberculosa.

La kavaína.

Nuevo alcaloide del kava por M. Lavalle, farmacéutico en Crest.

El sulfato de kavaíno es en cristales prismáticos poco deliquescentes. Es soluble en partes iguales de agua, poco soluble en el alcohol é insoluble en el éter.

Puede reemplazar el kava, pero ne tenemos aún indicaciones muy precisas sobre sus usos y sus efectos.

Imperialina.

Alcaloide extractado de los bulbos de la tritilaria (*Coronaria imperialis*).

Es un veneno cardíaco cuyo empleo no se conoce todavía bastante. Nos limitamos á registrarlo.

Teofilina.

Nueva base extractada del té y de igual composición que la téobromina, mas que difiere de ésta por sus caracteres y efectos.

De ésta también volveremos á hablar.

TERAPÉUTICA QUIRÚRJICA

Tratamiento de las otorreas crónicas por los vapores de yodoformo.

Después de las lociones desinfectantes por el conducto auditivo externo y la trompa y el completo enjugamiento de la caja, los vapores de yodoformo pueden servir para modificar el estado congestivo hiperplástico y secretorio de las membranas mucosas del tubo y del tímpano.

Es prudente introducir en el conducto auditivo, hasta el tímpano, un taponcito de algodón para cautivar, por dicerlo así, los vapores yodofórmicos en la trompa y la caja. En los catarros purulentos inveterados, la cantidad de vapores que hay que introducir podrán ser más considerables que de costumbre. En esta ocurrencia es cuando toda la canal recorrida por los vapores parece que se seque por retracción de los tejidos y absorción de las secreciones á medida que los vapores se adelantan y vuelven á parecer á la luz de la trompa y de la caja.

Este tratamiento no será exclusivo en las otorreas, él constituye un precioso auxiliar de los medios represivos (astringentes, cáusticos, instrumentales) y desinfectantes que empleamos todos los días. Permítaseme señalar de paso el efecto superior y muy notable que he sacado del salicilato de bismuto, que reemplazaba el ácido bórico, el calomelo, el yodol, como polvo insuflado en el conducto auditivo externo : su acción desecativa es tal, que muchas veces es bastante difícil desprenderlo de los tejidos con las inyecciones detersivas.

Los experimentos hechos sobre la acción de los vapores de yodoformo puestos en contacto por el conducto auditivo externo con las proliferaciones de la membrana mucosa en las evacuaciones de larga fecha no han dado ningún resultado satisfactorio. Amenazas de complicaciones inflamatorias de la oreja externa, han imposibilitado las aplicaciones yodofórmicas.

(*Revue de laryngologie.*)

FORMULARIO

Linimento contra la neuralgia.

Alcohol alcanforado	90 partes.
Éter	30 —
Tintura de opio	6 —
Cloroformo	20 —

M. — Aplíquese sobre una franela. (*Med. Rec. Pharm. Era.*)

Polvos contra la ozena.

(MEYER.)

Quina pulverizada	ââ 10 partes.
Mirra en polvo	
Carbón animal bien pulverizado	

M. — De tomarse por la nariz varias veces al día.

(*National Druggist.*)

Polvos laxativos.

(BEAUMETZ.)

Folículos de sen pasados al alcohol en polvo	ââ 6 gramos.
Asufre sublimado	
Hinojo en polvo	ââ 3 —
Anís estrellado en polvo	
Crémor tártaro pulverizado	2 —
Regalicia en polvo	8 —
Azúcar en polvo	25 —

M.

Se administra de noche al enfermo, entre las nueve y las diez, una cucharadita de estos polvos en medio vaso de agua.

Supositorios laxativos.

(DIETRICH.)

Glicerina	90 partes.
Jabón de estearina duro, dialisado	10 —
Agua	Q. S.

Se disuelve el jabón en agua caliente, se añade la glicerina; se filtra *caliente* (en un embudo de filtración caliente) y se evapora hasta reducción á 100 partes. La mezcla se vierte después en los moldes para supositorios.

Lavativa contra los oxiuros.

(J. CHÉRON.)

Aceite de hígado de bacalao	40 gramos.
Llema de huevo	Nº 1.
Agua	125 gramos.

Si esta lavativa queda sin efecto, ó si después de varias pruebas, el resultado no es absoluto, recurro á las lavativas con el solo aceite de hígado de bacalao, que hasta ahora me ha dado siempre buenos resultados.

Tratamiento de los vómitos rebeldes.

Tintura de yodo	XVI gotas.
Agua destilada	60 gramos.

M. S. — Tómese una cucharadita cada media hora.

Vómitos durante la preñez.

Elíxir opiáceo	XXX gotas.
Bromuro de potassium	1gr,8.
Agua	60 gramos.

En lavativa.

Vómitos en el cólera infantil.

Ácido fénico	XXIV gotas.
Alcohol	XXIV —
Agua de menta	45 gramos.
Mucilago de goma arabig	ââ XV gotas.
Jarabe de amapolas	

M. S. — Tómese por cucharaditas cada dos horas.

BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. N. L.

Diarrea crónica.

Chocolate en polvo puro.	ââ 227 gramos.
Flor de arroz.	
Azúcar en polvo.	
Tanino.	7gr,5.

Déjese hervir durante una media hora á lo menos; de tomarse por la mañana y la noche, durante la comida, una taza de las de para té. (*Med News.*)

Emulsión de yodoformo para inyeccionos en los abscesos fríos.

(Barker.)

Yodoformo cristalizado.	10 partes.
Glicerina.	70 —
Agua destilada caliente.	20 —

Tritúrese finamente el yodoformo mojado de algunas gotas de alcohol juntamente con la glicerina y añádase el agua.

(*D. Med. Ztung. Nouv. rem.*)

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

Nouvelles études sur la diphtérie, por el Dor Julio Simon, médico del hospital de los, Niños, caballero de la Legión de honor. — Librería Masson, 120, boulevard Saint-Germain.

Observation d'une épidémie de variole jugulée par la revaccination en masse, por el Dor Legard (del Havre), médico en jefe de aduanas. — Le Havre, 35, calle de Fontenelle.

Gerente : E. PIERRE.

Imp. D. Dumoulin y Cia, calle des Grands-Augustins, 5, Paris.

TERAPÉUTICA MÉDICA

Del tratamiento de la bronquitis capilar.

(Extractado de una lección clínica del Sor Dr Julio Simon.)

El tratamiento de la bronquitis capilar debe ser desde luego preventivo. Bien se sabe cuales son las muchísimas enfermedades durante cuyo desarrollo ó después de las cuales se declara la bronquitis capilar. Es preciso estar en guardia y procurar impedir su desarrollo empleando para ello los medios usuales.

Omitimos esta parte de la lección del ilustre clínico para acortar este artículo ya algo extenso como necesariamente suelen serlo las clínicas.

Después viene el tratamiento propiamente dicho :

« Vamos á considerar sucesivamente, dice M. Julio Simón, la conducta que se deberá observar al principio y durante el período de enfermedad confirmada. Cuando se verifica la invasión, se deberán combatir los desconciertos circulatorios, la elevación de la temperatura, la agitación siempre más ó menos grande. Es inútil decir que tan luego como se sospecha la existencia de una broncopneumonía es preciso acostar inmediatamente al niño; se le envolverán los miembros inferiores en algodón en rama, y tafetán engomado, manteniéndolo todo con una media larga; por la mañana y la noche se cambiará el algondon operando prontamente para evitar un enfriamiento que podría ser peligroso. Desde un principio se aplicarán delante y detrás del pecho anchos cataplasmas sinapizados, después, se administrará cada hora una cucharada de la poción siguiente :

Julepe gomoso.	100 gramos.
Alcoholatura de raíz de acónito .	XV gotas.
Acetato de amoníico.	1 gramo.
Jarabe de codeína	5 á 15 gramos.

Según la edad del niño.

« Si se aquieta la agitación, se irá aumentando progresivamente el intervalo de las dosis; en el caso contrario, se podrán acortar. Á veces, á pesar de todo, el empuje congestivo se hace temible, no se vacile en administrar entonces un baño sinapizado; se deja