

A partir du 23 avril, l'érysipèle est complètement guéri ; la mélancolie reste la même. Du 30 avril au 11 mai, le chiffre de l'urée tomba de 8^s,6 à 7^s,6 par jour, la température restant à 36°,4 (pouls à 76 et respiration à 13).

On voit chez cette femme, d'un côté, le parallélisme entre la production de l'urée et celle de la chaleur ; on y voit, d'un autre côté, que, de par l'autophagisme involontaire de l'état de fièvre, la production de l'urée était plus considérable que de par l'hétérophagisme de l'apyrexie : la fièvre avait forcé cet organisme de mélancolique à des échanges moléculaires qu'il refusait d'accomplir dans l'état d'apyrexie, et sous la seule influence de perturbations psychiques. Vous noterez, d'ailleurs, que, si la fièvre avait triomphé de l'inertie organique, elle n'avait pas vaincu l'inertie morale, la mélancolie ayant persisté pendant la durée de l'érysipèle : le physique seul avait été dompté.

En résumé, un certain degré de chaleur, 37 degrés dans l'aisselle en moyenne, étant l'expression même de la vie normale chez l'homme, une température plus basse sera l'expression d'une vitalité réduite au minimum et l'indice d'un grand péril actuel, ainsi que d'une mort probable et prochaine.

FIN DU TOME DEUXIÈME.

BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. N. L.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE.

- ABCÈS de l'anus et tuberculisation pulmonaire, 413.
 ACCOUCHEMENT forcé, ses indications et contre-indications en cas d'éclampsie, 685.
 ACÉTATE DE PLOMB contre les sueurs des phthisiques, 532.
 ACIDE CHLORHYDRIQUE contre les troubles digestifs des tuberculeux, 542.
 ACTE vénérien nuisible aux tuberculeux, 516 ; — physiologique transformé en — pathologique chez la femme enceinte, 600, 602.
 AFFECTIONS GÉNÉRALES aiguës prédisposant à la tuberculisation, 85.
 AGARIC contre les sueurs des phthisiques, 530.
 AGES où l'on se tuberculise, 120.
 AIR ruminé et tuberculisation, 59 ; — que doit respirer le tuberculeux, 490, 505 ; — marin, 513.
 ALBUMINURIE de la femme grosse, 619, 624 ; est de la sérumurie, 624 ; théorie de Küss, 674 ; théories contradictoires, 677.
 ALCOOL contre les vomissements de certains phthisiques, 546.
 ALCOOLISME et tuberculisation, 92 ; — et ses lésions multiples, 101.
 ALGER, station d'hiver, 500.
 ALIMENTATION des tuberculeux, 507.
 ALLAITEMENT et tuberculisation, 133.
 AMMONIÈME chez la femme grosse, 628.
 ANDRAL ET GAVARRET, leur analyse du sang des femmes enceintes, 632.
 ANÉMIE cérébrale et sommeil, 325 ; — des femmes enceintes, conséquences de cette doctrine, 629, 631 ; — par qualité, pléthore par quantité, 631, 644.
 ANOREXIE hystérique et tuberculisation, 37.
 ANTAGONISME, 88 ; — apparent du cancer et du tubercule, 192.
 ANTHRAX et diabète, 800, 803.
 ANUS. (Voir *Abcès* et *Fistule*.)
 APOPLEXIE pulmonaire par le fait de l'attaque d'éclampsie, 662.
 ARSENIC dans la tuberculose, 682.
 ASPHYXIE, le rôle qu'elle joue dans l'élévation de la température, 813, 815, 817.
 ASTHME et tuberculisation, 57.
 ATAXIE LOCOMOTRICE et tuberculisation, 83.
 ATROPINE contre les sueurs des phthisiques, 532.
 AUTOTYPHISATION, 628 ; — de la femme enceinte, 712.
 AVENBRUGGER, médecin de Vienne, inventeur de la percussion, 2.
 BALSAMIQUES contre l'expectoration des tuberculeux, 554.
 BASSÈSSE organique et tuberculisation, 164 ; — histologique et tuberculisation, 166 ; — fonctionnelle et tuberculisation, 168.
 BELLADONE contre la toux des tuberculeux, 537.
 BERNARD (Claude), ses recherches sur les températures, 817, 827, 829.
 BILE, ce que produit sa présence dans la peau, 797.
 BISMUTH contre les troubles digestifs des tuberculeux, 545.
 BRIQUET et MIGNOT, leur traité du choléra-morbus, 821.
 BRODIE, ses recherches sur l'influence du système nerveux sur la production de la chaleur animale, 829.
 BRONCHITE et tuberculisation, 53.
 CANCER et tuberculisation, 29.
 CATAPLASME, manière de le fabriquer, 602.
 CATARACTE, sa pathogénie, 798.
 CAUTÈRE, révulsif énergique chez le tuberculeux, 580.
 CAUTÉRISATION PONCTUÉE, excellent moyen de révulsion chez le tuberculeux, 580.
 CAVERNE tuberculeuse, 360 ; — et hyperthermie locale, 465.
 CÉPHALALGIE, symptôme prémonitoire de l'éclampsie, 636.
 CERVEAU, il s'anémie par le sommeil, 326 ; —, hyperémie fonctionnelle prédispose à l'hyperémie pathologique, 697.
 CHALEUR excessive, nuisible aux tuberculeux, 497.
 CHAMBRES à coucher, 58, 504.

- CHARPENTIER, résultat de ses opérations obstétricales, 779.
- CHAUVEAU (de Lyon), ses expériences sur la contagion de la phthisie par le tube digestif, 238.
- CHLORAL contre l'éclampsie, 654.
- CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX dans le traitement des tuberculeux, 586.
- CHLOROFORME contre l'éclampsie, 654.
- CHLOROSE, le thermomètre permet de la diagnostiquer d'avec la tuberculose commençante, 476.
- CHOLÉRA, modification de la température dans cette maladie, 821.
- CHOMEL et la métrite puerpérale, 609.
- CHOSSAT, expériences sur la température des animaux soumis à l'inanition, 839.
- CIRRHOSE et tuberculisation, 400.
- CLIMATS (Les) chauds peuvent être nuisibles aux tuberculeux, 497; — (les) froids peuvent être supportés par les tuberculeux, 496, 500; — d'hiver relatifs, c'est ce qu'il faut aux tuberculeux, 503; — salutaires aux tuberculeux, 490, 503.
- CONGESTION (La) chez les tuberculeux, c'est l'ennemi, 573; — pulmonaire par suite de l'attaque d'éclampsie, 662.
- CONTAGION de la fièvre puerpérale par le lit, 743, 763; — (faits de) pendant la grossesse, 764; pendant la menstruation, 765; en dehors de la menstruation, 765; — par l'accoucheur, 766.
- COQUELUCHE et tuberculisation, 87.
- CORVISART, dénaturant l'invention d'Avenbrugger, 2.
- CRACHATS nummulaires, dans la tuberculose et dans la rougeole, 359; — des tuberculeux, 552; leur traitement, 543.
- CRAQUEMENT pulmonaire, dû à la congestion périphérique, 297.
- CRÉATINÉMIE chez la femme grosse, 629.
- CRÉOSOTE contre l'expectoration des tuberculeux, 654.
- CRUVEILHIER appliquait des sangsues aux tuberculeux, 574.
- CURES de lait dans le traitement de la tuberculose, 567; — de petit-lait, 568; — de koumys, 569.
- DAVOS, station suisse, ses avantages, 493, 494; ses indications, 495.
- DÉLIRE dans la phthisie aiguë, 382; — dans l'éclampsie de la grossesse, 660; — conséquence de la typhisation urinémiq.ue, 761; — nocturne dans la manie puerpérale, 701.
- DÉMENCE et phthisie, 141.
- DÉRIVATION exercée sur la fluxion utérine par la fluxion mammaire après l'accouchement, 601.
- DIABÈTE et tuberculisation, 167, 759; — et glycosurie, 809.
- DIABÉTIQUES gras et diabétiques maigres, 109.
- DIARRHÉE des tuberculeux, ses différentes formes, son traitement, 549; — colliquative, 551; — sa signification pathogénique dans la fièvre puerpérale à forme typhoïde, 742.
- DIATHÈSES (Les) prédisposent à la tuberculisation, 148, 209; — phlogoso-gangréneuse, 803.
- DIÈTE (La) lactée dans la sérumurie éclampitigène, 853.
- DIGITALE, n'est pas utile chez les tuberculeux, 590.
- DOULEUR ÉPIGASTRIQUE, précédant l'attaque d'éclampsie, 637.
- DUBUISSON, expériences démontrant l'innocuité de l'ingestion des matières tuberculeuses, 239.
- DYSPEPSIE et tuberculisation, 38, 312.
- DYSPNÉE précédant l'attaque d'éclampsie, 637.
- EAUX SULFUREUSES contre l'expectoration des tuberculeux, leur mode d'action, 555; leur danger possible dans la tuberculisation pulmonaire, 557, 551.
- ECLAMPSE de la grossesse, 611; — et la saignée, 611; — de la scarlatine et saignée, 614; — et albuminurie, 619; pourquoi elle est plus fréquente depuis quelques années, 620, 629; ses symptômes prémonitoires, 635; sa pathogénie, 638; ses causes classiques, 638; sa prophylaxie, 643.
- ELIXIR alimentaire, 584.
- EMACIATION et refroidissement, 839.
- EMPHYSÈME et tuberculisation, 57.
- EMPIS (Expérience d') sur l'inoculation de la tuberculose, 224.
- EMPYÈME et tuberculisation, 48.
- ENFANTS (Les) de diathésiques et la tuberculisation, 150.
- ÉPIDÉMIE puerpérale de 1875 à l'hôpital Saint-Antoine, 755; — de 1876, au même hôpital, 758; — de 1879, à la Pitié, 784.
- ÉPIDIDYMITIS tuberculeuse, 148.
- EPILEPSIE et phthisie, 141.
- EPISTAXIS des tuberculeux par fluxion hémorragique de la muqueuse pituitaire, 11.
- EQUITATION (Avantages de l') chez les tuberculeux, 512.

- de la tuberculisation pulmonaire, 591, 597.
- FOX (Wilson), ses expériences sur l'inoculation de la tuberculose, 224.
- FOYERS morbides locaux thermogènes, 455.
- FURONCLE chez les diabétiques, 802.
- GANGRÈNE diabétique, 794-800; — locale, ce qu'elle suppose, 794.
- GASTRALGIE au début de la tuberculose, 312.
- GLAUCOME hémorragique causé par la grossesse, 671.
- GLYCOSURIE et GLYCOHÉMIE, 798.
- GRANULATION et hyperémie ambiante, 295.
- GRIPPE et tuberculisation, 87.
- GROSSESSE et tuberculisation, 128, 516, 597.
- GUÉRISON possible du tubercule et du tuberculeux, 105.
- HÉMATOPOÏÈSE, fonction suprême de l'animalité, 15.
- HÉMATOSE (L') chez les mélancoliques, 142.
- HÉMOPTYSIE tuberculeuse et — cardiaque, leur diagnostic différentiel, 202; — (l') n'engendre pas la tuberculose, 247, 263; — cause d'hyperthermie locale par suite du mouvement fluxionnaire hémorragique, 453; — parfois crise salutaire d'une hyperémie périphérique, 537; — son traitement, 565; — chez la femme enceinte, 600; — post-puerpérale, 680.
- HÉMORRHAGIE, symptôme du typhus et en particulier du typhus urinémiq.ue, 657; — cérébrale et — méningée, accidents possibles de l'attaque d'éclampsie, 660; — utérine, son traitement, 772.
- HÉRÉDITÉ tuberculeuse, 158.
- HÉTÉROTYPHISATION de la femme en couche par le voisinage d'autres femmes en couche, 712.
- HUILE DE FOIE DE MORUE dans le traitement de la tuberculose, 570.
- HYDATIDES du poumon et tuberculisation, 46.
- HYDROTHERAPIE chez les tuberculeux, 518; ses modes d'application, 519; son action, 520.
- HYGIÈNE des tuberculeux, 484.
- HYPERÉMIE trophique tuberculeuse, 476; — rayonnante, 476.
- HYPERTHERMIE GÉNÉRALE plus grande dans la tuberculisation caséuse que dans la tuberculisation bronchitique, 464; — et asphyxie, 813.
- ERGOT DE SEIGLE en injections hypodermiques, contre les hémorragies utérines puerpérales, 773.
- ERUPTIONS, influence de la pesanteur sur leur production et leur nature, 804.
- ERYSIPÈLE phlegmoneux chez les diabétiques, 802.
- ERYTHÈME chez les diabétiques, 805.
- ÉTOUFFEMENTS chez la femme enceinte, 621.
- ÉVOLUTION (L') tuberculeuse [et ses signes, 358.
- EXERCICE modéré, salutaire aux tuberculeux, 510; — de la rame, 512; — à cheval, 512.
- EXPECTORATION des tuberculeux, son traitement, 553.
- EXTRAIT DE VIANDE de Liebig, 584.
- FATIGUE cérébrale, par accumulation des produits de désintégration du cerveau, 326, 382.
- FIÈVRE, son importance dans la tuberculose, 244, 246; elle influence la forme de la tuberculisation, 90, 275; — typhoïde et tuberculisation, 88; — glyco-furonculeuse, 803.
- FIÈVRE PUERPÉRALE, 712; — elle est essentiellement pyogénique, 713, 720; — à forme typhoïde, 741; — ce n'est pas l'infection purulente, 749; ses formes anatomiques, 753; ses rapports avec la constitution médicale contemporaine, 753; épidémie de 1875 à Saint-Antoine, 725; épidémie de 1876 au même hôpital, 758; épidémie de 1884 à la Maternité de Paris, 753; — des nouveau-nés, 761; transmission possible de la — à la femme enceinte non en état puerpéral, 764; transmission en dehors même de la grossesse, mais à l'époque menstruelle, 765; transmission possible en dehors même de la menstruation, 765.
- FISTULE A L'ANUS et tuberculisation pulmonaire, 415; c'est l'expression d'un mauvais état général, 418; la — ne doit pas être supprimée sans précaution, 421.
- FLEURY, ses travaux sur l'hydrothérapie chez les tuberculeux, 519.
- FLUXION utérine et mammaire, 601; — sécrétoire et — pathologique, 601.
- FOIE chez la femme enceinte, 623.
- FOLIE maniaque et phthisie, 141.
- FONSSAGRIVES, sa thérapeutique de la phthisie, 514, 515, 575, 598.
- FORME hyperémique sans fièvre de la tuberculose, 281; — hémorragique, 281; — traitable et — intraitable

HYPERTHERMIE LOCALE au sommet de la poitrine, indice d'un foyer tuberculeux, 432; sa disparité pour les deux sommets est un signe très probant d'une lésion locale, 441; — dans la pneumonie caséuse, 459; — dans les cas de caverne tuberculeuse, 465; — dans le cas d'hydropneumothorax, 465; — dans la phthisie aiguë, 473.

HYPOPHOSPHITES (Les) dans le traitement des tuberculeux, 586.

HYPOSULFITE DE CHAUX, sa valeur dans le traitement des tuberculeux, 585.

ICTÈRE des femmes enceintes, par congestion du foie, 623; pathogénie des démangeaisons, des taches rouges et de l'œdème de la peau qu'il entraîne, 797.

IDIOTIE et phthisie, 141.

INFANTILISME tuberculeux, 152.

INFECTION et contagion, 763.

INFECTION PURULENTE et fièvre pyogénique, 749; — des accouchées, 741.

INFILTRATION TUBERCULEUSE fébrile et hyperthermie locale, 459.

INFLAMMATION, diffère essentiellement de la tuberculisation, 182.

IPÉCACUANHA contre l'hémoptysie des tuberculeux, 565; — contre la congestion pulmonaire, 590.

KERMÈS dans la tuberculisation infiltrée ou pneumonie caséuse, 596.

KOUMYS dans le traitement de la tuberculose, 569.

KUSS, sa théorie de l'albuminurie, 674.

LAENNEC et l'investigation physique des organes, 1.

LAIT dans le traitement de la tuberculose, 558.

LATITUDE et altitude des climats d'hiver, 488.

LAUDANUM contre les vomissements des tuberculeux, 543.

LEBERT, ses expériences sur l'inoculation de la tuberculose, 223; ses recherches sur les variations de la température organique dans le cours de la tuberculose, 479.

LEUCOCYTOSE physiologique de la grossesse, 608, 609; —, ses conséquences, 720.

LIMAÇONS, leurs propriétés nutritives, 584.

LOTIONS froides chez les tuberculeux, 519; — vinaigrées contre les sueurs des tuberculeux, 533.

LYMPHANGITE utérine suppurée et péritonite purulente, 717.

LYPÉMANIE et tuberculisation, 140.

MALADIE (La) chronique devient une fonction morbide, 422.

MALADIE DE BRIGHT par congestion rénale gravidique, 663.

MALADIES DU CŒUR (Les) et la tuberculisation, 57; les — s'opposent à l'invasion tuberculeuse ou la retardent en forçant les sommets pulmonaires à fonctionner, 195; cette immunité n'a rien d'absolu, 196; coexistence des — et de la tuberculose, 196, 197.

MANIE puerpérale, comment elle survient, 696; pourquoi elle est de nature triste, 699; — terminale de certains phthisiques, 403; sa pathogénie, 410.

MARCHAL (de Calvi), le premier qui ait rattaché à la glycosurie certains cas de sphacèle cutané, 797.

MATERNITÉS, leurs méfaits, 774, 792; — de l'hôpital Lariboisière, de 1854 à 1878, 781; — de l'hôpital Saint-Antoine, 755, 758; — de la Pitié, 784.

MÉLALGIE des phthisiques, 397; — et lésions médullaires, 400.

MÉTRITE tuberculeuse, 187; — puerpérale, 608; — post-puerpérale, 609; — puerpérale avec symptômes typhoïdes, 748.

MÉTRO-PÉRITONITE puerpérale, 608, 609.

METZQUER, expériences démontrant la non-inoculabilité de la tuberculose, 225.

MORPHINE contre les troubles fonctionnels du pneumogastrique stomacal, 342; — contre la toux, 342, 537; — contre les palpitations des tuberculeux, 343; — contre la douleur de la péritonite puerpérale, 770.

MORT (Comment un) peut momentanément présenter plus de chaleur qu'un vivant, 825.

MORTS partielles avant la mort générale, 826.

MUQUEUSE de l'utérus, sa structure, sa tuberculisation, 186.

NÉURALGIE sciatique chez les phthisiques, 394.

NÉVROSES, températures insensées auxquelles elles peuvent arriver au moment de la mort, 812, 814.

NITRATE d'argent contre la diarrhée des tuberculeux, 531.

OPHTHALMOSCOPE, ce qu'il montre dans l'éclampsie gravidique, 636.

OPIUM contre la toux des tuberculeux, 537.

PALPITATIONS par intolérance du pneumogastrique, au début de la tuberculose, 311, 328.

PARALLÉLISME (Le) n'existe pas entre la lésion pathologique et l'altération de l'organisme, 4.

PARALYSIE générale et phthisie, 141; — terminale chez les phthisiques, 386; — localisées chez les phthisiques, 390.

PASSIONS tristes et tuberculisation, 137.

PEAU, nécessité de son fonctionnement chez le tuberculeux, 517; ses altérations dans le diabète, 795.

PERCUSSION, ses règles et son importance au début de la tuberculose, 308; — dans la phthisie chronique, 358.

PÉRICARDITE avec douleur et dyspnée, 345.

PÉRITONITE tuberculeuse, 116; — puerpérale par propagation, 608; — purulente puerpérale, 716.

PETIT-LAIT dans le traitement de la tuberculose, 568.

PHLÉBITE utérine chez la femme en couche, 720.

PHLEGMON diffus chez les diabétiques, 802.

PHRÉNIQUE douloureux dans la tuberculose, 331.

PHTHISIE, c'est le résultat général de la tuberculisation, 13; — des aiguiseurs, 55; — des remouleurs, 55; — des tailleurs de meules, 55; — elle n'est pas contagieuse du mari à la femme, 205; elle n'est pas contagieuse du fœtus à la mère, 212; — (la) *ab hæmoptoe* n'existe pas, 248; — (la) ne succède pas à l'inflammation, 266; — son unité, 272; — galopante, 363, 597; — de la cinquantaine, 120, 381, 390, 488.

PHTHISIE AIGUE, 14; ses trois formes cliniques, 371; — simulant la dothiéntérie, 372; — hémoptysique, 380; —, impuissance du traitement, 597.

PHTHISIE CHRONIQUE, 14; ses signes physiques, 357; — son traitement, 594; — fébrile continue, 365, 597.

PINOUX nie la contagion de la phthisie, 208.

PLÉTHORE quantitative de la femme enceinte, 633; — séreuse, 634, 670; — pulmonaire gravidique, 685.

PLEURÉSIE diaphragmatique, prise

pour une pneumonie caséuse, 346; — diaphragmatique suppurée, 610; — diaphragmatique puerpérale, 716, 746; — pseudo-caverneuse, 351; — au début de la tuberculose, 365.

PNEUMOGASTRIQUE stomacal, son excitation chez le tuberculeux entraîne la toux et le vomissement, 323; — comprimé par des ganglions altérés, 333, 338; — enflammé, 333; rôle du — dans l'éclampsie gravidique, 615.

PNEUMONIE CASÉUSE, 183, 346, 350, 353; — et hyperthermie locale, 459; son traitement, 595.

POLYÉMIE, sa coexistence possible avec l'hypoglobulie, 679.

POULS chez les mélancoliques, 142; — hémorrhagique, 201; — veineux du dos de la main dans certains cas de phthisie pulmonaire, 424; ses conditions, son mécanisme, 426; son pronostic, 430.

POUMON, organe pauvre de texture et de fonctions, prédisposé à la tuberculisation, 167; chez la femme enceinte, 622; plus chaud chez la femme enceinte, 685; —, organe indirect de calorification et agent direct de réfrigération, 832.

PRURIGO pédiculaire et — diabétique, leur diagnostic différentiel, 801.

PRURIT vulvaire chez les diabétiques, 806; — préputial chez les diabétiques, 808.

PUERPÉRALITÉ (La) crée la pléthore quantitative, 738.

PUERPÉRISME (Le) crée la tendance pyogénique, 739.

RACHITISME (Le) prédispose à l'éclampsie, comment, 643.

REFROIDISSEMENT physique et survie possible, 814; — extrinsèque ou par rayonnement et — intrinsèque ou spontané, 833; — par l' inanition, 839.

REIN, sa congestion gravidique, 624.

RESPIRATION chez les mélancoliques, 142; — saccadée, premier indice dénonciateur des granulations, 298; — supplémentaire, ne pas la confondre avec du souffle, 361.

RÉTRÉCISSEMENT DE L'ŒSOPHAGE et tuberculisation pulmonaire, 16; — de l'artère pulmonaire et tuberculisation, 56.

RÉVULSION locale contre l'hyperthermie locale, 474; — par les sangsues, 574; les ventouses scarifiées, 575; les ventouses sèches, 575; le vésicatoire volant, 576; la teinture

d'iode, 578; le cautère, 579; la cautérisation ponctuée, 580.
 RHUMATISME articulaire chronique et tuberculisation, 82.
 ROGER (H.) nie la contagion de la phthisie, 209.
 ROUGEOLE et tuberculisation, 86.
 SAIGNÉE préventive de l'utérus par le fait de l'accouchement, 600; —, traitement préventif de l'éclampsie, 644, 646; — traitement curatif de l'éclampsie, 647; comment elle agit, 651.
 SAINT-MORITZ, station suisse, ses indications dans la tuberculose, 496.
 SALACITÉ des phthisiques, exceptionnelle, mais réelle chez quelques-uns, 207, 516.
 SALICYLATE de soude dans le traitement de la tuberculose, 587.
 SANG épanché dans les poumons, son innocuité, expériences de l'auteur, 257; le — se rafraîchit en passant dans les poumons, 817; il s'échauffe par l'asphyxie, 820.
 SANGSUES dans la péritonite puerpérale, 770; —, moyen de révulsion contre le poumon tuberculeux, 574.
 SCARLATINE et tuberculisation, 89.
 SCROFULE des jeunes soldats, 70.
 SÉDENTARITÉ forcée et tuberculisation, 81.
 SENSATIONS morbides transformées, prétexte à l'explosion de la folie chez les phthisiques, 405.
 SENSIBILITÉ de la poitrine au début de la tuberculose, 310.
 SÉRUMURIE par congestion gravidique du rein, 624; — par la compression des veines rénales, douteuse, 639; ses causes véritables, 619; sa fréquence, 640; théorie générale, 663.
 SIREDEY, moyens préventifs des épidémies puerpérales employés par ce médecin, 783.
 SITIOPHOBIE ou haine des aliments chez les phthisiques, 408.
 SKODA, deux erreurs de pronostic, 9, 10.
 SOMMETS PULMONAIRES, partie la moins fonctionnante du poumon et se tuberculisant la première, 168; — partie accessoire ou de renfort, 172.
 SOUFFLE tubaire, 358; — caverneux, 361.
 SUCRE dans la peau, les altérations qu'il entraîne, 798.
 SUEURS des phthisiques, 362; — du sommeil ou mieux du réveil, 362, 526; leur pathogénie, 528; leur

traitement, 530; — colliquatives, 526; — de la fièvre, 527, 528; — profuses des moribonds, 825.
 SYSTÈME NERVEUX, son influence sur la production des températures élevées, 828.

TABAC, ses inconvénients chez les tuberculeux, 516.

TANNIN contre les sueurs des phthisiques, 532.

TARTRE STIBÉ, ses indications dans le traitement des tuberculeux, 547.

TEINTURE AMÈRE de Baumé contre la dyspepsie des tuberculeux, 548; — d'iode, excellent moyen révulsif contre le poumon tuberculeux, 578.

TEMPÉRATURE dans la mélancolie, 143; — morbide locale des foyers tuberculeux, 433; — morbide générale dans la tuberculose miliaire aiguë et dans la phthisie confirmée, 479; — que doit avoir la chambre des phthisiques, 504; — intra-utérine avant l'accouchement, 728; — pendant le travail et après l'accouchement, 725; — après l'accouchement et avec accidents morbides, 731; la — axillaire augmente plus que la — utérine au début des accidents puerpéraux; conséquences de ce fait, 737; — excessive dans les maladies, 811; — (la) s'élève au début de l'agonie des maladies aiguës, 813; elle s'élève d'autant plus que l'individu meurt mieux portant, 813, 832; — *ante et post mortem* dans les névroses, 812, 814; excessive dans le tétanos, 815; — dans la rage, 816; — basse excessive, 833; — basse du sclérome, 842; du choléra, 844; de la convalescence, 841; des affections chroniques, 848; de l'urinémié, 850; de la lypémanie, 854; des vastes brûlures, 848.

TESSIER, diabétique, puis tuberculeux, 110.

TÉTANOS, températures excessives dans cette maladie, 815.

TOLÉRANCE de l'organe et — de l'organisme, 5.

TOUX des tuberculeux, 536; son traitement, 537; — gastrique, 540.

TRAITEMENT des tuberculeux, 483, 526; — du poumon tuberculeux, 573; — des accidents puerpéraux, 769.

TRAVAIL UTÉRIN; il élève la température intra-utérine, 729.

TUBERCULES, leur action mécanique, 5; leur action dynamique, 5; — pro-

duit et témoignage d'une déchéance de l'organisme, 13; — spontanés, différents des tubercules inoculés, 220; — (les) inoculés ne sont probablement que des infarctus, 221; ils engendrent des lésions locales, non une maladie générale qui fait mourir, 224.

TUBERCULEUX qui ne sont pas phthisiques, 7.

TUBERCULISATION pulmonaire et phthisie, 3; c'est le mode d'évolution du tubercule, 13; — accidentelle ou acquise, 15; — constitutionnelle ou héréditaire, 15; — par inanition, 16; — par lésion des voies digestives, 16; — par rétrécissement de l'œsophage, 16; — par maladies de l'estomac, 30; — par diarrhées chroniques, 41; — par alimentation aérienne insuffisante dans la pleurésie chronique, 44; — consécutive à l'empyème, 47; aux bronchites, 53; — par la vie civilisée, 58; les pensions, 66; les casernes, 70; les ateliers, 72; — les bureaux, 77; la vie urbaine, 79; les maladies générales aiguës, 85; l'alcoolisme, 93; — des organes génitaux de l'homme, 177, 179; processus absolument différent de l'inflammation, 182; — des organes génitaux de la femme, 183; — génitale chez la femme et — pulmonaire, 189; quels organes elle affecte, 181; quels éléments histologiques, 183; ne s'observe pas dans les muscles, organes très actifs, et spécialement dans le cœur, le plus fonctionnant d'entre eux, 194; — à forme hyperémique, 243; — à forme hémoptysique, fébrile ou apyrétique, 243, 295; forme très lente par tolérance de l'organe et par tolérance de l'organisme, 283, 284; forme lente par intolérance de l'organe et tolérance de l'organisme, 283; forme rapide par intolérance de l'organe et intolérance de l'organisme, 275; forme hyperémique sans fièvre, 284; son traitement, 591.

TYPHISATION CHOLÉMIQUE chez la femme enceinte, 623, 656; — urinémié chez la femme enceinte, 623, 627, 629, 656.

TYPHUS PUERPÉRAL PYOGÉNIQUE ou

fièvre puerpérale, 712; — causé par l'encombrement, 738, 740.

ULCÈRE DE L'ESTOMAC et tuberculisation, 35.

URÉE chez les mélancoliques, 144.

URINE chez les mélancoliques, 144; utilité de l'examen de l' — chez toute femme grosse, 669.

URINÉMIE puerpérale, 624.

UTÉRUS, le cancer envahit le col, le tubercule envahit le corps de l'organe, 185; — hyperémie fonctionnelle pendant la grossesse, 600; — divisé en deux parties distinctes, corps et col, 626.

VARIOLE et tuberculisation, 89.

VENTOUSES scarifiées, moyen de révulsion contre le poumon tuberculeux, 574; contre la péritonite puerpérale, 770.

VÉSICATOIRE, c'est le révulsif par excellence contre le poumon tuberculeux, 576; — dans la péritonite puerpérale, 771.

VÊTEMENTS du tuberculeux, 507.

VIE de pension et tuberculisation, 68; — de caserne et tuberculisation, 70; — de bureau et tuberculisation, 78; peut être longue chez les tuberculeux, 314, 486; — en plein air, prophylactique de la tuberculose, 485; — agreste, 487.

VIELLÉSSE et tuberculisation, 113, 122.

VILLAGEOIS à la ville et tuberculisation, 80.

VILLEMEN, ses expériences sur l'inoculation de la tuberculose, 212.

VIN toni-nutritif de Bugeaud, 585; — de quinquina, 585.

VOMISSEMENTS chez les tuberculeux, 540; — précédant l'attaque d'éclampsie, 638; — leur valeur pronostique dans la fièvre puerpérale à forme pyohémique, 741.

VOYAGES EN MER dans le traitement des tuberculeux, 513.

VUE, ses troubles précèdent ordinairement l'attaque d'éclampsie, 636.

WUNDERLICH, ses recherches sur la température générale dans la tuberculose, 479; —, 812.



1030000344

