

A este jarabe se pueden añadir las preparaciones ferruginosas, mercuriales ó ioduradas á dosis convenientes.

JARABES DE PORTAL, DE LARREY, DE COCINERO, DE BOUCHARDAT.

*Jarabe antiestrumoso.* (Puche.)

Iodo cristalino.....	1 gram.	Ioduro de potasio.....	20 gram.
Tanino del codex.....	10 gram.	Jarabe de genciana.....	469 gram.

Dos ó tres cucharadas por día.

*Jarabe de iodidargirato de potasio.*

Bi-ioduro de mercurio.....	15 centíg.	Ioduro de potasio.....	10 gram.
Jarabe de goma.....	500 gram.		

Dos cucharadas por día en los accidentes de transición.

*Jarabe de ioduro de potasa ferruginoso.* (Puche.)

Ioduro de potasio.....	10 gram.	Agua de canela.....	20 gram.
Tartrato férrico potásico....	10 gram.	Jarabe simple.....	480 gram.

De 25 á 100 gramos en medio litro de agua fría: en tres veces durante el día.

*Jarabe iodurado.* (Ricord.)

Jarabe de zarzaparrilla....	500 gram.	Ioduro de potasio.....	16 gram.
-----------------------------	-----------	------------------------	----------

De tres á seis cucharadas por día.

(Accidentes terciarios de la sífilis y período prodrómico de los accidentes secundarios.)

*Jarabe de ioduro de amonio.*

Ioduro de amonio.....	25 centíg.	Jarabe de goma.....	100 gram.
-----------------------	------------	---------------------	-----------

Empleado por Gamberini y Galligo como sucedáneo del ioduro de potasio.

*Poción de clorato de potasa.*

Agua destilada.....	150 gram.	Clorato de potasa.....	4 á 6 gram.
Jarabe de limon.....	50 gram.		

(Estomatitis mercurial.)

*Píldoras de proto-ioduro de mercurio.* (Ricord.)

Proto-ioduro de mercurio.	} aa 3 gram.	Estracto tebáico.....	1 gram.
Tridacio.....		Estracto de cicuta.....	6 gram.

H. s. a. 60 píldoras. De una á tres por día.

Algunas veces se reemplaza el extracto de cicuta por seis gramos de conserva de rosas.

Estas píldoras deben administrarse durante el período secundario de la sífilis.

*Píldoras de Dupuytren.*

Sublimado corrosivo.....	40 centíg.	Estracto de cicuta.....	6 gram.
Estracto de opio.....	50 centíg.		

H. 40 píldoras. De una á tres por día.

*Píldoras de deuto-ioduro de mercurio.* (Magendie.)

Deuto-ioduro de mercurio.	5 centíg.	Polvos de regaliz.....	C. S.
Estracto de enebro.....	50 centíg.		

H. 8 píldoras. Dos por la mañana y dos por la tarde, y después cuatro por la mañana y cuatro por la tarde.

*Píldoras de ioduro de potasio.*

Ioduro de potasio.....	} aa partes iguales.
Estracto de nogal.....	

H. píldoras de 20 centigramos. De cinco á doce por día.

*Píldoras de estagnato de oro.* (Puche.)

Estagnato de oro.....	50 centíg.	Goma arábiga.....	1 gram.
Almidon.....	5 gram.	Agua destilada.....	C. S.

H. 50 píldoras. De dos á cuatro por día.

*Píldoras de cloruro de oro.* (Chrestien.)

Cloruro de oro y de sódio.	25 centíg.	Mucílago de goma tragacanto.	C. S.
Azúcar.....	30 gram.		

H. 60 píldoras. Dos al día.

*Píldoras de amalgama de oro y de mercurio.*

Amalgama de oro y de mercurio.....	60 centíg.	Conserva de rosas.....	30 centíg.
Tridáceo.....	20 centíg.	Polvo de regaliz ó de goma...	C. S.

H. 10 píldoras. Una, dos y tres al día.

Cada píldora contiene 6 centigramos de amalgama y la amalgama está compuesta de 5 centigramos de mercurio y 1 de oro.

Estas píldoras han sido administradas por Ricord con mucho éxito y á dosis muy elevadas, sin provocar la salivación. La fórmula difería, pero la dosis de la amalgama era la misma en cada píldora.

## SOLUCIONES.

*Licor de Van Swieten.*

Bicloruro de mercurio....	1 gram.	Alcohol.....	100 gram.
Agua pura.....	900 gram.		

Primero se disuelve el bicloruro en el alcohol y en seguida se añade el agua destilada. Una cucharada en la tisana.

*Licor mercurial normal. (Mialhé.)*

Agua destilada.....	500 gram.	Clara de huevo.....	n.º 1
Sal comun.....	} aa 1 gram.	Sublimado corrosivo....	30 centig.
Sal amoniaco.....			

La clara de huevo se bate en el agua destilada, se filtra y en seguida se disuelven los tres compuestos salinos en el agua albuminosa y se filtra de nuevo.

Dos ó tres cucharadas por día en un vaso de agua azucarada.

*Solucion de iodidrarigato de potasa. (Puche.)*

Bi-ioduro de mercurio....	50 centig.	Alcoholato de azafran...	20 gram.
Ioduro de potasio.....	50 centig.	Agua destilada.....	279 gram.

De 25 á 100 gramos por día en la tisana.

*Solucion de deuto-ioduro de mercurio. (Lagneau.)*

Deuto ó proto-ioduro de mercurio.	1 gram.	Alcohol de 36°....	45 gram.
-----------------------------------	---------	--------------------	----------

Diez á veinte gotas por día en agua azucarada.

*Solucion simple de ioduro de potasio.*

Agua destilada.....	500 gram.	Ioduro de potasio.....	20 gram.
---------------------	-----------	------------------------	----------

De una á tres cucharadas por día.

*Zarzaparrilla iodurada.*

Tisana de zarzaparrilla..	500 gram.	Ioduro de potasio.....	1 gram.
---------------------------	-----------	------------------------	---------

Para tomar en el día. Se aumenta gradualmente la dosis hasta 3 á 4 gramos, y mas si el caso lo exige.

*Pomadas.*—Pocas veces las empleamos. Las que usamos mas son, los unguentos mercuriales doble y simple, cuando queremos obtener la salvacion por fricciones, ó cuando queremos obrar sobre un tumor ganglionar. Muchas veces curamos tambien el chancro indurado con

la pomada de calomel. Por otra parte hé aquí las que empleamos con mas frecuencia:

*Pomada de calomel.*

Calomel al vapor... 1 á 4 gram. | Cerato ó pomada de cohombro. 30 gram.

Para curar el chancro indurado y ciertas ulceraciones secundarias, cuya base es dura.

*Pomada de proto-ioduro hidrargirico.*

Proto-ioduro hidrargirico... 1 gram. | Grasa..... 30 gram.

*Pomada de turbit mineral. (Ricord.)*

Turbit mineral..... 1 gram. | Grasa..... 20 gram.

(Sifilides secas y crónicas.)

*Pomada de Brea.*

Brea purificada..... 4 gram. | Grasa..... 30 gram.

(Sifilides escamosas.)

*Pomada de estearato de hierro. (Braille.)*

Estearato de hierro..... 40 gram. | Aceite esencial..... 5 partes.

(Chancros fagedénicos.)

*Otra.*

Estracto de ratania..... 4 gram. | Estracto tebáico..... 2 á 4 gram.  
Alcanfor..... 1 gram. | Grasa..... 30 gram.

*Esparadrapo de estearato de hierro.*

Jabon de Marsella..... 2 partes. | Sulfato de protóxido de hierro. 1 parte.

(Ulceraciones fagedénicas.)

*Gargarismos y colutorios.*—Solo mencionaremos los gargarismos emolientes de agua de adormideras, de malvavisco, de cebada perlada y de lechuga.

*Gargarismo opiado.*

Agua de lechuga..... 200 gram. | Estracto tebáico..... 50 centig.

(Estomatitis y ulceraciones dolorosas.)

*Gargarismo antisifilítico.* (Ricord.)

Cocimiento de cicuta y de  
yerba mora..... 250 gram. | Deuto cloruro de mercurio. 10 centig.

(Accidentes de la boca y de las fauces.)

*Gargarismo iodado.* (Ricord.)

Agua destilada..... 200 gram. | Tintura de iodo..... 2 á 4 gram.  
Ioduro de potasio..... 50 gram.

(Accidentes terciarios de la boca y de la garganta.)

*Gargarismo astringente.*

Agua de lechuga..... 200 gram. | Alumbre..... 5 á 10 gram.  
Miel rosada..... 30 gram.

*Otra.*

Agua de lechuga..... 200 gram. | Borax..... 4 á 8 gram.

*Gargarismo contra la salivación.*

Agua de lechuga..... 150 gram. | Acido clorhídrico..... 15 gotas.  
Miel rosada..... 40 gram.

*Otro gargarismo contra la salivación.*

Agua..... 200 gram. | Clorato de potasa..... 6 gram.  
Jarabe de moras..... 60 gram.

(Estomatitis mercurial y ulceraciones secundarias.)

## SOLUCIONES PARA LOCIONES Y CURAS.

*Solucion opiada.*

Agua destilada de lechuga. 200 gram. | Extracto gomoso de ópio.. 4 gram.

(Chancros gangrenosos y parafimosis.)

*Solucion de sal amoniaco.*

Agua..... 250 gram. | Hidroclorato de amoniaco. 250 gram.

(Aplicacion sobre los bubones estrumosos.)

*Solucion iodada.*

Tintura de iodo..... 2 á 4 gram. | Ioduro de potasio..... C. S.  
Agua destilada..... 200 gram.

(Para curar las sífilides terciarias ulceradas.)

*Agua alcalina.*

Agua..... 200 gram. | Carbonato de sosa..... 10 gram.

(Placas mucosas.)

*Licion clorurada.* (Ricord.)

Licor de Labarraque..... 50 gram. | Agua destilada..... 150 gram.

(Placas mucosas: se espolvorea la parte enferma con el calomel.)

*Solucion de sublimado.*

Agua destilada..... 200 gram. | Biclورو de mercurio... 10 centig.

(Lociones sobre las placas mucosas; efectos muy rápidos.)

*Otra.*

Agua destilada..... 200 gram. | Alcohol..... C. S.  
Biclورو de mercurio.. 50 centig.

(Contra los parásitos.)

*Solucion de nitrato de plata.*

Agua destilada..... 30 gram. | Nitrato de plata..... 50 centig.

(Para mojar con un pincel las partes afectadas en la balano-postitis.)

*Otra.*

Nitrato de plata..... 50 centig. | Agua destilada..... 100 gram.

(Para curar los chancros blandos múltiples, en su principio.)

*Vino aromático simple ó opiado.*

(Chancros simples ó fagedénicos.)

*Solucion de tartrato ferrico-potásico.*

Agua destilada... 200 gram. | Tartrato ferrico-potásico.. 10 gram.

Mézclese.

Dos ó tres cucharadas por día, puras ó en un vaso de agua azucarada. Cura de los chancros fagedénicos.

*Solucion de alcoholado de guaco. (Pascal.)*

Alcoholado de guaco..... 20 gram. | Agua destilada..... 100 gram.

(Cura de los chancros simples y fagedénicos, lociones abortivas, y se hace uso del alcoholado puro con un pincel, para practicar cauterizaciones abortivas al principio del chancro.)

## BAÑOS Y FUMIGACIONES.

*Pediluvio mercurial.*

Deutocloruro de mercurio..... 1 gram.

Para un baño de pies.

(Sifilides de los pies y de la parte inferior de las piernas.)

*Baño de sublimado.*

Deutocloruro de mercurio..... 10 á 16 gram.

Disuélvase en:

Alcohol..... 120 gram.

Echese en un baño de madera.

(Sifilides antiguas inveteradas.)

*Fumigación de cinábrio.*

Cinábrio..... 8 á 12 gram.

Se le puede añadir partes iguales de benjuí, azúcar, etc.

## POLVOS.

*Calomel al vapor.*

*Polvo de muriato de oro y de sosa. (Chrestien.)*

Licopodio ó iris lavado en alcohol..... 15 centíg. | Muriato de oro y sosa..... 5 centíg.

Mézclese.

Divídase primero en 15, despues en 14, 13, 12 y tambien progresivamente ocho partes, empezando por las mas débiles.

Se dan fricciones una vez al día en la lengua y en las encías con uno de estos paquetes.

*Polvos contra las vegetaciones.*

Polvo de sabina..... }  
Oxido de hierro..... } aa. . 4 gram.  
Alumbre calcinado..... }

Mézclese.

(Para espolvorear las vegetaciones.)

## [ESCARÓTICOS.

*Pasta de Viena.*

(Chancros, bubones.)

*Acido nítrico monohidratado.*

(Chancros simples fagedénicos, vegetaciones.)

*Nitrato ácido de mercurio.*

(Vegetaciones, placas mucosas de la garganta y de la boca.)

*Acido hidroclórico.*

(Estomatitis ulcerosa mercurial.)

*Pasta carbo-sulfúrica. (Ricord.)*

Acido sulfúrico..... 6 gram. | Carbon pulverizado y tamizado. C. S.

Para una pasta blanda, no fluida.

Consérvese en un frasco de tapon esmerilado y en un sitio seco. Esta pasta atrae con avidez la humedad de la atmósfera y se altera rápidamente.

(Chancros blandos, simples ó fagedénicos.)

*Pasta de cloruro de zinc. (Lyon.)*

Cloruro de zinc..... }  
Harina..... } aa. . partes iguales.

Añádase:

Alcohol..... C. S.

Esta pasta se estiende en tiras de esparadrapo.  
(Chancros y bubones chancrosos.)