

En un caso de enteritis simple, pero tan exacerbada que el niño se hallaba en la agonía, le salvaron las lavativas con la adición del láudano á la dosis de seis gotas al día, sin que resultase otra cosa que un ligero narcotismo. Es verdad que no en todos los casos es necesario elevar tanto la dosis del láudano; pero esto prueba que se ha exagerado el peligro de este remedio. Así, pues, se prescribirá:

T. Agua de malvabisco. . . . .	C. S. para $\frac{1}{4}$ de lavativa.
Láudano de Sydenham. . . . .	1 gota.
Almidon. . . . .	2 gram.

Se administra una lavativa por la mañana y otra por la tarde.

Si esta dosis pareciese insuficiente por ser el caso muy grave, no se debería titubear en poner dos gotas de láudano en cada lavativa.

Al mismo tiempo se aplicarán sobre el vientre *cataplasmas laudanzadas*, que se renovarán día y noche. Se hacen tomar á los niños baños simples ó bien con cocimiento de salvado, y se harán fomentos emolientes en las partes eritematosas.

Se espolvorea la parte con subnitrate de bismuto mezclado con polvo de almidon ó precipitado blanco, y si estos medios no fueran suficientes se harán lociones con agua fagedénica, ó bien se tocan los puntos ulcerados con una solución ténue de sulfato de cobre.

Para contener la diarrea se ha recurrido algunas veces al *cocimiento blanco*, y se dá para bebida usual el agua de arroz endulzada con el jarabe de membrillo, ó bien *agua albuminosa* suficientemente endulzada.

El *agua de salvia* en bebida, aconsejada por Rosen, no obra de otro modo.

Se han recomendado los *tónicos* y principalmente el cocimiento de *quina* y de *genciana*, cuando el mal ha hecho grandes progresos y los enfermos se hallan en el período de colapso; pero se ha recurrido mas principalmente á estos medios cuando el muguet presenta un color pardo ó negruzco, porque se ha creído que la lesión tenia en este caso un carácter gangrenoso. Mas desde luego se echa de ver que esta opinion no es fundada, y si solo una ilusión debida á una observacion superficial. Además, como lo hacen observar Guersant y Blache, cuando la enfermedad llega al grado de colapso, casi no es susceptible de curacion por semejantes medios, y finalmente, los niños tienen gran repugnancia á estas sustancias.

Los *purgantes* no han dado buenos resultados. No obstante, Guersant y Blache recomiendan el *jarabe de achicorias*, solo ó mezclado con *aceite de almendras dulces*, ó bien con *aceite de ricino*. En cuanto á esta última sustancia no sería prudente pasar de la dosis de 4 ó 5 gramos en niños muy pequeños que padezcan una inflamacion del conducto digestivo.

Guersant, Blache y otros muchos autores, creen que pueden ser útiles las *emisiones sanguíneas* cuando existe una inflamacion intensa

de los intestinos, en cuyo caso se aplicarán una ó dos sanguijuelas al ano. Pero nos limitaremos á decir respecto de este medio de tratamiento, que conviene ser muy prudente en usarle en niños tan pequeños, y en una enfermedad en que tanta tendencia hay al colapso.

Durante el curso de la enfermedad, se dá á los niños bebidas emolientes por medio de una cuchara y con mucha precaucion; pero en cuanto sea posible poner los niños al pecho, no se debe tardar un instante en hacerlo. Entretanto se les mantendrá á una *dieta severa*, si los síntomas son graves y notable la calentura, y si no se les dará un poco de leche mezclada con la bebida.

Niemeyer (1) recomienda la limpieza de la boca de los niños; no debe dejárseles dormir en el pecho de la nodriza, porque quedando un poco de leche en la boca puede acidificarse, descomponerse y convertirse en asiento de la vegetacion del muguet. Será ventajoso enjuagar la boca con un pañito mojado en agua ó en agua y vino.

Nosotros, que creemos en el contagio del muguet, recomendamos á las nodrizas que se apliquen sobre el pezon una capa de miel boratada siempre que den de mamar á un niño afectado de muguet. Esta recomendacion es indispensable cuando se lacten dos niños á la vez.

*Resúmen y prescripciones.* Si se ha quitado ya al niño el pecho, es menester volvérselo cuanto antes, y cesar de darle una alimentacion feculenta como se hace en los hospitales. Si no puede coger el pecho, se le darán bebidas emolientes mezcladas con leche, cuidando de ponerle á él tan pronto como pueda ejecutar la succion. Las lavativas de almidon laudanzadas, que tan buenos resultados producen en los adultos, deberán emplearse en esta enfermedad; pues no hemos observado que tuviesen el inconveniente de narcotizar los enfermos cuando no se ponen mas de dos gotas de láudano en cada lavativa, y no se administra mas de una al día (2); nos pareció que este medio produjo en un niño excelentes resultados.

Nunca se debe arrancar violentamente la capa pseudo-membranosa que tapiza la mucosa bucal. Los gargarismos solo deben servir para humedecer con frecuencia la boca, no quitando la falsa membrana sino cuando haya perdido su adherencia.

Por último, se empleará un tratamiento local en las diversas lesiones que estén á nuestro alcance. Se untarán las nalgas, los muslos y las piernas con cerato, para impedir el contacto de la orina y de las materias fecales. Se curarán las úlceras de las piernas con cerato simple. Se tocarán las del frenillo de la lengua y del velo del paladar con la mezcla siguiente:

(1) Niemeyer, *Elements de pathologie interne*, trad. por Culmann y Sengel, 1865, t. 1, p. 471.

(2) Despues nos hemos convencido de que se puede aumentar esta dosis sin peligro (véase pág. 428).

T. Acido hidroclicórico. . . . . 4 parte.  
Miel. . . . . 3 partes.

Mézclese.

Segun Trousseau, nada mas eficaz contra el muguet que el colutorio de *bórax*. Nada prueba la eficacia de los *vejigatorios*, debiendo abstenernos de ellos en la tierna edad.

#### Prescripcion I.

EN UN CASO EN QUE EL MUGUET PAREZCA SER ENTERAMENTE LOCAL.

- 1.º Para bebida, un cocimiento de cebada mezclada con leche.
- 2.º Lavar frecuentemente la boca con un cocimiento de malvabisco y suficiente cantidad de jarabe de moras.
- 3.º Colutorio de *bórax*.
- 4.º Untar las nalgas y los muslos con cerato, para evitar la formacion del eritema, que se manifiesta aun cuando no haya todavía síntomas marcados de padecimiento del conducto digestivo.
- 5.º Dar por mañana y tarde una cuarta parte de lavativa de cocimiento de malvabisco y de cabezas de adormideras.
- 6.º Si hubiese sido preciso dejar de dar de mamar al niño, se le volverá á poner al pecho en cuanto le pueda tomar.

#### Prescripcion II.

EN UN CASO EN QUE SON NOTABLES LOS SÍNTOMAS DE LA ENTERITIS.

- 1.º Para bebida, cocimiento de arroz gomoso.
- O bien:

T. Agua comun tibia. . . . . 500 gram.  
Clara de huevo. . . . . n.º 1 ó 2.

Mézclese y añadáse:

Jarabe de malvabisco. . . . . 40 gram.

- 2.º Hacer frecuentes lociones en la boca, con un fuerte cocimiento de agua de malvabisco y de cabezas de adormideras.
- 3.º Tocar los puntos afectados con un pincel empapado en el colutorio de *borax*.
- 4.º Untar con cerato las nalgas y los muslos, como se ha dicho mas arriba.
- 5.º Tratar las úlceras con cocimiento de malvabisco y cantidad suficiente de jarabe de moras.
- 6.º Por mañana y tarde, una cuarta parte de lavativa de cocimiento de semilla de lino añadiendo:

Láudano liquido de Sydenham. . . . . 4 gota.  
Almidon. . . . . 2 gram.

Se puede duplicar la dosis de láudano si el caso lo exigiese.

- 7.º Cataplasmas laudanizadas al vientre.
- 8.º Baños con agua de salvado, que se suprimirán si ocasionan demasiada agitación.
- 9.º Dieta absoluta, que cesará tan luego como remitan los síntomas principales.

#### Prescripcion III.

EN EL PERIODO DE COLAPSO.

- 1.º Para bebida, infusion de genciana endulzada con jarabe de naranjas.
- 2.º Usar gargarismos astringentes (véase la pág. 426) ó los polvos estimulantes indicados en la misma página.
- 3.º Para alimento, caldo colado.
- 4.º Fomentos al vientre con infusion de salvia.

Nada podemos decir de positivo acerca de estos últimos remedios, los que indicamos únicamente porque han sido recomendados por los autores.

#### Breve resumen del tratamiento.

- 1.º *Tratamiento profiláctico.* Ejercicio, renovar el aire, limpieza y lactancia.
- 2.º *Tratamiento curativo.* Dulcificantes, emolientes, gargarismos, opiados, cloruros, borato de sosa, astringentes, cateréticos, calomelanos, salvia, lavativas, cataplasmas laudanizadas, medios que corrijan la diarrea, baños, tónicos, eméticos, purgantes y evacuaciones sanguíneas.

#### ARTICULO III.

##### AFTAS.

#### § I.—Definicion, sinonimia y frecuencia.

Se debe dar exclusivamente el nombre de *aftas* á una enfermedad vesiculo-ulcerosa que ocupa diferentes puntos de la mucosa bucal, y á veces la mucosa gástrico intestinal (1).

Billard ha propuesto designarle con el nombre de *estomatitis foliculosa*, en razon á que coloca en los folículos mucosos el asiento de la lesion característica (2). Tambien se le pudiera dar el de *estomatitis*

(1) L. Martineau, *Nouveau dictionnaire de méd. et de chir. pratiques*, 1865, t. III, p. 18.

(2) Billard, *Traité des maladies des enfants*, 2.ª ed., Paris, 1833, p. 218.