

CAPÍTULO. V.

ENFERMEDADES DEL PERITONEO.

Las enfermedades del peritoneo que vamos á describir en este capítulo son: 1.º la *peritonitis aguda*; 2.º la *peritonitis crónica*; 3.º la *ascitis*, y 4.º ciertas alteraciones de que tan solo diremos algunas palabras. Dividiremos la peritonitis aguda en varias especies, y entre ellas describiremos principalmente la *peritonitis por perforacion*. Introduciremos igualmente algunas divisiones en la peritonitis crónica, cuya especie mas comun y mas notable es la *peritonitis tuberculosa*. En cuanto á la *ascitis*, podrá decirse que en un considerable número de casos no es lícito considerarla como una afeccion propia del peritoneo, puesto que en ellos la cavidad serosa no es mas que el receptáculo en que se acumula la serosidad, cuya secrecion depende de causas orgánicas enteramente especiales. Pero como en último resultado el peritoneo es donde tienen su asiento los síntomas principales, y el tratamiento activo se dirige hácia esta cavidad serosa, no hay ningun inconveniente en hacer de la hidropesía ascitis una afeccion peritoneal, tanto mas cuanto está admitido por todos que en ciertos casos, en el peritoneo mismo ó en el tejido celular que le viste, es donde se debe buscar el origen de la enfermedad.

ARTÍCULO PRIMERO.

PERITONITIS AGUDA.

La historia de la peritonitis es la que ha debido hacerse mas tarde de un modo conveniente. Es verdad que se hallan en varios autores anteriores á Bichat, y entre otros en Walther (1), algunas ideas bastante exactas respecto á la inflamacion de esta membrana; pero solo en estos treinta ó cuarenta últimos años, ha sido cuando se ha estudiado con mas cuidado y mayor fruto esta afeccion tan grave en la mayor parte de los casos. La flegmasia del peritoneo, que se desarrolla con tanta frecuencia en la fiebre puerperal, ha sido principalmente objeto de las investigaciones de los autores, y entre los que con especialidad se han ocupado de este asunto debemos citar á

(1) *De Morb. periton.*, etc. Berlin, 1785.

Doublet (1), Gasc (2), Tonnelé (3), Dugés (4), Baudelocque (5), etc. Pero otros médicos no han dejado de estudiar esta materia bajo otros puntos de vista, y así tenemos acerca de la peritonitis las observaciones de Laennec (6), de Broussais (7), de Andral (8), de Cruveilhier (9), Trousseau (10), Béhier (11) y un número considerable de Memorias diseminadas en las diversas colecciones científicas.

En este artículo solo destinaremos á la *peritonitis puerperal* un párrafo bastante corto, en atención á que resulta de las investigaciones recientes que no se puede considerar á esta peritonitis como la única afeccion que constituye por sí sola la que se designa con el nombre de *fiebre puerperal*, y en el artículo que destinaremos mas adelante á esta fiebre, tendremos necesariamente que volver á ocuparnos de la inflamacion del peritoneo, que forma parte de la enfermedad general.

Comenzaremos por trazar la historia de la peritonitis aguda de una manera general para tener un cuadro típico; pero reconocemos que la existencia de esta enfermedad bajo la forma primitiva es una cuestion dudosa, y no podemos dispensarnos de indicar aparte lo que caracteriza las especies, á saber: la *peritonitis espontánea*, afeccion problemática; la *peritonitis traumática*, la *peritonitis por extension de la inflamacion*, la *peritonitis puerperal* y la *peritonitis por perforacion*. No creemos debe tenerse en cuenta la division de Stokes (12), que se funda en la diferencia de edades y en las formas anatómicas de la enfermedad.

§ I.—Definicion, sinonimia y frecuencia.

Se da el nombre de *peritonitis aguda* ó *sobreaguda*, segun el gra-

- (1) Doublet, *Nouvelles recherches sur la fièvre puerperale*. Paris, 1791, en 12.
- (2) Gasc, *Dissertation sur la maladie des femmes à la suite des couches, connue sous le nom de fièvre puerpérale*.
- (3) Tonnelé, *Des fièvres puerpérales observées à la Maternité de Paris pendant l'année 1829; Des diverses méthodes thérapeutiques employées pour les combattre, et spécialement des mercuriaux, des vomitifs et des évacuations sanguines* (*Archives générales de médecine*, 1830, 1.ª série, t. XXII, p. 345 y 456; t. XXIII, p. 36 y 184).
- (4) Dugés, *Des causes de la péritonite puerpérale* (*Journal hebdomadaire de médecine*. Paris, 1828, t. I, p. 175, 361).
- (5) Baudelocque, *Traité de la péritonite puerpérale*. Paris, 1830.
- (6) Laennec, *Journal de médecine de Corcoursart*, an X.
- (7) Broussais, *Histoire des phlegmasies chroniques*, t. III, 3.ª édit., p. 295 et suiv.
- (8) Andral, *Clinique médicale*, t. II, 3.ª édit., p. 582 et suiv.
- (9) Cruveilhier, *Anatomie pathologique du corps humain*, t. I, XIII^e livraison, avec pl. coloriées.
- (10) Trousseau, *Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu*, 2.ª édit. Paris, 1865, t. I, p. 218 et suiv.
- (11) Béhier, *Conférences de cliniq. méd. faites à la Pitié*, recueillies par Man-jaud et Proust. Paris, 1864, p. 471 et suiv.
- (12) Stokes, *Encyclop. of pract. med.*, t. III, art. PERITONITIS.

do de intensidad de los síntomas, á la inflamacion de curso rápido que se desarrolla en el peritoneo ó en el tejido que le viste, cualquiera que sea por otra parte la causa que la ha producido.

Se ha llamado tambien á esta enfermedad *inflamacion del bajo vientre*, y en casos de *peritonitis parcial, inflamacion del mesenterio, del epíplon*, etc., segun la parte afectada. A veces se ha designado tambien á esta afeccion con los nombres de *gangrenosum peritonæum, peritonæi purulentia, peritonæi ulceratio, fiebre mesentérica*, etc.; mas en la actualidad se halla generalmente admitido el nombre de *peritonitis*.

La frecuencia de la peritonitis aguda es muy diferente, segun las especies, y así veremos luego cuán rara es la *peritonitis simple espontánea*. Por el contrario, no son raras la *peritonitis por extension de la inflamacion* ó á consecuencia de la *flegmasia* de los vasos venosos y linfáticos, ni la *peritonitis por perforacion*. Sin embargo, no se puede comparar su frecuencia con la de la inflamacion de otras membranas serosas, y en particular de la *pleura*.

§ II.—Causas.

Como ya hemos dicho antes de ahora, se han establecido las divisiones de la peritonitis atendiendo especialmente á las causas.

1.º *Causas predisponentes*.—*Edad*.—Está generalmente admitido que la edad adulta expone mas que ninguna otra á la peritonitis aguda, y si se quiere hablar de la peritonitis aguda en general, la proposicion es completamente cierta. En efecto, ya hemos indicado que esta enfermedad se desarrolla casi siempre ó por la comunicacion de la flegmasia de un órgano al peritoneo, ó á consecuencia de una perforacion. ¿Y en qué afecciones sucede esto? En las que aparecen de *resultas del parto* y en la *perforacion intestinal*, consecuencia de las úlceras de la fiebre tifoidea y de la tisis pulmonal, causas todas que se encuentran con especialidad en sugetos de diez y siete á cuarenta años de edad. Mas si queremos averiguar cuál es la influencia de la edad en la peritonitis simple, veremos que no es posible llegar á obtener un resultado bastante exacto. El doctor Simpson (1) ha reunido varias observaciones de peritonitis desarrolladas *durante la vida intra-uterina*; pero estos hechos, aunque sumamente interesantes, han sido reunidos con mucho trabajo, y á pesar de que llegan al número de veinticuatro, no se puede decir de ellos que la peritonitis sea frecuente en el feto. Se puede añadir el hecho comunicado por Druitt á la Sociedad obstetricial de Londres, concerniente á un niño que habia nacido con una obliteracion del

(1) Simpson, *De la péritonite chez le fœtus, etc.* (Arch. gén. de méd., 3.ª série, 1833, t. III, p. 444 et 1839, t. VI, p. 24).

intestino delgado, de lo cual murió, y debe atribuirse á una peritonitis intra-uterina (1).

Se ha descrito la peritonitis *simple espontánea* entre las enfermedades de los niños, y Dugés (2) ha destinado un párrafo bastante extenso á la descripcion de esta enfermedad en la infancia; Billard (3) ha citado una observacion de peritonitis aguda en el recién nacido, y finalmente, Rilliet y Barthez (4) han descrito la peritonitis de los niños en vista de doce observaciones que han recogido, y de las cuales cuatro son, segun su expresion, casos de *peritonitis primitiva*, y los ocho restantes de *peritonitis secundaria*.

Respecto á los hechos que acabamos de indicar, conviene advertir que los casos que ha citado el doctor Simpson se refieren en gran parte á niños que presentaban vicios de conformacion, y que por consiguiente no se les puede incluir entre los hechos ordinarios, y que el que ha referido Billard carece de tantos datos que no es posible saber si la peritonitis ha sido ó no resultado de una violencia exterior. En cuanto á los casos que han reunido Rilliet y Barthez, es lástima que estos autores no hayan dado á conocer sus observaciones, y sobre todo que no hayan hecho por separado la historia de la peritonitis primitiva de la secundaria, porque de este modo se hubiera visto mas fácilmente lo que pertenecia á la una y á la otra. Las mismas reflexiones son aplicables á los autores extranjeros que se han ocupado hace pocos años de este asunto, y en particular á Heyfelder (5) y á Romberg (6).

En resumen: vemos que los niños solo muy rara vez presentan la peritonitis simple espontánea, y que hasta no está perfectamente demostrado que esta enfermedad se haya desarrollado en ellos únicamente bajo la influencia de causas no traumáticas, ó de la extension de la inflamacion, etc.; pero ya volveremos á ocuparnos pronto de este punto cuando tratemos de determinar las diversas especies de peritonitis, y solo añadiremos ahora, que segun las descripciones que poseemos, la peritonitis no presenta signos particulares en los niños, y que, por consiguiente, no hay motivo para formar una especie aparte, como lo han hecho algunos autores, con el nombre de *peritonitis infantil*. En cuanto á la peritonitis por perforacion, se encuentra en ellos con bastante frecuencia.

(1) Druitt, *Oblitération complète de l'intestin grêle à la suite d'une péritonite intra-uterine* (Medical Times and Gazette, 28 de Abril de 1860), et *Gazette hebdomadaire de médecine*, 1860, n.º 20, p. 477).

(2) Dugés, *Dictionnaire de médecine de chirurgie pratiques*, t. XII, art. PÉRITONITE.

(3) Billard, *Traité des maladies des enfants*, 2.ª édit., 1833, p. 461.

(4) Barthez et Rilliet, *Traité des maladies des enfants*, 2.ª édit., Paris, 1855, t. II, p. 1 et suiv.

(5) Heyfelder, *Studien im Gebiete der Heilwissenschaft*, etc. Stuttgart, 1838.

(6) Romberg, *Ueber Peritonit.*, 1833.