

## APPENDICE

### FORMULAIRE

#### URÉTHRITE BLENNORRHAGIQUE

##### I. — TRAITEMENT INTERNE

1. Bals. Copai<sup>v</sup>. 0.5.  
D. in caps. gelat. tal. dos.  
n° XXIV, en prendre 2 ou  
3, quatre fois par jour.
2. Extr. Cubeb. aether.  
Bals. Copai<sup>v</sup>. ana 0.25.  
D. in caps. gelat. tal. dos.  
n° XXIV, 1 à 3 à prendre  
trois fois par jour.
3. Cubeb. pulv. 30.0.  
Trois fois par jour une cuil-  
lerée à thé dans un cachet.
4. Ol. Santali 0.5.  
D. in caps. gelat. tal. dos.  
n° XXIV, 2 caps. à pren-  
dre trois fois par jour.

##### II. — TRAITEMENT EXTERNE

5. Sulfat. zinc. 0.3.  
Aq. destill. ad 100.0.  
M. f. inject.
6. Sulfophen. zinc. 0.3.  
Aq. destill. ad 100.0.  
M. f. inject.
7. Resorcin. resublim. 2.0-3.0.  
Aq. destill. ad 100.0.  
M. f. inject.

8. Hypermang. kal. 0.03.  
Aq. destill. ad 100.0.  
M. f. inject.
9. Acid. tannic. 0.3.  
Aq. destill. ad 100.0.  
M. f. inject.
10. Hydrarg. bichlor. corr. 0.01.  
Aq. destill. ad 200.0.  
M. f. inject.
11. Sulfat. zinc.  
Acetat. plumb. ana 0.3-0.5.  
Aq. destill. ad 100.0.  
M. f. inject. Agiter avant  
de s'en servir. (Emulsion  
de Ricord).
12. Acetat. plumb. 0.5.  
Aq. destill. ad 100.0.  
M. f. inject.
13. Acetat. zinc. 0.3.  
Aq. destill. ad 100.  
M. f. inject.
14. Subnitr. bismuth. 2.0.  
Aq. destill. ad 100.  
M. f. inj. Agiter avant de  
s'en servir.
15. Nitrat. arg. 0.1.  
Aq. destill. ad 300.0  
M. f. inject.
16. Nitrat. arg. 0.3-1.0.  
Aq. destill. ad 100.0.  
Us. m. f. inj. Pour instil-  
lation dans l'uréthrite  
chronique.

17. Nitrat. arg. 0.03.  
Butyr. cacao 3.0.  
M. l. a. f. bac. long. 3-4 cm.  
Us. A introd. dans l'uréthre.

18. Nitrat. arg. 1.0.  
Butyr. Cacao 100.0.  
Cerae. 2.0-5.0.  
M. l. a.  
Us. Pour enduire les sondes.

19. Nitrat. arg. 0.2-0.4.  
Lanol. pur. 20.0.  
M. Us. Pour inject. dans  
l'uréthre postérieur.

III. — COMPLICATIONS  
DE LA BLENNORRHAGIE

20. Tinct. iodi 1.0.  
Ungt. iodur. kal. 15.0.  
M. Us. ext.  
(Tuméfactions ganglionnaires, épididymite).

21. Iod. pur. 0.2.  
Iodur. kal. 0.3.  
Lanolin. 20.0.  
Us. ext. (Comme pour la  
précédente formule).

22. Salycil. natr. 0.5.  
D. in caps. amyl. tal. dos.  
n° XX. En prendre 2, trois  
ou quatre fois par jour.  
(Cystite).

23. Salycil. natr. 12.0  
Aq. dest. 170.0.  
Syr. aur. cort. 18.0.  
M. 4 à 5 cuill. à soupe par  
jour. (Cystite).

24. Chlorat. kal. 8.0-10.0.  
Aq. destill. 170.0.  
Syr. rub. idœi. 20.0.  
4 à 5 cuill. à s. par jour.  
(Cystite).

25. Fol. Uv. ursi. 50.0.  
Pour préparer du thé, une  
cuillerée à soupe dans

une tasse d'eau bouillante; 3 tasses par jour.  
(Cystite).

26. Nitrat. arg. 0.6.  
Aq. destill. ad 200.  
M. Us. ext. (Lavages de  
 vessie).

27. Extr. Bellad. 0.1.  
Butyr. Cacao 10.0.  
M. f. supp. n° X.  
2-3 f. par jour introd. un  
suppos.). (Irritation pros-  
tagique).

28. Morph. muriat. 0.1.  
Butyr. Cacao 10.0.  
M. f. supp. n° X.  
(Comme le précédent).

29. Summit. sabin. pulv.  
Alum. pulv. ana. 5.0.  
M. f. pulv.  
(P. papillômes)

30. Summit. sabin. pulv.  
Lanol. aa. 10.0.  
Ol. terebenth. 5.0.  
M. f. ung.  
(Papillôme).

31. Acid. arsenicos. seu  
Iodur. arsen. 0.2.  
Ung. cinerei. 5.0.  
M. f. ung.  
(Papillôme).

IV. — BLENNORRHAGIE CHEZ LA  
FEMME

32. Sulfat. zinc. 5.0.  
Aq. dest. ad 500 g.  
M. (irrigations vaginales).

33. Alumin. 5.0-10.0.  
Aq. distill. ad 500.  
M. (irrigations vaginales).

34. Tinet. ratanh. 30.0.  
Alumin. 3.0.  
Aq. destill. ad 300.0.  
M. (irrigations vaginales).

35. Acid. tannic. 2.0.  
Glycerin. pur. 20.0.  
Aq. destill. ad 200.  
M. Tremper dans la solu-  
tion des tampons d'ouate  
à introduire dans le  
vagin.

36. Nitrat. arg. 1.0.  
Subnit. bismuth. 9.0.  
Talc. pulv. 90.0.  
M. Saupoudrer les tampons  
à introduire dans le vagin.

CHANCRE MOU

37. Iodoform. desodor. 5.0.  
Us. ext.

38. Iodoform. desodor. 1.0.  
Æther. sulfur. 10.0-15.0.  
M. Us. ext.

39. Iodof. desodor. 1.0.  
Lanol. 10.0.  
M. Us. ext.

40. Iodoform. desodor. 1.0.  
Butyr. Cacao. 4.0.  
M. f. bacill. long. 2-3 cent.  
Us. Introd. dans l'uréthre  
en cas de chancre uré-  
thral.

41. Nitrat. arg. 0.1-0.15.  
Bals. peruv. 1.5.  
Lanol. 15.0.  
M. Us. ext.

42. Sulf. zinci. 0.5.  
Aq. destill. 50.0.  
M. Us. ext. En pansement.

43. Liq. acetat. alum. 30.0.  
Aq. destill. 170.0.  
M. Us. ext. En envelopp.

44. Vin. camphor. 100.0.  
Us. ext. En envelopp.

45. Nitrat. arg. 0.03.  
Aq. destill. 45.0.  
M. En inject. sous-cutanées.  
(Dans le chancre serpigineux).

46. Tinct. iodi.  
Tinct. Gallarum, ana. 5.0.  
M. En badigeonnages sur  
les bubons.

SYPHILIS

I. — TRAITEMENT GÉNÉRAL

47. Ung. hydrarg. ciner. 2.0-  
3.0-5.0.  
D. tal. dos. n° X.  
En frictions.

48. Unguent. hydr. ciner 3.0.  
Sulfur. rub. hydr. 0.5.

49. Hydr. bichlor. corros. 0.2.  
Chlorur. natr. 2.0.  
Aq. destill. 40.0.  
M. En inject. sous-cutanées.

50. Hydrarg. formamid. (sol à  
1 %) 15.0.  
U. En inject. sous-cutanées.

51. Calomel. v. hum. parat. 1.0.  
Ol. oliv. opt. 9.0.  
U. En inject. sous-cutanées.  
(Agiter).

52. Hydrarg. oxyd. flav. 0.5.  
Ol. oliv. opt. 10.0.  
U. En inject. sous-cutanées.  
(Agiter).

53. Salycil. hydrarg. 1 g.  
Ol. oliv. opt. 10 g.  
M. D. S. Pour inject. sous-  
cutanées; agiter avant  
l'usage.

54. Ung. hydr. cin. 50 %. 6 g.  
Ol. oliv. opt. 4 g.  
Pour injection sous-cuta-  
née; chauffer légèrement et  
secouer avant l'usage (huile  
grise).

55. Hydrarg. iod. flav. 0.6-2.4.  
Succ. et pulv. liquir. 2.5.  
Ad. pil. n° LX.  
3 pil. par jour.
56. Hydr. bichlor. corros. 0.12.  
Chlorur. natr. 1.2.  
Succ. et pulv. liquir. ana  
1.0. ad pil. n° XXX.  
3-4 par jour.
57. Tann. hydrarg. 3.0.  
Suc. et pulv. liquir. ana 1.5.  
Ad. pil. n° LX.  
1-2 pil. 3 fois par jour.
58. Tann. hydrarg. 3.0.  
Extr. opii. 0.3-0.6.  
Succ. et pulv. liq. ana 1.5.  
Ad. pil. n° LX.  
1-2 pil. 3 fois par jour.
59. Hydr. bichor. corr. 2.0-4.00.  
Aq. destill. 50.0.  
Us. ext. La moitié dans un  
bain (Syph. héréditaire).
60. Calomel. 0.006-0.01-0.015.  
Sacch. lact. 0.3.  
D. tal. dos. n° XV.  
2 poud. par jour. (Syphilis  
héréditaire).
61. Chlorat. kali. 10.0.  
Aq. destill. 300.0.  
P. gargarisme.
62. Bibor. natr. 10.0.  
Aq. destill. 300.  
M. p. gargarisme.
63. Tinet. Ratanh.  
Spir. Colon. ana 25.0.  
M. Une cuillerée à thé dans  
un verre d'eau. Garga-  
risme.
64. Liquor. acet. alum.  
Aq. destill. ana 50 g.  
M. une cuillère à thé dans  
un verre d'eau. Garga-  
risme.

65. Nitrat. arg. 2.0.  
Aq. destill. 20.  
M. En badigeonnage dans  
la stomatite mercurielle.
66. Decoct. Salsaparill. comp.  
fort.  
(Dec. Zittm. fort.) 500 g.  
D. tales n° V.  
Tous les matins boire une  
demi-bouteille à chaud.
67. Decoct. Salsaparill. comp.  
mit.  
(Dec. Zittm. mitis) 500 g.  
D. T. n° V.  
Le soir boire une demi-  
bouteille à froid.
68. Iodur. kal. 5.0-10.0-15.0:  
Aq. destill. 200.  
M. 3 cuill. à soude par jour.
69. Iodur. kal. 10 gr.  
Succ. Liquir. 3.0.  
Pulv. Alth. 1.0.  
Mucil. Gumm. 2.5.  
M. ad. pil. n° XXX.  
3 fois par jour 1-2 pil.
70. Iodur. natr. 10.0.  
Aq. destill. 200.  
M. 3 c. s. par jour.
71. Syr. Iodur. Ferri 50.0.  
3 fois par jour de 20 gouttes  
à 1/2 cuill. à café.

## II. — TRAITEMENT LOCAL

72. Empl. hydrarg.  
Empl. sapon. ana. 10.0.  
M. Etendre sur le linge.
73. Empl. hyd. americ. 400 gr.  
Pour 1/8 de mètre; us. ext.
74. Calomel.v.hum.parat.10.0.  
Saupoudrer.
75. Hydrarg. prœcip. alb. 2.0.  
Lanol. 18.  
M. Us. ext.  
(Pomm. au précipité blanc).

76. Hydrarg. oxyd. rub. 2.0.  
Vaselin. flav. 18.0.  
M. Us. ext.  
(Pomm. au précipité rouge).  
  
Hyd. bichlor. corr. 4.0.  
Aluminis.  
Camphoræ.  
Céruccæ ana. 2.0.  
M. Appliquer le précipité.  
(Solution de Plenck).
77. Hydrarg. bichlor. corros.  
0.25-1.0.  
Aq. destill. 25.0.  
M. Us. ext.  
(Papules des muqueuses).
78. Spir. Vini. dilut.  
Acet. concent. ana. 45.0.

79. Nitrat. arg.  
Aq. destill. ana. 5.0.  
M. Pour cauteriser les ulcé-  
rations tertiaires des  
muqueuses.

## TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
INTRODUCTION . . . . .	
PREMIÈRE PARTIE. — LA BLENNORRHAGIE . . . . .	8
CHAPITRE I. Le contagie de la blennorrhagie . . . . .	8
CHAPITRE II. L'uréthrite blennorrhagique aiguë . . . . .	11
CHAPITRE III. L'uréthrite blennorrhagique chronique. . . . .	23
CHAPITRE IV. L'inflammation du tissu périréthral et des corps caverneux . . . . .	30
CHAPITRE V. L'inflammation des ganglions lymphatiques . . . . .	32
CHAPITRE VI. L'inflammation de la muqueuse vésicale. Cystite blennorrhagique . . . . .	33
CHAPITRE VII. L'inflammation du canal déférent et de l'épididyme.	39
CHAPITRE VIII. L'inflammation des glandes de Cowper et de la prostate . . . . .	44
CHAPITRE IX. Le rétrécissement de l'urètre. . . . .	48
CHAPITRE X. La blennorrhagie chez la femme . . . . .	56
CHAPITRE XI. La blennorrhagie du rectum . . . . .	67
CHAPITRE XII. La conjonctivite blennorrhagique . . . . .	65
CHAPITRE XIII. La blennorrhagie, maladie générale. . . . .	72
CHAPITRE XIV. Le rhumatisme blennorrhagique. . . . .	76
CHAPITRE XV. Le papillôme blennorrhagique. . . . .	81
DEUXIÈME PARTIE. — LE CHANCRE MOU ET SES COMPLICATIONS . . . . .	85
CHAPITRE I. Le chancre mou . . . . .	85
CHAPITRE II. Le chancre gangréneux. . . . .	96
CHAPITRE III. Le chancre serpigineux. . . . .	101
CHAPITRE IV. L'inflammation des vaisseaux et des ganglions lymphatiques . . . . .	104
TROISIÈME PARTIE. — LA SYPHILIS . . . . .	111
CHAPITRE I. Définition et exposé général de la maladie. . . . .	111
CHAPITRE II. Le virus de la syphilis . . . . .	116
CHAPITRE III. La contagion de la syphilis. . . . .	120

	Pages.
CHAPITRE IV. La manifestation initiale de la syphilis. Le chancre syphilitique . . . . .	126
CHAPITRE V. Les affections syphilitiques des vaisseaux et des ganglions lymphatiques . . . . .	136
CHAPITRE VI. Les symptômes de la période éruptive . . . . .	141
CHAPITRE VII. Les affections syphilitiques de la peau . . . . .	145
1. Syphilide maculeuse . . . . .	145
2. Syphilide papuleuse secondaire. . . . .	153
3. Syphilide pustuleuse . . . . .	166
4. Syphilide papuleuse tertiaire . . . . .	169
5. Syphilide ulcéreuse . . . . .	173
6. Syphilide gommeuse. . . . .	179
CHAPITRE VIII. Les affections syphilitiques des poils et des ongles. . . . .	183
CHAPITRE IX. Les affections syphilitiques des muqueuses. . . . .	186
1. Manifestations secondaires des muqueuses. . . . .	186
2. Syphilides tertiaires des muqueuses. . . . .	196
CHAPITRE X. Les affections syphilitiques des organes du mouvement . . . . .	207
1. Affections syphilitiques des os. . . . .	207
2. Affections syphilitiques des articulations et des gaines tendineuses . . . . .	216
3. Affections syphilitiques des muscles . . . . .	219
CHAPITRE XI. Les affections syphilitiques de l'appareil circulatoire . . . . .	221
CHAPITRE XII. Les affections syphilitiques du système nerveux . . . . .	225
1. Affections des nerfs périphériques . . . . .	225
2. Affections du cerveau et de la moelle épinière . . . . .	227
CHAPITRE XIII. Les affections syphilitiques de l'œil et de l'oreille. . . . .	236
CHAPITRE XIV. Les affections syphilitiques des poumons et des appareils de sécrétion. . . . .	242
CHAPITRE XV. L'évolution de la syphilis . . . . .	251
CHAPITRE XVI. La syphilis galopante . . . . .	262
CHAPITRE XVII. La syphilis héréditaire . . . . .	268
CHAPITRE XVIII. Le pronostic de la syphilis . . . . .	292
CHAPITRE XIX. Le diagnostic de la syphilis . . . . .	297
CHAPITRE XX. Le traitement de la syphilis . . . . .	301
1. Traitement du chancre primitif . . . . .	301
2. Traitement général . . . . .	304
3. Traitement local des lésions syphilitiques. . . . .	326
4. Comment faut-il traiter un syphilitique ? . . . . .	331
5. Traitement de la syphilis héréditaire . . . . .	338
6. La prophylaxie de la syphilis . . . . .	340



1030020890

