

Ref
R 51
P 3
Drogas



FORMULARIO DE LA FACULTAD MEDICA MEXICANA.

Abcesos.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

Abceso mamario (mamitis.)

Tintura de phytolaca 8 gotas.

Agua.—gram. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Pomada de unguento doble y cataplasmas emolientes al pecho.

Abceso de hígado.

Dr. M. Mucél. México.

Puncionar con el aspirador; pero solamente en caso que el abceso no se haya abierto espontáneamente por otra parte.

Aborto.

Dr. Demetrio Mejía. México.

Aborto incompleto.

Siempre que la matriz no contenga grandes frag-

mentos y por cualesquiera causa no se pueda hacer la raspa, se emplearán inyecciones calientes de solución fenicada ó boricada, de tres á cuatro en las 24 horas.

Cada dos horas 20 gotas de solución de ergotina de Ivon; así no hay infección, ni calentura ni síntoma alguno alarmante.

Este tratamiento fué publicado y discutido en la Gaceta Médica y sostenido después por los parteros de Venezuela en la Unión Médica, año IV pág. 15 núm. 119.

Dr. F. Zárraga.	México.
Agua de azahar.....	gram. 100. 00
Tintura de vivurno prunifolio.....	„ 8. 00
Sulfato de morfina.....	„ 0. 05
Jarabe simple.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada sopera cada media hora. Esta fórmula ha dado muy buenos resultados, conteniendo el aborto, aún en los casos en que el cuello de la matriz estaba ya dilatado.

Dr. D. Molinar.	Parral.
Agua simple.....	gram. 120. 00
Clorato de potasa.....	„ 1. 00
Jarabe de cloral.....	„ 40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Lavativas laudanizadas.

Aceite de hígado de Bacalao.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

En todos los casos en que hay que administrar el aceite de hígado de Bacalao ó sus emulsiones, usa con buen éxito el aceite de tortuga. Es más barato y abunda en la Baja California.

Acnea.

Dr. Aurelio Perez. La Piedad. (Michoacán.)

Sulfuro de calcio.....	gram. 0. 30
Azúcar.....	„ 4. 00

En 15 papeles.

Cuatro papeles repartidos en el día.

Dr. E. Lier. México.

En la acnea rosásea.

Sublimado de mercurio.....	gram. 0. 50
Agua destilada.....	„ 160. 00
Agua destilada de laurel cerezo. } de c. c. „	20. 00
Alcohol diluido.....	„
Esencia de menta <i>X</i> gotas.	

Uso externo.

Locionar los lugares enfermos.

Dr. E. Gutierrez. Guadalupe de Zacatecas.

Agua.....	gram. 200. 00
Subcarbonato de sosa.....	„ 5. 00
Agua de rosas.....	„ 25. 00
Lavatorio 4 ó 5 veces al día.	
Vacelina.....	gram. 20. 00

Resorsina.....	„	2. 00
Veratrina.....	„	0. 10
Pomada, ponerla después del lavatorio.		

Dr. Salvador F. Alcalá. Tecolotlán.

Azufre precipitado.....	gram.	10. 00
Glicerina pura.....	„	8. 00
Alcohol alcanforado.....	„	12. 00

Uso externo.

Aplicarlo todas las noches sobre la erupción.

Dr. Juan C. Villaseñor. Morelia.

Naftol (beta).....	gram.	10. 00
Alcanfor.....	„	10. 00
Vacelina.....	„	10. 00
Azufre.....	„	50. 00
Jabón negro.....	„	15. 00
Carbonato de cal.....	„	5. 00

Pasta.

Aplicar esta pasta por solo 15 minutos.

Otra

Resorsina.....	gram.	de 2 á 5, 00
Oxido de Zinc.....	„	5, 00
Almidon.....	„	5, 00
Vacelina amarilla.....	„	10, 00

Pomada.

Aplicarla dos veces al día.

Acnea sebácea.

Dr. Miguel Cordero.	México.
Vacelina blanca.....	gram. 30. 00
Precipitado blanco.....	„ 4. 00
Bisulfuro rojo de mercurio.....	„ 1. 00

Pomada.

Untar la pomada dos veces al día en el lugar de la erupción después de lavar con jabón negro.

Adinamia.

EN LOS TIFOIDEOS.

Dr. L. Arroyo. San Angel.—Distrito Federal.

Fricciones violentas en todo el cuerpo, con un algodón mojado en vinagre aromático medicinal y envolviendo inmediatamente el cuerpo con una sábana.

Afecciones catarrales de las vías respiratorias.

Dr. Federico Cota. La Paz.—Baja California.

Hojas de jaborandi.....	gram.	4. 00
Agua.....	„	120. 00
Hágase cocimiento.		
Añádase: Cognac ó mexcal.	„	20. 00

Una toma.

Aftas.

Dr. D. Molinar. Parral.

Agua ó miel.....	gram.	60. 00
Borato de sosa.....	„	10. 00
Clorhidrato de cocaina.	„	0. 10

Toques.

Agalaccia.

Dr. Julio Córdova. Encarnación.—(Jalisco.)

La agalaccia sea inmediata al parto ó algunos meses después, aun en mugeres que habfan sufrido de falta de secreción láctea en sus partos anteriores:—20 gotas de extracto fluido de jaborandi cada dos horas, en un poco de leche ó de agua azucarada, hasta conseguir el efecto.

Alcoholismo.

Dr. M. Mucél. México.

Para combatir la hipostenia que sobreviene cuando se ha suprimido el uso del alcohol, emplea además de la estricnina á dosis creciente, hasta sus efectos fisiológicos, las hojas de Damiana de California y la hidroterapia.

Algodoncillo.

Dr. José Luna. Autlan.—(Jalisco.)

Naftol (beta).....	gm.	0. 15
Aceite de olivo.....	"	2. 00
Solución de goma.....	"	80. 00
Subnitrato de bismuto.....	"	2. 00
Laúdano Sydenham <i>de una á dos gotas.</i>		
Jarabe.....	"	20. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Alimento para niños.

Dr. Jesús Villagran. México.

Usa con buen resultado el alimento de Wagner, en niños que por cualesquiera circunstancia no pueden alimentarse con nodriza, recomendando que no esté

adulterado; esto se conoce en la presencia de puntos negros y verdes, en la formación de masas compactas y no polvo fino y en la fetidez muy marcada.

Dr. Carlos M. Garza. San Pedro de las Colonias.

Partes iguales de leche de vaca y atole de avena marca Scotch Rolled White Oats

Alopesia.

Dr. E. Lier. México

Spray con:

Resorsina.....	gm.	5. 00
Acido salisilico.....	"	2. 00
Alcohol diluido.....	"	90. 00
Alcohol de menta.....	"	90. 00
Tintura de cantáridas..	"	10. 00

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad, Michoacán.

Bálsamo Fioraventi.....	gm.	90. 00
Tintura de Baumé.....	"	5. 00
Idem. de cantáridas...	"	5. 00

Para fricciones en la cabeza previamente rasurada

Dr. Vicente Sierra. Apam.

Cocimiento fuerte de capitaneja (*Bidens heterophylla*) prefiriendo la que se cosecha en Orizaba.

Loçionar diariamente la cabeza.

Dr. David Peña. Monterey.

Salol.....	gm.	1. 00
Acido gálico.....	"	1. 00
Vacelina aromatizada...	"	30. 00

Pomada

Una vez al día

Amenorrea.

Dr. M. Meda.	Tacámbaro.—E. de Michoacan.
Infusión de tilia, borraja y raíces de apio.	250. 00
Borato de sosa de 4 á.....	„ 8. 00
Jarabe de corteza de naranja.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Tres cucharadas cada hora, cuatro ó cinco dias antes de la menstruación.

Dr. José M ^a Dávila.	Mazatlán.
Tintura de ruda.....	gram. 4. 00
Idem. „ azafrán.....	„ 4. 00
Cocimiento de canela.....	„ 150. 00
Jarabe de opio.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Para tomar una cucharada cada media hora:

Dr. Pablo Gama.	México.
Ergontina de Bonjean.....	gram. 1. 00
Azafrán español.....	„ 0. 25
Podofilina.....	„ 0. 10

Conserva de rosas c. b.

En 20 píldoras

Cuatro días antes del probable reconocimiento menstrual empear tomando tres píldoras repartidas en el día.

Baños de pies sinapisados y buena alimentación.

Dr. Desiderio G. Rosado.	Comalcalco.
Bicromato de potasa.....	gram. 0. 10

Percloruro de fierro líquido...	„ 14. 00
Tintura de iodo.....	„ 28. 00

Gotas.

De cinco á diez gotas cuatro veces al día en agua gomosa ó emulsión.

Amigdalitis crónica.

Dr. Pablo Amores. Tabasco.

En los niños la amigdalotomía es de un uso corriente y puede considerarse como una operación casi inofensiva, bien sea con el bisturi ó con el amigdalotomo; pero no sucede lo mismo con el adulto en el que las cosas suelen pasar de una manera muy diferente. Con la cocaina y el termocauterio como se ha propuesto se facilita grandemente la operación.

El procedimiento que mejores resultados ha dado en manos del autor, es el siguiente: embrocaciones en las amígdalas tres veces con interválos de cinco minutos, de la siguiente solución:

Aceite de almendras dulces....	gram. 5. 00
Clorhidrato de cocaina.....	„ 0. 05

Embrocaciones

Conseguida la anestesia, se toca cada glándula cuatro ó seis veces con el cuchillo agudo del termocauterio, al rojo vivo, de manera que éste penetre dos ó tres milímetros en el espesor de la glándula, por distintos lugares, resultando otras tantas escaritas que caen después de algunos días.

En los dos primeros días el enfermo debe gargarizar con algún líquido anticéptico.

Cada ocho ó doce días puede repetirse la cauterización, hasta que las amígdalas desaparezcan totalmente.

Este procedimiento es seguro é indoloro; pero debe obrarse con sumo cuidado por la proximidad de los gruesos vasos del cuello.

En los niños emplea como anestésico el cloroformo y opera durante el sueño.

Amputación de las falanges.

Dr. Guillermo R. Servín. Triunfo, Baja California.

Se hace una incisión en la cara dorsal, empezando exactamente en el punto donde debe cortarse el hueso, comprendiendo la piel, el tejido celular y parte de la capa muscular. Otra incisión en la cara palmar, partiendo del punto diametralmente opuesto y siguiendo ambas incisiones la dirección del eje del dedo. La longitud de estas incisiones será de poco más de un centímetro. A la extremidad de dichas incisiones se corta la piel circularmente; se retrae ésta como en el método circular, se profundizan las incisiones hasta el hueso y se disecan los colgajos en toda su extensión. Se pone la compresa y se asierra el hueso.

Ligaduras y suturas se harán con catgout.

La primera curación ligeramente húmeda y cubierta de algodón salicilado. Al tercer día se quitan las suturas y se continúan las curaciones por el método de Lister.

Los resultados obtenidos por éste método son superiores á los que han dado las desarticulaciones.

Anasarca.

Dr. Manuel Carmona y Valle.

México.

Por lesiones cardiacas

Agua.....	gram.	200.	00
Citrato de cafeina.....	„	1.	00
Benzoato de sosa.....	„	2.	00
Cognac de buena calidad.....	„	50.	00

Tres tomas

Repartidas en el día.

Suele aumentar la orina de una manera fabulosa.

Anemia.

TÓNICO RECONSTITUYENTE.

Dr. A. J. Carbajal.

México.

Prefiere á todas las preparaciones ferruginosas el jarabe de ioduro de fierro de la Farmacopéa Británica; una ó dos cucharadas en el día. Es muy eficaz y el estómago lo tolera muy bien.

Agua destilada.....	gram.	20	00
Salicilato de fierro.....	„	1.	00

Inyecciones

Una inyección cada tres ó cuatro días, en los casos en que está indicado el uso de los ferruginos.

Tiene el inconveniente de ser dolorosa la inyección y dejar algunos endurecimientos subcutáneos.

Anemia.

Dr. Cárlos M. Garza:

San Pedro de las Colonias,
Coahuila.

Vino Jerez.....	gram.	300.	00
Tintura de quina roja.....	„	1.	50

Tintura de genciana.....	gm.	10. 00
Idem. de colombo.	„	10. 00
Idem. de cardamomo.....	„	10. 00
Fosfato de fierro citroamoniacal „		4. 00

Una copita licorera media hora ántes de cada alimento.

Dr. Enrique Herrera y Moreno. Córdoba,

Anemia palustre.

En las riberas del río Blanco, especialmente se observa una forma de anemia con edemas, soplos suaves en los focos de auscultación del corazón, palidez peculiar de los legumentos. Vaso crecido notablemente y un estado que no se domina con el tratamiento ordinario del paludismo, ni con el tratamiento de la anemia, si antes no se activa la circulación con la digital, esparteina ó alguno de sus sucedáneos.

Dr. D. Molinar. Parral.

Protocloruro de fierro..... gm. 1. 00

Conserva de rosas c. b.

Para 20 píldoras

Dos ó tres píldoras diarias.

Dr. Ernesto Chávez. Córdoba.

Fierro reducido..... gm. 1. 00

Acido arcenioso..... „ 0. 03

Sulfato de estriquina..... „ 0. 03

En 30 píldoras

Una píldora despues de la comida y otra despues de la cena.

ANEMIA.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Agua destilada..... gm. 120. 00

Citrato de fierro..... „ 4. 00

Cucharadas.

Una cucharada antes de las comidas.

Los niños la toleran muy bien.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

Tartrato férrico potásico..... gm. 10. 00

Solución arcenical de Fowler..... „ 10. 00

Disuélvase y filtrese.

Gotas

De 10 á 20 gotas por día.

Dr. R. Ruiz. Salvatierra.

Polvos de quina..... gm. 1. 00

Carbonato de fierro..... „ 1. 00

Arceniato de estriquina..... „ 0. 01

Sacasuso de canela, c. b.

Para 12 píldoras.

Una píldora después de comer.

Dr. Leandro Arroyo.—San Angel, Distrito Federal.

Masa de Blaud..... gm. 1. 20

Extracto genciana..... „ 1. 80

Idem valeriana..... „ 0. 60

Idem beleño..... „ 0. 40

En 24 píldoras.

Una píldora antes de cada alimento.—Tres en el día.

Otra.

Peróxido de manganeso....	gram.	0. 60
Masa de Blaud.....	„	1. 20
Extracto de genciana.....	„	4. 00

En 24 píldoras.

Una píldora antes de cada alimento.—Tres en el día.

Dr. Constancio Mota. Puruándiro.

En la anemia por hemorragia, en la lipotimia y el síncope:

Solución oficial de trinitrina al centésimo, IV gotas.

Nitrito de amila III gotas.

Para inyección hipodérmica en un gramo de agua, cognac ó éter sulfúrico, según la intensidad del caso.

Dr. Demetrio Mejía. México

Sulfato de fierro..... gram. 15. 00

Carbonato de potasa.... „ 15. 00

Goma tragacanto y glicerina de c. c.—c. b.

Para 100 píldoras.

Dos píldoras á media comida, por tres días; luego tres, por tres días; luego cuatro; y así se sigue aumentando de tres en tres días, hasta tomar ocho ó diez píldoras diarias.

El efecto no se hace esperar más de quince días.

Anestesia ocular.Dr. Agustín Chacón. México.

Agua destilada..... gram. 10. 00

Muriato de cocaina de 0. 20 á.. „ 0. 40

Colirio.

Otro.

Agua destilada..... gram. 10. 00

Bicloruro de mercurio..... „ 0. 02

Clorhidrato de cocaina de 0. 20 á.. „ 0. 40

Colirio.

Se pueden usar estos colirios para el exámen oftalmoscópico.

Angina catarral.Dr. Angel Nieto. Palmarejo.

Miel rosada..... gram. 30. 00

Acido clorhídrico. „ 2. 00

Toques.

Dos ó tres toques en el día.

Pomada de iodo al exterior ó jabonadura; y gárgaras con agua de limón.

Dr. Eufemio Gutierrez. Guadalupe de Zacatecas.

Salicilato de sosa.... gram. 4. 00

Clorato de potasa.... „ 8. 00

Nitrato de pilocarpina. „ 0. 05

En 12 obleas Limousin.

Una cada hora.

Cocimiento de cebada perla.. gram. 300. 00

Salol..... „ 6. 00

Bicarbonato de sosa..... „ 4. 00

Miel de moras..... „ 60. 00

*Gárgaras cada 2 horas.*Dr. Manuel F. Ocampo. Pinos.

Cocimiento de hojas de coca.. gram. 500. 00

Clorato de potasa grm. 10. 00
 Láudano de Sydenham „ 2. 00

Gárgaras.

Dr. Juan Collantes y Buenrostro. México.

Agua simple grm. 120. 00
 Polvo de borax „ 2. 00
 Tintura de árnica „ 4. 00
 Jarabe de azahar „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. M. Mucél. México.

Antipirina grm. 2. 00

En 4 papeles ú obleas.

Una cada cuatro horas.

Toques con solución al 4 por ciento de clorhidrato de cocaina, agregado ó nó de baborato de sosa.

Dr. E. Gutierrez.—Guadalupe, Estado de Zacatecas

ANGINA CRÓNICA HIPERTROFIADA.

Glicerina grm. 20. 00
 Ergotina de Bonjean „ 5. 00
 Tintura de iodo „ 3. 00
 Cocaina „ 0. 33

Toques.

Para dar tres toques diarios.

Dr. Ramón N. Prado. México.

ANGINA GLANDULOSA.

Glicerina grm. 15. 00
 Sulfato de cobre „ 3. 00
Toques.

Tres toques en el día.

Dr. David Peña. Monterey.

ANGINA CATARRAL.

Fosfato de sosa grm. 10. 00
 Salol „ 2. 00
 Cocimiento de crameria „ 300. 00
Gárgaras.

Gargarizar frecuentemente durante el día.

Dr. Miguel Cordero. México.

ANGINA TONSILAR.

Clorato de potasa grm. 20. 00
 Bicarbonato de sosa „ 20. 00
En 20 papeles.

Un papel en 200 gramos de agua hervida, tibia para hacer gárgaras frecuentes con este líquido.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Agua destilada grm. 40. 00
 Acido clorhídrico „ 6. 00
 Percloruro de fierro líquido „ 8. 00
Toques.

Dos ó tres veces en el día.

Dr. Ciro M. Santelices.	Querétaro.
Acido fénico.....	gram. 2. 00
Alcanfór.....	„ 1. 00
Aceite de olivo.....	„ 8. 00
Glicerina.....	„ 8. 00

Toques.

Tres veces al día.

Angina crónica.

Dr. A. Aizpuru.	México.
Glicerina.....	gram. 50. 00
Solución oficial de percloruro de fierro.	gram. 50. 00

Toques.

Angina cremosa.

Dr. E. Gutiérrez.	Guadalupe, E. de Zacatecas.
Miel simple.....	gram. 20. 00
Acido bórico.....	„ 2. 00
Creolina.....	„ 0. 20

Toques.

Para dar toques cada cuatro horas, previo lavado con solución fénica al ½ %.

Angina ulcerosa.

Dr. M. Medal.	Tacámbaro, E. de Michoacán.
Antipirina.....	gram. 2. 00
Salicilato de sosa, de 2 á ..	„ 4. 00
Cocimiento de cebada. „	350. 00
Miel rosada.....	„ 30. 00

Gárgaras.

Para hacer gárgaras varias veces al día.

Angina de pecho.

Dr. Francisco Montes de Oca.	México.
Usaba la fórmula siguiente:	

Extracto de belladona....	gram. 0. 15
Cianuro de potasio.....	„ 0. 05

Para 15 píldoras.

Una ó dos por día en los días que no hay acceso y cuando este viene, una cada dos horas, y sobre la región precordial:

Bálsamo tranquilo....	gram. 100. 00
Cianuro de potasio....	„ 1. 00

Friega.

Dr. Francisco D. Maldonado.	Aguascalientes
Para evitar la vuelta ó repetición del acceso, usa:	

Sulfato de quinina....	gram. 2. 00
Acido arcenioso.....	„ 0. 03

Para 30 píldoras.

Dos ó tres píldoras diarias.

Dr. Demetrio Molinar.	Hidalgo del Parral.
Agua destilada.....	gram. 50. 00
Ioduro de potasio.. „	0. 50

Una toma.

Dr. Emilio Polo.	Puebla.
Tintura de Spigelia.....	VIII gotas.
Bromuro de potasio.....	gram. 1. 00
Agua endulzada.....	„ 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

Tintura cactus grand.....	X gotas.
Nitroglicerina al centésimo..	VI „

Agua..... grm. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

· Anticamnia..... grm. 1. 00

En 10 papeles.

Un papel cada hora.

Angina de pecho (falsa).

Dr. Jesús Villagrán. México.

Infusión de hojas de naranjo..... grm. 120, 00

Bromuros de potasio.....]

Idem „ sodio..... } de c c. „ 2. 00

Idem „ amonio.....]

Hidrato de cloral..... „ 4. 00

Jarabe de corteza de naranja amarga.. „ 40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta el efecto.

Angina diftérica.

Dr. Manuel F. Ocampo. Pinos, E. de Zacatecas.

Acido fénico puro..... grm. 1. 00

Alcanfór..... „ 2. 00

Solución de cocaina al 2 p.8 „ 5. 00

Glicerina..... „ 30. 00

Toques.

Para dar toques con un algodón cada dos horas

Dr. Juan N. Campos. Toluca.

Glicerina..... grm. 20. 00

Borato de sosa... „ 1. 00

Acido salisílico.. „ 0. 30

Toques.

Tocar varias veces al día, cambiando en cada toque la esponja con que se toque.

Un centígramo de sulfuro de calcio cada hora.

Anorexia.

Dr. José Torres.

México.

La tintura de Callea zacatechichi (simonillo, zacatechichi) es aperitivo eficaz é inocente, que se emplea en casos de anorexia, no dependiente de lesión material grave del estómago, en dosis de 30 ó 40 gotas una hora antes de cada alimento.

Antrax.

Dr. M. Mucél.

México.

Prefiere la no intervención quirúrgica: usa cataplasmas ó defensivos resolutivos y antisépticos.

Hacer con las pinzas tracciones suaves hasta dejar limpio de colgajos purulentos y luego hacer una curación con vaselina, iodoformada al 10 %, unida á la vaselina con fenato de sosa al 5 %.

Dr. Federico Coto.

La Paz, Baja California.

Desde luego hacer una incisión que comprenda todo el espesor de la piel y en seguida un lavatorio (con jeringa) en el fondo de la incisión con el líquido siguiente:

Agua destilada..... grm. 500. 00

Acido carbólico..... „ 10. 00

Extracto de Campeche.. „ 15. 00

Alcohol alcanforado..... „ 60. 00

Tintura de iodo..... „ 15. 00

Lavatorio.