

Cuando se han formado la serie de agujeritos que ordinariamente se ven en las antrax, se hará el lavatorio por todos estos trayectos,

Para disminuir la dureza se aplica un empaque de algodón empapado en alcohol alcanforado.

Dr. Pablo Amores.

Tabasco.

Inyecciones hipodérmicas de cocaina al rededor del tumor, no pasando de dos centigramos de sal en los tumores del cuello y cabeza, por temor á la proximidad del cerebro. Conseguida la anestesia se harán incisiones extensas en todo el tumor y luego una cauterización, sobre toda la parte gangrenada, con un pincel empapado en ácido fénico.

La curación debe consistir en una capa de polvo de alcanfor directamente en contacto con los tejidos, sobre el alcanfor una capa de algodón absorbente bien empapada en aceite de olivo fenicado al 5 %, esta capa debe cubrir el tumor y sobresalir en una extensión de tres á cuatro centímetros en su derredor, sobre el algodón se pone el protector de Lister, y sobre éste una gruesa capa de algodón salicilado ó iodoformado, su vendaje con vendas iodoformadas.

Este apósito debe cambiarse cada veinticuatro horas los primeros días, lavando muy bien las heridas con solución fenicada al 2 %.

Cuando toda la parte gangrenada ha caído y que todo queda reducido á una simple ulceración se continuará la curación de la misma manera, pero suprimiendo la capa de alcanfor y el algodón empapado



Jicama de puerco
Dolichos porcini o trifoliacea
Pag. 23

en aceite fenicado; poniendo en contacto con los tejidos el protector de Lister.

Artritis urica.

Dr. E. Lier. México.

Inyección hipodérmica de piperazidina 0, 10 por dosis y día.

Dr. Octaviano León Navarro. Tangantzicuaró,
E. de Michoacán.

ARTITIS CRÓNICO.

Alcohol á 80°.....	gm.	240. 00
Alcanfor.....	"	3. 00
Esencia de trementina..	"	30. 00

Friega.

Fricciones en las articulaciones.

Ascarides lumbicoides en los niños.

Dr. Octaviano León Navarro. Tangantzicuaró,
E. de Michoacán.

TUBÉRCULOS DE LA JICAMA DE PUERCO.

Dolichos porcinis ó trifoliácea..	gm.	120. 00
Jarabe simple.....	c. b.	

Para tomar.

Se hace una emulsión con los tubérculos desprovistos de su cubierta coriacea; desecha la pulpa en cocimiento de raíz de poleo (menta pulegium) se le agrega el jarabe y se toma media hora después una onza de aceite de recino.

Dr. José B. López. Campeche.

Cocimiento de spigelia.....	gm.	120. 00
Carbonato de sosa.....	"	0. 20

Jarabe de menta..... grm. 30. 00

Para 3 tomas.

Una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche y al día siguiente en ayunas un purgante de aceite de recino de 45 á 60 gramos.

PARA LOS NIÑOS DE 2 Á 5 AÑOS.

Santonato de sosa..... grm. 0. 05

Azúcar de leche..... „ 0. 20

En 3 papeles.

Uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche, y al día siguiente un purgante de maná.

Asficcía.

POR LOS GASES QUE SE DESPRENDEN EN LA EXPLOSIÓN
DE LA PÓLVORA GIGANTE.

Flagelaciones de agua fría al epigástrico, y desde que el enfermo pueda pasar la medicina; tintura de nuez vómica, diez gotas tres veces al día.

Aristolía cardíaca.

Dr. Francisco Blazquez. México.

Tintura de estrojanthus... grm. 15. 00

Gotas.

Diez gotas en la mañana y diez en la tarde.

Dr. Francisco M. Arroyo. Irapuato.

Infusión de digital.... grm. 120. 00

Dusetino..... „ 2. 00

Jarabe simple..... „ 15. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Erasmo O. Romero. Ozuloama.

Agua destilada..... grm. 120. 00

Cafeína..... „ 1. 50

Benzoato de sosa..... „ 2. 00

Jarabe de cinco raíces.... „ 20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Manuel Uribe. México.

Agua..... grm. 120. 00

Polvos de hojas de digital.. „ 0. 25

Hágase maceración por 12 horas, fíltrese y añádase

Oxímel escilítico..... grm. 30. 00

2 tomas.

Una toma por la mañana y otra por la tarde. Se repite por cuatro días, se suspende por cuatro y se vuelve á tomar de la misma manera hasta obtener el efecto.

Dr. L. Arroyo. San Angel, Distrito Federal.

ASITIS.

La infusión de ortiga, que vulgarmente llaman «ortiga prieta:» un pozuelo en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche.

Asma.

Dr. Pablo Gama. México.

Tintura de belladona..... grm. 0. 25

Idem „ ipecacuana..... „ 0. 80

Ioduro de potasio..... „ 0. 60

Jarabe simple..... „ 20. 00

Agua de lechuga..... „ 90. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos ó tres horas.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacan.

SINTOMÁTICO DE PADECIMIENTOS PULMONARES.

Ioduro de etila..... grm. 2. 00

En 5 cápsulas.

Para tomarlas en el día del acceso y durante los periodos de calma:

Ioduro de sodio..... gram. 2. 00

Jarabe de corteza de cidra.. „ 100. 00

Cucharadas.

Tres cucharadas en el día.

Dr. Arcadio T. Ojeda Veracruz.

Jarabe de cachimbo (1)..... gram. 120. 00

Bromuro de potasio..... „ 2. 00

Idem. „ sodio..... „ 2. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Pedro Acosta. Guadalajara.

Tricloruro de aldeida..... grm. 2. 00

Bromuro de potasio químicamente puro 2. 00

Ioduro de potasio..... „ 2. 00

Agua de azahar..... „ 200. 00

Tintura de belladona..... „ 3. 00

Cucharadas.

Cucharada cada media hora ó cada hora. Su autor recomienda esta fórmula como una especialidad.

(1) El cachimbo es una planta que se da silvestre en el estado de Veracruz y de la que no se ha hecho la clasificación botánica.

Dr. Francisco D. Maldonado Aguascalientes.

Agua de azahar..... grm. 130. 00

Ioduro de potasio..... „ 0. 50

Tintura de lobelia..... 20 gotas.

Jarabe..... c. b.

Cucharaditas.

Una cucharada cada media hora.

COMO ESPECTORANTE.

Oxido blanco de antimonio..... grm. 0. 20

Jarabe balsámico.. „ 40. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Durante el acceso, una ó dos inyecciones hipodérmicas de medio centígramo de clorhidrato de morfina

Fuera del acceso; un gramo del ioduro de potasio en una tasa de cocimiento de hojas de naranjo, endulzado dos veces al día; una hora después del desayuno y al acostarse.

Dr. Antonio J. Carbajal. México.

ASMA BONQUICO.

Gránulos dosimétricos de morfina 4.

„ „ „ hiosiamina 1.

„ „ arceniato de estriquina 2.

Una dosis

Repetirla cada media hora. Bastan dos ó tres tomas para calmar la dispnea. Hay que suspender obtenido el efecto. Seguir con los gránulos de estriquina en las comidas y con los de hiosiamina en la noche al acostarse.

Dr. Enrique Herrera Moreno Córdoba.
 Iodoformo de 05 á..... grm. 1. 00
 Cafeína..... „ 1. 00
 Extracto de belladona de 0, 10 á „ 0. 20
En 20 píldoras.

Una píldora cada hora.
 Cuando el ataque es muy brusco una inyección de morfina.

Astenia cardiovascular.

Dr. Miguel Cordero México.
 Infusión de folículos de sen..... grm. 500. 00
 Bitartrato de potasa..... „ 32. 00
 Tártaro emético „ 0. 05
 Jarabe de maná..... „ 32. 00
Pozuelos.

Un pozuelo cada hora en combinación con los tónicos cardiacos (Dr. M. Jiménez.)

Atonía cardiaca.

Dr. Jesús Villagrán. México.
 Vino de Lacto-fosfato de cal de Dusarte.
 Otra:
 Benzoato de cafeína..... grm. 2. 00
 Sulfato de estriquina..... „ 0. 01
Para 20 cápsulas.

Una cápsula cada dos ó tres horas.

Otra.

Perlas de esparteína de Houdé.

Ataxia.

Dr. Emilio Polo. Puebla.
 DOLORES FULGURANTES EN LOS ATAXICOS.
 Tintura de gelcemiun..... 20 gotas.

Agua..... grm. 120. 00
Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Anticamnia..... grm. 1. 00
En 10 papeles.

Un papel cada hora.

Atrófias hepáticas.

Dr. Manuel Carmona y Valle. México.
 Se combaten los accidentes dispépticos con las siguientes píldoras:
 Masa azul inglesa..... grm. 0. 50
 Extracto de hiel de buey.... „ 2. 00
 Extracto de opio..... „ 0. 20
En 20 píldoras

De tres á cuatro píldoras diarias, después de los alimentos.

Balanopostitis.

Dr. Miguel Cordero. México.
 Agua destilada..... grm. 200. 00
 Nitrato de plata cristalizado „ 2. 00
Para la curación

Hacer cada cuatro horas una inyección entre el prepucio y el glande, terminando la curación con otra inyección de agua hervida.

Blefaritis.

Dr. E. Gutierrez. Guadalupe de Zacatecas.
 Vaselina..... grm. 10. 00
 Lanolina..... „ 10. 00
 Aristol de dos á.... „ 4. 00
Pomada para los párpados.