

Dr. Enrique Herrera Moreno Córdoba.  
 Iodoformo de 05 á..... grm. 1. 00  
 Cafeína..... „ 1. 00  
 Extracto de belladona de 0, 10 á „ 0. 20  
*En 20 píldoras.*

Una píldora cada hora.  
 Cuando el ataque es muy brusco una inyección de morfina.

#### **Astenia cardiovascular.**

Dr. Miguel Cordero México.  
 Infusión de folículos de sen..... grm. 500. 00  
 Bitartrato de potasa..... „ 32. 00  
 Tártaro emético ..... „ 0. 05  
 Jarabe de maná..... „ 32. 00  
*Pozuelos.*

Un pozuelo cada hora en combinación con los tónicos cardiacos (Dr. M. Jiménez.)

#### **Atonía cardiaca.**

Dr. Jesús Villagrán. México.  
 Vino de Lacto-fosfato de cal de Dusarte.  
 Otra:  
 Benzoato de cafeína..... grm. 2. 00  
 Sulfato de estriquina..... „ 0. 01  
*Para 20 cápsulas.*

Una cápsula cada dos ó tres horas.

Otra.

Perlas de esparteína de Houdé.

#### **Ataxia.**

Dr. Emilio Polo. Puebla.  
 DOLORES FULGURANTES EN LOS ATAXICOS.  
 Tintura de gelcemiun..... 20 gotas.

Agua..... grm. 120. 00  
*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Anticamnia..... grm. 1. 00  
*En 10 papeles.*

Un papel cada hora.

#### **Atrófias hepáticas.**

Dr. Manuel Carmona y Valle. México.  
 Se combaten los accidentes dispépticos con las siguientes píldoras:

Masa azul inglesa..... grm. 0. 50  
 Extracto de hiel de buey.... „ 2. 00  
 Extracto de opio..... „ 0. 20  
*En 20 píldoras*

De tres á cuatro píldoras diarias, después de los alimentos.

#### **Balanopostitis.**

Dr. Miguel Cordero. México.  
 Agua destilada..... grm. 200. 00  
 Nitrato de plata cristalizado „ 2. 00  
*Para la curación*

Hacer cada cuatro horas una inyección entre el prepucio y el glande, terminando la curación con otra inyección de agua hervida.

#### **Blefaritis.**

Dr. E. Gutierrez. Guadalupe de Zacatecas.  
 Vaselina..... grm. 10. 00  
 Lanolina..... „ 10. 00  
 Aristol de dos á.... „ 4. 00  
*Pomada para los párpados.*

Dr. F. López.

México

## BLEFOSITIS CRONICA.

Vaselina blanca.....	grm. 5. 00
Lanolina.....	„ 5. 00
Zozoyodol sódico.....	„ 0. 02
Oxido amarillo de mercurio..	„ 0. 02

*Pomada para los párpados.***Blefarospasmo.**

Dr. Agustín Chacón.

México.

Agua destilada.....	grm. 5. 00
Muriato de cocaina.....	„ 0. 20
Sulfato de atropina.....	„ 0. 02

*Colirio.***Blenorragia.**

Dr. Pedro Peña.

Zamora. E. de Michoacán.

Glicerina.....	grm. 40. 00
Acido tánico.....	„ 1. 00
Agua.....	„ 40. 00

*Inyecciones.*

Se inyecta en la uretra una media geringa una vez al día, al acostarse el enfermo. Debe retener la inyección cinco minutos.

Dr. Rafael López.

México.

Agua destilada.....	grm. 500. 00
Bicloruro de mercurio.....	„ 0. 05
Alcohol.....	c. b.

*Inyecciones.*

Para inyectar la uretra con sonda de doble corriente y estando el líquido á una temperatura de 40°.

En la mujer:

Agua destilada.....	grm. 250. 00
Sulfato de zinc.....	„ 2. 50
Clorhidrato de cocaina.....	„ 1. 00

*Inyecciones.*

Dos veces al día.

Dr. Francisco D. Maldonado.

Aguascalientes.

Sulfato de zinc.....	} de c. c. grm. 1. 00
„ „ fierro.....	
„ „ cobre.....	
Agua de rosas.....	„ 200. 00

*Inyecciones.*

Una en la mañana y otra en la tarde.

Dr. Carlos M. Garza. S. Pedro de las Colonias. E. de Coahuila.

Agua destilada de rosas.....	grm. 300. 00
Bicloruro de mercurio.....	„ 0. 15
Sulfato de zinc.....	„ 0. 30
Alcohol.....	c. b.

*Inyecciones uretrales.*

Tres veces al día.

Dr. Gabriel Chavez.

Tasco.

Recina de copaiba.....	grm. 4. 00
Bromuro de alcanfor.....	„ 0. 40
Extracto tebaico.....	„ 0. 10
Polvo de orozus.....	c. b.

*Para 24 píldoras.*

Una píldora cada tres ó cada cuatro horas.

Dr. Miguel Cordero. México.

BLÉNORRAGIA URETRAL INSIPIENTE.

Vino rojo de suprema calidad..... grm. 200. 00

Tanino puro ..... „ 2. 00

*Inyecciones.*

Una inyección uretral cada tres horas orinando previamente.

Dr. Enrique M. González. Tequila.

Agua ..... grm. 200. 00

Glicerina ..... „ 60. 00

Tanino.. ..... „ 2. 00

Resorsina ..... „ 0. 50

Alcohol de Gaulteria... „ 1. 00

Láudano Sydenham... „ 3. 00

*Inyecciones.*

Una inyección tres veces al día, disminuyendo según el grado de la afección.

Dr. Juan C. Villaseñor. Morelia

Piridina ..... grm. 1. 20

Agua destilada..... „ 260. 00

*Inyecciones.*

Una inyección uretral en la mañana y otra en la tarde.

Otra:

Bálsamo de copaiba... ..... grm. 4. 00

Agua destilada.. ..... „ 180. 00

Una yema de huevo.....

Emulsióñese y agréguese:

Extracto de belladona..... gram. 0. 50

Sulfato de zinc ..... „ 0. 50

Agua de laurel cerezo..... „ 4. 00

*Inyecciones.*

Una inyección uretral cuatro veces al día.

Dr. Constancio Mota Puruándiro.

Permanganato de potasa..... grm. 1. 00

Agua..... „ 1000. 00

*Inyecciones.*

Una inyección uretral nueve veces al día en el periodo agudo y una cada vez que haya escozor en el periodo crónico.

Dr. Manuel F. Ocampo. Pinos.

Agua destilada de lechuga..... grm. 250. 00

Sulfoictiolato de amonio ..... „ 10. 00

*Inyecciones.*

Una inyección uretral cuatro veces al día

Al interior: un gramo de ictiol con otro de gen-  
ciana cada 24 horas.

Dr. Federico Abrego México.

EN LA FORMA CRÓNICA.

Instilaciones uretrales tres veces al día con un gramo de la siguiente solución

Agua destilada..... grm. 100. 00

Acetato de plomo..... „ 4. 00

„ „ zinc.... „ 4. 00

Dr. M. Mucél México.

En la forma crónica usa las inyecciones uretrales de óxido pirogálico, permanganato de potasa y sulfato de zinc á dosis convenientes. Recomienda el sus-pensorio y un buen régimen dietético.

Dr. Francisco Hernández Medellín.

En la forma crónica usa al interior como bebida el cocimiento de raíz rascapetate (30 para 1500) beju-co que se dá en los terrenos bajos de Medellín y del cual no se ha hecho la clasificación; y para inyeccio-nes.

Agua destilada.....	gram.	60. 00
Sulfato de Zinc.....	"	0. 04
Agua gomosa y agua de laurel cerezo de c c		15. 00
Tintura tebaica.....	"	7. 00

*Inyecciones*

Tres inyecciones uretrales en el día.

**Blenorragia crónica.**

Dr. E. Lier. México.

Lisol de gram. 0 05 á.....	gram.	0. 50
Extracto de hidrastis.....	"	5. 00
Agua destilada.....	"	100. 00

*Inyecciones uretrales.*

Dr. J López Tello Amecameca E. de México.

Jarabe de pino	} de c. c.....	gram. 30. 00
" " opio		
Bálsamo de copaiba.....	"	4. 90

*Cucharadas.*

Tres ó cuatro repartidas en las 24 horas.

Agua destilada..... gram. 100. 00

Nitrato de plata cristalizado.. „ 0. 05

*Inyecciones.*

Una inyección uretral, cada 24 horas.

Dr. Pedro Peña Zamora. E. de Michoacán.

Agua destilada..... gram. 100. 00

Salicilato de mercurio..... „ 0. 05

*Inyecciones.*

Tres en el día.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Agua..... gram. 200. 00

Sulfato de zinc..... „ 1. 00

Bálsamo negro..... „ 4. 00

*Inyecciones.*

Una inyección uretral tres veces al día.

Otra:

Iodoformo..... gram, 2. 00

Manteca de cacao. c. b.

*Para 15 papeles.*

Una candelilla en la uretra tres veces al día.

Dr. Desiderio G. Rosado. Comacalco, Tabasco.

Esencia de cubeba, 15 gotas.

Polvo fresco de mático de Tabasco... gram. 3 75

*En 15 cápsulas*

De cuatro á ocho cápsulas por día.

Permanganato de potasa..... gram. 0. 20

Sulfato de zinc..... „ 1. 00

Agua..... „ 345. 00

*Inyecciones.*

Cuatro inyecciones uretrales en el día, procurando que sea bañada toda la uretra.

**Bromismo.**

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes.

Para evitar la erupción que produce el uso continuado del bromuro de potasio, dar el licor arsenial de Towler.

**coneumonía.**

Dr. M. Mucel. México.

Medicina sintomática adecuada á la constitución del enfermo.—Tónicos del corazón.—Revulsivos cuando hay tendencia á la propagación del padecimiento ó á la no resolución franca.—Fosfuro de zinc con extracto de quina al fin del primer septenario.

Extracto de quina..... grm. 1. 50

Fosfuro de zinc..... „ 0. 75

*En 15 píldoras.*

Una píldora cada tres horas.

En la convalecencia vino de quina y colombo de Bellini.

En los niños cuando la bronquitis predomina: un milígramo de calomel cada dos horas y sudoríficos con pilocarpina, vigilando mucho sus efectos.

Dr. José Torres. México.

*EN LOS NIÑOS.*

Calomel..... grm. 0. 10

Fosfuro de zinc..... „ 0. 01

Azúcar ó Dower.

*En 10 papeles.*

Un papel cada dos ó tres horas. Dar siempre un tónico; de preferencia sulfato de estriquina en gránulos sellados ó la cafeína disuelta en benzoato de sosa. Casi nunca usar revulsivos y si se usan preferir á los vegigatorios el bioduro de mercurio.

Dr. Pedro Acosta.

Guadalajara.

*EN LOS NIÑOS.*

Polvos de ipecacuana.... grm 00

Tintura de Brionía..... 3 gotas

Idem de digital..... 3 „

Jarabe de lactucario..... grm. 60. 00

*Cucharaditas.*

Una cucharadita cafetera cada hora.

Proporcionar las dosis á la edad del niño. Revulsivos locales con vegigatorios volantes ó colodión cantaridado ó emplasto de thapsia gargánica.

**Bronquitis catarral.**

Dr. Francisco Fernández.

Medellín.

Polvos de Dower..... grm. 2. 00

Idem eucaliptus..... „ 2. 00

Agua gomosa..... „ 125. 00

Jarabe tolú..... „ 20. 00

Idem codeína..... „ 20. 00

*Cucharaditas.*

Una cada dos horas.

Otra:

Iodo puro.....	gram.	1.00
Creosota.....	„	1.00
Bálsamo de tolú.....	„	3.00
Masa de Synoglosa.....	„	2.00

*En 50 píldoras.*

Una cada dos horas.

En la convalecencia.

Arseniato de sosa.....	gram.	0.10
Agua destilada.....	„	140.00

*Cucharaditas.*

Una antes de cada comida.

Dr. José María Dávila.	Mazatlán.
Antipirina.....	gram. 2.00
Extracto fluido de jaborandi....	„ 4.00
Polvos de Dower.....	„ 1.00
Infusión de borraja.....	„ 100.00
Jarabe de tolú.....	„ 40.00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Dr. Angel Nieto. Palmarejo.

FORMA CONGESTIVA.

Infusión de hojas de eucaliptus..	gram. 300.00
Kermes mineral.....	„ 0.20
Jarabe de morfina.....	„ 30.00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Dr. Manuel F. Ocampo.

Pinos.

Un gramo de eucaliptina de Lebrun en inyección hipodérmica cada veinticuatro horas. Se puede continuar el tratamiento por un mes sin inconveniente.

Dr. M. Mucel.

México.

En la forma crónica que producen los enfisematosos.

Gránulos de iodoformo de un milígramo.

Idem de sulfuro de calcio.

Idem de sulfato de estricnina de ½ milígramo.

Uno de cada clase cada dos horas.

Agua.....	gram.	100.00
Extracto de polígala....	„	1.00
Benzoato de sosa.....	„	4.00
Alquitran de Guyot....	„	5.00
Jarabe codeína.....	„	45.00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora ó cada dos horas según lo abundante de la expectoración. Revulsivos de tela de thapsia gargánica ó de tela de cantaridato de sosa, si hay indicacion, cuidando los órganos urinarios. Al usar el parche de thapsia, no calentarlo, cubriéndolo con un pedazo de tela emplástica más grande para fijarla y limitar su acción; y al quitarlo poner cold-cream para calmar la comezón.

Cuando la bronquitis toma una forma asmática, añadir á las cucharadas agua de laurel cerezo y tintura de marihuana á dosis convenientes.

En la convalecencia dar ioduro de potasio.

Dr. Federico Abrego. México.

BRONQUITIS CRÓNICA.

✓ Goma amoniaco ..... grm. 1.00  
 Polvos de Dower ..... „ 1.00

*En 15 píldoras.*

Una píldora cada hora.

Dr. G. Chávez. Tasco.

POCIÓN ESPECTORANTE.

Cocimiento de yerba dulce y de  
 polígala ..... grm. 125.00  
 Aceite de almendras dulces.... „ 15.00  
 Polvos de Dower ..... „ 0.25  
 Jarabe balsámico ..... c. b.

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes.

PARA CALMAR LA TOS CUANDO ES MUY FUERTE.

Agua de laurel cerezo.. grm. 1.00  
 Polvos de Dower ..... „ 0.40  
 Infusión de polígala.... „ 120.00  
 Jarabe balsámico ..... „ 30.00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Dr. Carlos M. Garza. S. Pedro de las Colonias, Coahuila.

EN LOS NIÑOS.

Poción gomosa ..... grm. 50.00  
 Jarabe de tolú ..... „ 50.00

Extracto de belladona.. „ 0.02  
 Tintura de ipeca..... „ 1.00  
 Elixir paregórico..... 5 gotas

*Cucharaditas.*

Una cucharadita cada dos horas para los niños menores de un año y doble cantidad para los mayores de uno.

Dr. Alfredo Higareda. Huexotzingo, Puebla.

Ha usado con brillante resultado un jarabe hecho con la corteza y madera de un árbol llamado Capulín Chataí (1) En los casos de bronquitis capilar ha obtenido también siempre brillantes resultados.

Dr. Francisco Fernandez. Medellín, E. de Veracruz.

Polvos de Dower y de euca-  
 liptus..... de c. c.... grm. 2.00  
 Agua gomosa ..... „ 125.00  
 Jarabe de Tolú y de codeína  
 de c. c..... „ 20.00

*Cucharaditas.*

Una cucharadita cada dos horas.

Otra,

Iodo puro y creosota.... de c. c.... grm. 1.00  
 Bálsamo de Tolú ..... „ 3.00  
 Masa de sinoglosa ..... „ 2.00

*Para 50 píldoras.*

Una píldora cada dos horas.

(1) Este árbol se da silvestre en la tierra caliente y la gente dice que en sus hojas están muy marcadas sus virtudes medicinales.

## EN LA CONVALECENCIA.

Arseniato de sosa.....	gram.	0. 10
Agua destilada.....	"	140. 00

*Cucharaditas.*

Una cucharadita antes de cada comida.

Dr. Salvador F. Alcalá.		Tecolotlán.
Terpina.....	gram.	2. 00
Sulfonal Bayer.....	"	2. 00
Cocimiento de raíz de polígala.....	"	100. 00
Jarabe de codeína.....	"	30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada dos horas.

Uno á dos gramos de fenacetina en las 24 horas para bajar la temperatura.

Dr. Jesús H. Treviño.		Monterey.
Jarabe de goma.....	gram.	250. 00
Tintura alcohólica de flores de gordolobo.....	"	30. 00
Clorhidrato de amoníaco.....	"	2. 00
Elíxir paregórico.....	"	1. 00
Colórese con grana y fíltrese.		

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

**Bronquitis catarral.**

Dr. Jesús Villagrán.		México.
Extracto de polígala.....	gram.	0. 30
Id. tebaico.....	"	0. 10
Kermes mineral.....	"	0. 10

*Para 12 píldoras.*

Una píldora cada dos horas.

## Otra.

Dr. Enrique Hernández Moreno. Córdoba. Veracruz.

Infusión de polígala al 1%.....	gram.	120. 00
Alquitrán de Guyot.....	"	10. 00
Carbonato de amoníaco.....	"	1. 50
Extracto de opio.....	"	0. 05
Jarabe de ipeca.....	"	30. 00

*Cucharadas.*

Una cada hora.

Se puede sustituir el alquitrán por un gramo de eucaliptus, agregando goma c. b. para emulsionar.

En los niños es frecuente ver que el uso de los vomitivos de ipecacuana permanece sin resultado, y la conducta más prudente en este caso es cubrir la caja torácica con paños empapados en agua caliente hasta la rubefacción, y si es necesario, usar embrocaciones de tintura de iodo. El niño debe ser puesto en una pieza de temperamento libre y uniforme; ésto se consigue fácilmente usando el pulverizador y haciéndolo funcionar con agua alquitranada.

**Bronquitis aguda.**

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Polvos de Dower 0. 40 centígramos, en un pozuelo de cocimiento de flor de sauco endulzado. Tomar esta dosis en la mañana á las nueve y otra igual al acostarse.

**Bronquitis crónica.**

El mismo autor.

Infusión de hojas de digital.... gram. 120. 00

Kermes mineral .....	„	0. 30
Jarabe de clorhidrato de morfina .....	„	30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Dr. Salvador F. Alcalá.	Tecolotlán
Terpina .....	gram. 2. 00
Sulfonal Bayer .....	„ 2. 00
Cocimiento de raíz de polígala .....	„ 100. 00
Jarabe de codeína .....	„ 30. 00
Alcohol c. b.	

*Cucharadas.*

Una cucharada cada dos horas.

Uno ó dos gramos de Fenacetina en las 24 horas para bajar la temperatura.

Dr. Demetrio Molinar.	Parral.
Infusión de polígala .....	gram. 120. 00
Kermes mineral .....	„ 0. 10
Bálsamo de copaiba .....	„ 0. 10
Jarabe de morfina .....	„ 30. 00
id. de tolú .....	„ 30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada media hora.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.	Tehuacán.
En los niños:	
Infusión de raíz de polígala . . .	gram. 100. 00
Sesquicarbonato de amoniaco..	„ 0. 05
Jarabe de sábia de piño .....	„ 40. 00

*Cucharaditas.*

Una cucharadita cada hora.

Cuando la tos es demasiado violenta ó produce gran excitación:

Lamedor blanco .....	gram. 100. 00
Extracto de beleño .....	„ 0. 50
Agua de laurel cerezo .....	„ 0. 50
Jarabe de sábia de pino .....	„ 50. 00
Clorhidrato de narceína .....	„ 0. 05

*Cucharaditas.*

Una cucharadita cada hora.

Dr. Ernesto Chavez.	Córdoba.
Infusión de polígala .....	gram. 40. 00
Jarabe de goma .....	„ 40. 00
id. balsámico .....	„ 40. 00
Polvos de Dower .....	„ 2. 00
Agua de laurel cerezo .....	„ 8. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada dos horas.

Otra.

Kermes mineral .....	gram. 0. 40
Extracto de opio .....	„ 0. 20
id. de belladona .....	„ 0. 20

*En 20 píldoras*

Una píldora cada dos horas.

Otra.

Cuando se acompaña de asma.

Iodoformo .....	gram. 0. 40
Extracto de opio .....	„ 0. 20
id. de belladona .....	„ 0. 20

*En 20 píldoras.*

Una píldora cada dos horas.

Dr. Miguel Cordero. México.

En la bronquitis seca.

Agua esterilizada..... grm. 200. 00  
 Clorhidrato de amoniaco..... „ 2. 00

*Inhalaciones.*

Con un pulverizador de vapor adecuado, haciendo cada inhalación por espacio de diez minutos tres veces al día.

Agua destilada..... grm. 100. 00  
 Clorhidrato de amoniaco..... „ 2. 00  
 Carbonato de sosa..... „ 2. 00  
 id. de amoniaco..... „ 2. 00  
 Jarabe simple..... „ 30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora. (Dr. Liceaga.)

Dr. Manuel S. Soriano. México.

Infusión de polígala de virginia. grm. 125. 00  
 Goma arábica en polvo..... „ 4. 00  
 Salicilato de sosa..... „ 4. 00  
 Tintura de lobelia inflata..... „ 4. 00  
 Acetato de amoniaco..... „ 8. 00  
 Jarabe balsámico..... „ 30. 00  
 id. de morfina..... „ 30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada media hora.

Dr. Juan C. Villaseñor. Morelia.

Sulfato de morfina..... grm. 0. 15  
 Extracto de beleño..... „ 0. 50

Terpina..... „ 1. 50

*En 15 píldoras.*

Una píldora cada dos horas.

Otra.

Agua de laurel cerezo.... grm. de 4 á 8. 00  
 Terpina ó terpinol..... „ de 1 á 2. 00  
 Bromuro de amonio..... „ 0. 50  
 Jarabe de morfina..... „ 30. 00  
 id. de hidrato de cloral „ 30. 00  
 Alcoholado de meliza.... „ 30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora ó cada dos horas.

Dr. Juan José Ramírez de Arellano. México.

BRONQUITIS CAPILAR EN LOS NIÑOS.

Vegigatorios precisamente en la cara antero-inter-  
 na de los brazos.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Oxido de Zinc..... grm. 0. 60  
 Extracto de orozús pulverizado.. „ 0. 50  
 id. de belladona... „ 0. 05  
 id. de opio..... „ 0. 05

*En 8 papeles*

Un papel en la mañana y otro en la tarde en agua  
 tibia con jarabe de tolú.

Dr. Benjamin Rosano. Mineral del Monte.

BRONQUILLIS EN LOS NIÑOS.

Lamedor blanco..... grm. 60. 00  
 Citrato de potasa.... „ de 0. 30 á 2. 00

Vino de ipeca..... „ de 1. 00 á 4. 00

Jarabe de tolú..... „ 20. 00

*Cucharaditas.*

Una cucharadita cada hora.

Dr. Erasmo O. Romero. Ozuloama

BRONQUITIS EN LOS VIEJOS.

Bálsamo de tolú..... grm. 5. 00

Alcohol á 90°..... „ 15. 00

Disuélvase y agréguese

Jarabe de goma..... „ 60. 00

id. de morfina..... „ 30. 00

Kermes mineral..... „ 0. 15

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

BRONQUITIS EN LOS NIÑOS.

Agua hirviendo..... grm. 100. 00

Polvo de raíz de ipeca..... „ 0. 50

Hágase infusión y agréguese

Nitrato de potasa..... „ 1. 50

Jarabe de tolú..... „ 15. 00

*Cucharaditas.*

Una cucharadita cada hora.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

**Bronquitis crónica con hemoptisis.**

Jarabe de hipofosfito de cal; una cucharada grande en un vaso de leche, todas las mañanas en ayunas.

Gránulos de arseniato de potasa de un milígramo,

de 3 á 10 por día, ó solución arsenical de Fowler, de 5 á 15 gotas diarias.

Si la tós es muy tenás:

Clorhidrato de morfina..... grm. 0. 05

Bicarbonato de sosa..... „ 2. 00

Agua destilada..... „ 200. 00

Jarabe de orozús..... „ 30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Juan C. Villaseñor. Morelia.

BRONQUITIS CRÓNICA EN LOS ENFISEMATOSOS.

Ioduro de potasio.... grm. de 0. 20 á 0. 40

Id. de amonio..... „ de 0. 10 á 0. 20

Tintura de beleño..... „ de 1. 00 á 2. 00

Infusión pectoral..... „ 60. 00

Jarabe de morfina.... „ 30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Otra.

Extracto de valeriana..... grm. 0. 50

Id. de hojas acónito.... „ 0. 05

Id. de belladona..... „ 0. 10

*En 5 píldoras.*

Una píldora cada dos horas.

Revulsivos cutáneos en la caja torácica.

Una vez dominada la tós, se usará de los balsámicos y modificadores de la mucosa brónquica: terpinol, eucaliptus, etc.