

Si hay disnea se emplearán las inhalaciones de piridina de 5 á 15 gotas.

Cuando domina el elemento nervioso, se empleará la fórmula siguiente:

Hidrolado de tilia.....	gram.	30. 00
Id. de lechuga.....	„	30. 00
Ioduro de sodio.....	„	0. 40
Id. de potasio.....	„	0. 20
Id. de amonio.....	„	0. 15
Gránulos de hiosiamina de ½ miligramo.....	de „	4 á 8. 00
Jarabe de morfina.....	„	30. 00

Cucharadas

Una cucharada cada hora.

Calambres.

Dr. M. Mucél.	México.
Opodeldoc líquido.....	gram. 75. 00
Tintura de opio.....	„ 20. 00
Cloroformo.....	„ 5. 00

Friega.

Cálculos vesicales.

Dr. Alfredo Higareda. Huejotzingo. E. de Puebla.

Ha podido comprobar una vez la disolución de un cálculo de la vejiga, tratado por la infusión de un bejuco llamado, bejuco ala de murciélago, tomado al interior y en lavatorios vesicales.

La existencia de este cálculo se habia comprobado con la sonda y era de regular tamaño.

El bejuco ala de murciélago se da en la costa de Sotavento.

Callos.

Dr. Leonides E. Jonguitud.	Tenancingo.
Colodión elástico.....	gram. 2. 00
Acido salicílico.....	„ 1. 00
Id. láctico.....	„ 1. 00

Mésclese y rotúlese: *Uso indicado.*

Se aplica por cuatro ó seis días con una pluma lavada ó con un pincel por mañana y noche, sobre toda la superficie del callo, y para favorecer su desprendimiento, tomará el paciente un baño de piés.

Dr. E. Lier.	México.
Ácido láctico y.....	
Ácido salicílico de c. c.....	gram. 1. 00
Colodión.....	„ 8. 00

Solución.

Dr. Federico Cota. La Paz, Baja California.

En los callos de las manos, en los obreros y en los panadizos, cuando se inflaman los trato por la inmersión de la mano en agua tibia saturada de sal. Después que la piel se arruga todo trabajo flegmático ha desaparecido.

Canalización.

Dr. M. Mucél. México.

Prefiere al tubo de canalización que lastima y se descompone en la herida, las mechas antiguas; pero hechas con la gasa fenicada ó iodoformada é impregnadas de vaselina boricada al 5% ó de cualesquiera otra pomada aséptica.

Cáncer.

TRATAMIENTO PALEATIVO LOCAL DEL CÁNCER UTERINO.

Dr. A. J. Carbajal. México.

Polvo de hojas de tlalchichinoli:
 Toumeforlie Mex..... grm. 90. 00
 Salol..... „ 30. 00

Uso indicado

Después de una inyección abundante (grm 500. 00) de solución fenicada al 1%, aplicar el polvo sobre la parte ulcerada precisamente secada con algodón salicilado.

Cubrir toda la superficie y poner un tapón del mismo algodón. Curación diaria.

Se modera notablemente el flujo y la hemorragia.

Cáncer del recto.

Dr. Demetrio Molinar. Hidalgo del Parral.

Extracto de cicuta..... grm. 2. 50
 Ioduro de potasio..... „ 5. 00
 Polvo de altea c. b.

En 50 píldoras.

Tres píldoras repartidas en el día.

Agua destilada..... grm. 200. 00
 Ácido salicílico..... „ 2. 00
 Alcohol c. b. Lavativa.

Una cada tercer día.

Cancroide.

Dr. Severo L. Guerrero. Matamoros.

Calamina..... } de c. c. partes iguales.
 Mirra pulverizada..... }

Para aplicar sobre la ulceración.

Dr. Alberto Aizpuru. México.

Aristol..... grm. 5. 00
 Glicerina..... „ 50. 00

Para aplicarlo localmente.

Cancerosos.

Dr. Leonardo Gómez. Tenango. E. de México.

Curare..... grm. 0. 06
 Agua destilada..... „ 5. 00
 Acido clorhídrico..... 1 gota.

Inyección en el tumor, de dos gotas cada seis días, y exteriormente una partícula de potasa cáustica, del tamaño de la cabeza de un alfiler. Los dolores cesan y el tumor se funde.

Carie de las muelas.

Dr. Francisco M. Arroyo.—Irapuato. E. de Guanajto.

Alcohol nítrico..... grm. 10. 00
 Antipirina..... „ 0. 05

Uso externo.

Un algodón empapado en el líquido y colocado en la picadura.

Caquexia palustre.

Dr. Ramón Velasco. Tequila.

Extracto de genciana..... grm. 1. 00
 Ferrocitrato de quinina..... „ 1. 20
 Acido arsenioso..... „ 0. 05

En 10 píldoras.

Una píldora diaria con la comida.

Catarro naso-faringeo, crónico.

Dr. J. Collantes y B. México.

Gránulos de iodoformo de un milígramo.

Cuatro ó tres veces al día, durante varios días.

Catarro laríngeo en los niños.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

Acido fénico..... grm. 0. 60.

Agua destilada..... „ 300. 00

*Inhalaciones.***Catarro nasal.**

Dr. G. Parra. Tacubaya.

Borax..... grm. 4. 00

Subnitrato de bismuto..... „ 4. 00

Mentol..... „ 0. 50

*Rapé.***Catarro pulmonar crónico.**

Dr. Carlos Santander.—Salamanca. E. de Guanajuato.

Carbonato de amoníaco..... grm. 1. 00

Goma amoníaco..... „ 1. 00

Polvo de ipecacuana.. de 0. 10 á „ 0. 20

Clorhidrato de morfina de 0. 05 á „ 0. 10

Para 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Catarro intestinal.

Dr. Leandro Arroyo. San Angel.

Forma húmeda.

Fosfato de cal..... grm. 8. 00

Subnitrato de bismuto..... „ 8. 00

Extracto gomoso de opio..... „ 0. 05

En 8 papeles.

Docis: un papel cada dos horas.

Dr. Melesio Medal. Tacámbaro.

Forma húmeda.

Goma asafétida..... grm. 2. 00

Acido tánico..... „ 0. 15

Extracto de opio..... „ 0. 10

En 12 píldoras.

Docis: de cuatro á seis diarias.

Dr. Juan Collantes y Buenrostro. México.

Agua simple..... grm. 120. 00

Polvos de borax..... „ 2. 00

Glicerina neutra..... „ 30. 00

Jarabe simple..... „ 30. 00

Cucharadas.

Docis: una cucharada cada dos horas.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

CATARRO INTESTINAL CRÓNICO EN LOS NIÑOS MAYORES
DE 3 AÑOS.

Tanato de quinina..... grm. 0. 50

Alumbre..... „ 0. 50

Clorhidrato de narceína..... „ 0. 05

Polvo de azúcar..... „ 2. 00

En 10 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. Miguel Cordero. México.

Aceite fresco de ricino grm. 32. 00

Jarabe corteza de cidra „ 16. 00

Esencia de menta *dos gotas.*

Purgante en ayunas.

Subnitrato de bismuto puro grm. 4. 00

Bicarbonato de sosa „ 2. 00

Pancreatina pura „ 1. 00

En 12 cápsulas.

Una cápsula con cada alimento y por alimento leche, carne y huevos.

CATARRO GASTRO--DUODENAL.

Dr. M. Mucél. México.

Vomipurgante al principio, después Sal de Vichy ó de Carlsbad en cocimiento de Simonillo. Sobre todo si la congestión hepática es manifiesta.

Para la anorexia, licor de Baumé, diez gotas antes de cada comida.

En la convalecencia y en el catarro de las vías biliares, baños de vapor, si no hay contra indicación por otra enfermedad.

CATARO GÁSTRICO DOLOROSO.

Dr. Miguel Cordero. México.

Sal natural de las fuentes de Carlsbad grm. 30. 00

En 3 papeles.

Disuélvase un papel en 50 gramos de agua caliente que se tomará en ayunas con una hora de distancia del alimento.

Agua hervida grm. 1000. 00

Bicarbonato de sosa „ 5. 00

Lavatorio.

Para hacer el lavado del estómago y en seguida introducir por la sonda un gramo de subnitrato de bismuto en un poco de agua.

CATARRO GASTRO--INTESTINAL EN LOS ANÉMICOS.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Vino Jerez grm. 150. 00

Jarabe de genciana „ 30. 00

Lactato de fierro „ 2. 00

Cucharadas.

Una cucharada media hora antes de comer.

Cefalalgia.

Dr. Manuel S. Iglesias. Veracruz.

Antipirina grm. 2. 00

Bromuro de potasio „ 6. 00

Clorhidrato de morfina „ 0. 06

Para 6 píldoras ó cápsulas.

Una cada media hora, ó cada hora, según la intensidad del dolor.

Dr. Miguel Cordero México.

CEFALALGIA FRONTAL.

Aceite de almendras dulces grm. 30. 00

Eter acético „ 20. 00

Esencia de menta 4 gotas.

Defensivos.

Aplicar los defensivos sobre la frente cada dos horas hasta que se calme el dolor.

Cefalea

POR CATARRO NAZAL MAL CUIDADO.

Dr. M. Mucél México.

Los ha visto ceder por el uso del ioduro de potasio, hasta producir el catarro iódico.

Cirrosis hepática.

Dr. M. Mucél México.

PARA LA ACITIS, USA:

Cocimiento de hojas de sen....	gram.	300. 00
Crémor soluble.....	„	60. 00
Emético.....	„	0. 03

Para 3 tomas.

Una cada doce ó cada veinticuatro horas, según el efecto obtenido.

Repetidas punciones, si es necesario, y ayudarlas de los medios conocidos.

Dr. Antonio Carreon. Chalchicomula.

Tratándolas por el iodoformo al interior, ha visto desaparecer el derrame peritoneal y mejorarse los enfermos hasta salir del hospital como curados.

Cistitis.

CISTITIS BLENORRÁGICA.

Dr. M. Mucél México.

Siempre que el enfermo la tolere, usa la poción de Chopart, con el mejor éxito, y la cree superior á todo lo conocido.

CISTITIS BLENORRÁGICA SUB-AGUDA.

Dr. Juan C. Villaseñor. Morelia.

Cocimiento de pingüica.....	gram.	180. 00
Cloral hidratado.....	„ de 1 á 2.	2. 00
Antipirina de Knorr.....	„	2. 00
Jarabe de morfina.....	„	30. 00
Esencia de menta.....	„	3 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Para la misma enfermedad cuando hay CISTALGÍA.

Cloral hidratado.....	gram.	2. 00
Antipirina.....	„	2. 00
Bromuro de sodio.....	„	4. 00
Cocimiento de úera ursi.....	„	150. 00
Jarabe de morfina.....	„	30. 00
Agua de azahar.....	„	6. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Benjamin Treviño. S. Miguel Allende

Agua hervida.....	gram.	200. 00
Glicerina.....	„	50. 00
Goma tragacanto.....	„	1. 00
Iodoformo.....	„	5. 00

Inyecciones.

Una inyección intra-vesical cada tres días.

Dr. Guillermo R. Servín. Triunfo. Baja California

CISTITIS TRAUMÁTICA.

Salol.....	gram.	1. 00
------------	-------	-------

Resorsina.....	„	1. 00
Agua destilada.....	„	250. 00

Lavatorio.

Tibio y teniendo cuidado de hacer volver el líquido.		
Bicarbonato de sosa.....	gram.	5. 00
Salol.....	„	2. 00

En 12 papeles.

— Un papel cada tres horas disuelto en una tasa de agua de brea con unas gotas de esencia de sándalo.
Dieta láctea.

Con este método ha tratado su autor tres cistitis por herida de la vejiga, y en los tres casos se han curado los enfermos.

Dr. Alberto Aizpuru. — México.

CISTITIS CATARRAL CRÓNICA.

Polvo de goma c. b.		
Glicerina c. b.		
Trementina de Venecia cruda	gram.	0. 30

En 12 píldoras

Que se tomarán en 24 horas.

Dr. Federico Cota. — La Paz. Baja California.

CISTITIS CRÓNICA CON HIPERTROFIA DE LA PRÓSTATA.

Cocimiento de papa *solanum tuberosa*; como agua de uso.

El tenesmo vesical desaparece y la orina vuelve á tomar sus caracteres normales.

La papa se pone sin mondar y diariamente se renueva el cocimiento.

Cloasma uterino y pigmentaciones anormales.

Dr. E. Lier. — México.

Óxido de mercurio.....	gram.	0. 50
Id. de zinc.....	„	3. 00
Acido salicílico.....	„	0. 25
Aceite de ricino y		
Manteca de cacao de c. c.....	„	25. 00
Esencia de rosas.....	10 gotas.	

*Pomada.***Cloro-anemia.**

Dr. Ramón Ponce de León.—Culiacán. E. de Sinaloa.

Masa ferruginosa de Vallet.....	gram.	1. 20
Acido arsenioso.....	„	0. 03

Para 12 píldoras.

Dos píldoras con cada comida.

Esta fórmula ha dado buen resultado, especialmente en la cloro-anemia que sucede al envenenamiento paludeano.

Dr. M. Mucél. — México.

Hidroterapia y ejercicio al aire libre con moderación porque no á todos los anémicos les da buen resultado.

Preparaciones ferruginosas especialmente el ioduro de fierro de Blancard, ó el protocloruro de fierro de Rabuteau.

Otra:

Vino Jerez (bueno).....	gram.	700. 00
Agua de menta inglesa obteni-		
da por simple solución de la		

esencia piperita legítima..... „	200. 00
Citrato de fierro amoniacoal.... „	3. 00
Licor arsenical de Valaugin... „	50. 00

Cucharadas.

Una ó dos al día.

Dr. D. Molinar. Hidalgo del Parral.

Salicilato de fierro inyectable de Roussel de $\frac{1}{4}$ de jeringa á una jeringa diaria. Se aumenta cada tres días por cuartos de jeringa.

Clorosis.

Dr. Enrique Herrera Moreno.—Córdoba. E. de Veracruz.

Extracto de quina..... grm.	5. 00
Citrato ó carbonato de fierro.... „	5. 00
Extracto de belladona..... „	0. 50
Acido arsenioso..... „	0. 05

Para 100 píldoras.

Dos píldoras en cada comida, seis diarias.

El secreto para obtener éxito consiste en modificar las funciones digestivas administrando sobre todo el acido clorhídrico para combatir la hipoclorhidria.

La diarrea no contra indica el uso del fierro, bastando con sustituir la belladona con extracto de opio.

Dr. Desiderio G. Rosado. Comalcalco, Tabasco.

Permanganato de potasa..... grm.	0. 10
Sulfato de fierro cristalizado... „	1. 00
Agua filtrada..... „	316. 00

Acido clorhídrico..... „	1. 00
Glicerina..... „	28. 00

Cucharadas.

Cuatro cucharadas repartidas en el día, cada una en seis de agua ligeramente endulzada.

Otra:

Dr. Desiderio G. Rosado. Comalcalco, Tabasco.

Bicromato de potasa..... grm.	0. 10
Percloruro de fierro líquido..... „	14. 00
Tintura de iodo..... „	28. 00

Gotas.

De cinco á diez gotas cuatro veces al día, en agua gomosa.

Cólera asiático.

Dr. Luis R. Ruiz. Texcoco, E. de México.

COMO PREVENTIVO.

Desayuno: Cocimiento de yerbabuena con una cucharada de anisete.

Comida: Arroz y carne asada.

Cena: Uu poco de arroz y cocimiento de yerbabuena.

Ventilar las piezas y regarlas con tintura de eucaliptus. El agua que se tome, que sea hervida por dos veces.

MÉTODO CURATIVO.

Un posillo de aceite de olivo con una cucharada de vomí-purgante de Leroy, facilitando el vómito con agua tibia hasta que se devuelva el agua limpia, dando despues una taza de cocimiento de manzanilla y para los calambres una pomada de grasa y cal.

Cólera infantil.

Dr. Austasio Martínez. México.

Poción antiemética de Rivier.. grm. 120. 00

Subnitrato de bismuto..... „ 2. 00

Láudano de Sydenham 1 ó más
gotas según la edad.

Jarabe de corteza de cidra..... c. b.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Manuel Valdéz y Diaz.—Paso de Ovejas. E. de
Veracruz.

Infusión de manzanilla..... grm. 120. 00

Hidrato de magnesia..... „ 4. 00

Bicarbonato de sosa..... „ 2. 00

Láudano de Sydenham..... 8 gotas.

*Cucharaditas.*Una cada media hora hasta contener la basca y con-
tinuar cada hora alternadas con papelitos de 0, 15 de
subnitrato de bismuto.**Cólera esporádico.**

Dr. Austasio Martínez. México.

Cuando el pulso es pequeño y concentrado, que hay
enfriamientos y calambres muy dolorosos.

Poción antiemética de Rivier.. grm. 120. 00

Subnitrato de bismuto..... „ 4. 00

Láudano de Sydenham..... „ 1. 00

Tintura de nuez vómica..... 20 gotas.

Jarabe de éter sulfúrico..... grm. 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Tintura de drímis y de mostaza

de c. c..... grm. 30. 00

Tintura de nuez vómica..... „ 15. 00

Amoniaco..... „ 4. 00

Láudano de Sydenham..... „ 8. 00

Friega.

Para friccionar los miembros.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Infusión de hinojo..... grm. 120. 00

Subnitrato de bismuto..... „ 4. 00

Fosfato de cal..... „ 4. 00

Jarabe de corteza de cidra.... „ 30. 00

Láudano de Sydenham..... 20 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Colerina.

Dr. A. Monsivais. S. Luis Potosí.

Infusión de yerbabuena..... grm. 100. 00

Bicarbonato de sosa..... „ 2. 00

Láudano de Sydenham..... „ 1. 00

Jarabe de éter..... „ 30. 00

Subnitrato de bismuto..... „ 6. 00

*Cucharadas.*Una cucharada cada cinco minutos hasta que se
calmen los síntomas; retirándolas después progresi-
vamente.

La dosis de bicarbonato de sosa, debe estar en relación con la acidez de los vómitos.

Si hay gran postración, se agrega licor de Hoffman; y si persiste la diarrea, se añade salicilato de bismuto.

Dr. R. Ruiz.

Salvatierra.

Poción blanca.....	gram.	120. 00
Subnitrato de bismuto.....	„	4. 00
Láudano de Sydenham.....	„	1. 00
Jarabe de crameria.....	„	30. 00

Cucharadas.

Dosis: una cucharada cada hora.

Dr. R. Ortega.

Ciudad Porfirio Díaz.

Al principio, si la basca lo permite, un purgante de aceite de ricino con unas gotas de láudano, y en todo caso, las píldoras de la siguiente fórmula:

Salicilato de bismuto.....	gram.	5. 00
Naftol.....	de 1 á „	5. 00
Extracto de opio.....	de 1 á „	0. 20

En 20 píldoras.

Dosis: dos píldoras cada media hora hasta el efecto, suspendiendo ó alejando más las dosis según sea necesario.

Si hay basca, generalmente se suspende con trocitos de hielo, y si no dan resultado, se usa la fórmula siguiente:

Cocaína ó una de sus sales...de 1 á	gram.	0. 03
Extracto de opio.....de 2 á „	„	0. 05

En 10 píldoras.

Dosis: una cada 15 minutos hasta el efecto, y después una diez minutos antes de cada dosis de píldoras ó de cada alimento. Hay veces que es necesario ocurrir á las inyecciones de morfina. Por alimentos, huevos frescos, leche etc., etc. Por bebida agua fresca en pequeñas cantidades con un poco de mezcal, ginebra ó cognac. Una vez que se consigue constipar al enfermo no se debe mover el intestino en dos días, y al hacerlo, usar de lavativas de agua fría, pero por ningún motivo de purgantes que traen la repetición de la enfermedad.

Cólico.

Dr. D. Molinar.

Parral.

CÓLICO UTERINO.

Infusión de hojas de naranjo...	gram.	120. 00
Licor de Hoffman.....	„	2. 00
Tintura de riubarbo.....	„	10. 00
Jarabe de morfina.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Manuel Alfaro.

México.

CÓLICO SATURNINO.

Inyección hipodérmica en las paredes del vientre, de un milígramo de atropina y repitiéndola cada cuatro horas, hasta dominar el dolor.

La regularización de las funciones del intestino es consecutiva.

Dr. Manuel Villaseñor.

Pénjamo.

CÓLICO HEPÁTICO.

Aceite de olivo..... grm. de 200 á 300. 00

Purgante.

Baño general lo más caliente que se pueda tolerar.

Agua destilada..... grm. 60. 00

Gránulos de aconitina de Chan-
teau..... núm. 10Gránulos de codeina de Chan-
teau..... núm. 12

„ de hiosiamina de „ núm. 8

*Cucharaditas.*Una cucharadita cada cuarto de hora. Si no hay
mejoría, se repite el baño.

Dr. Juan N. Campos.

Toluca.

CÓLICO INTESTINAL POR PARÁLISIS.

Se administran alternando cada media hora, medio
milígramo de hiosiamina y la misma cantidad de sul-
fato de estricnina, hasta obtener una evacuación.

Dr. Guillermo R. Servín. Triunfo. Baja California.

Alcoholado de menta..... grm. 20. 00

Exalgina..... „ 2. 00

Bromhidrato de cafeína..... „ 0. 10

Alcoholado de aniz..... „ 20. 00

Clorhidrato de cocaína..... „ 0. 10

Alcohol para disolver la exalgina c. b.

*Gotas.*Diez gotas en una cucharada de agua cada media
hora hasta seis veces.

CÓLICO HEPÁTICO.

Dr. Federico Cota.

La Paz, Baja California.

Glicerina neutra..... grm. 30. 00

Esencia de menta.... 15 gotas.

Esencia de trementina 15 gotas.

Cloroformo..... „ 4. 00

Bicarbonato de sosa..... „ 1. 00

Jarabe de éter..... „ 20. 00

*Cucharaditas.*Una cucharadita cada hora ó cada media hora, en
una cucharada grande de atole ó de sagú.

Cocimiento de coca..... grm. 150. 00

Aceite de olivo..... „ 60. 00

Esencia de trementina 40 gotas

Láudano de Sydenham 15 gotas

Una yema de huevo.

3 lavativas

Repartidas en el día.

CÓLICO NEFRÍTICO.

Dr. Pablo Gama.

México.

Agua de lechuga..... grm. 150. 00

Agua de laurel cerezo..... „ 2. 00

Bálsamo de tolú..... „ 1. 00

Tintura de belladona..... „ 0. 50

Cloroformo..... „ 1. 00

Cucharadas.

Una cada media hora.

CÓLICO HEPÁTICO.

Dr. Emilio Polo.

Puebla.

Sulfato de berberina..... grm. 1. 00

Azúcar en polvo „ 100. 00

Mésclese.

Se toman de esta mezcla, grm. 0. 60 para 10 papeles.

Un papel cada hora.

Otra:

Gránulos de atropina de medio milígramo alternados con gránulos de podofilina de hora en hora.

El dolor cede con este tratamiento que descongestiona el hígado con las evacuaciones que produce.

Una vez dominado el ataque, se hará uso de los alcalinos.

CÓLICO NEFRÍTICO.

El mismo autor.

Tintura de berberis vulgaris... grm. 1. 00

Agua „ 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Si no se domina el dolor, se pone éter sulfúrico en la región venal y se dan al interior perlas de éter.

CÓLICO INTESTINAL.

Dr. M. Medal. Tacámbaro. E. de Michoacán.

Infusión de manzanilla y tilia.. grm. 175. 00

Licor anodino de Hoffman..... „ 8. 00

Jarabe de azahar „ 25. 00

Tintura de castor de 10 á 20 gotas.

Láudaro de Sydenham..... de 12 á 15 gotas.

Cucharadas.

Dos cucharadas cada 10 minutos.

Dr. Antonio J. Carbajal.

México.

CÓLICOS DE TIERRA CALIENTE.

Infusión de valeriana of. grm. 125. 00

Jarabe de naranja „ 15. 00

Láudano de Sydenham 10 gotas.

Eter sulfúrico 25 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada cuarto de hora.

No es prudente usar los purgantes antes de calmar el dolor muy agudo y esto se consigue con las cucharadas.

Dr. Antonio Matienzo.

Tampico

Clorhidrato de morfina..... grm. 0. 05

Clorhidrato de cocaina..... „ 0. 05

Jarabe..... „ 15. 00

Agua de menta..... „ 60. 00

id. cloroformada..... „ 60. 00

Cucharadas.

Una cada hora ó cada dos horas.

COLICOS EN LOS NIÑOS EN EL PERIODO DE LA LACTANCIA.

Dr. Antonio Carreón

Chalchicomula.

Jarabe de azahar grm. 90. 00

Cloral „ 0. 20

Esencia de hinojo 5 gotas.

Cucharaditas.

Media cucharadita cada hora y una cucharadita según la edad.