

Colitis.

Dr. Juan N. Campos.

Toluca

COLITIS CATARRAL.

Agua destilada.....	gram.	100. 00
Borax.....	"	1. 00
Solución fenicada al 10%.....	"	0. 20

Lavativas.

La mitad en la mañana y la otra mitad en la noche.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

COLITIS ULCEROSA.

Cocimiento de saragatona.....	gram.	500. 00
Clorato de potasa.....	"	8. 00
Glicerina.....	"	8. 00
Tintura de iodo.....	"	4. 00
Láudano de Rousseau.....	"	5. 00

Lavativas.

Dos lavativas al día, cada lavativa de un pozuelo precedida de una grande de agua caliente.

Dr. Federico Cota.

La Paz, Baja California.

COLITIS ULCEROSA.

Calomel.....	gram.	0. 20
Extracto de opio.....	"	0. 10
Extracto de crameria.....	"	0. 20
Ipeca.....	"	0. 20

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

Cocimiento de manzanilla.....	gram.	120. 00
Almidon.....	"	6. 00

Aceite de linaza.....	"	15. 00
Láudano Sydenham.....		15 gotas.

Lavativas.

Dividir en tres ó cuatro lavativas bien tibias que se aplicarán más ó menos lejanas según el tenesmo.

Agua de goma zámota.....	gram.	500. 00
Albumina.....	"	60. 00

*Agua de uso.***Colitis aguda.**

Dr. Jesús Villagrán.

México.

Solución de goma arábica.....	gram.	120. 00
Tintura de ipeca.....	"	1. 00
Jarabe de opio.....	"	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Colitis ulcerosa.

Dr. Elias Gómez.

Cuernavaca.

Calomel.....	gram.	0. 20
Polvos de ipeca.....	"	0. 20
Extracto de belladona.....	"	0. 08

En 20 papeles.

Un papel cada hora hasta tocar la encía ó producir la enteritis calomelánica. Dieta láctea. Después de tocar la encía:

Subnitrate de bismuto.....	gram.	6. 00
Clorato de potasa.....	"	5. 00
Polvo de ipeca.....	"	0. 15
Extracto de belladona.....	"	0. 08

En 12 papeles

Un papel cada dos horas.

Cuando las deposiciones han perdido su carácter disenteriforme.

Subnitrato de bismuto..... grm. 15. 00

Extracto de opio „ 0. 15

En 15 papeles,

Un papel despues de cada alimento (3 en el día.)

Si la enfermedad pasa al estado crónico:

Nitrato de plata cristalizado..... grm. 0. 15

En 15 píldoras.

Tres píldoras repartidas en el día lo mas lejos posible de los alimentos.

Diez gotas de tintura de amamelis virgínica tres veces al día antes de cada alimento.

Colitis disentérica.

Dr. Antonio J. Carbajal.

México.

Tratamiento local.

Agua destilada grm. 500. 00

Sulfato de zinc de 1 á..... „ 4. 00

Una lavativa.

Agua destilada grm. 500. 00

Tintura de iodo „ 2. 00

Ioduro de potasio „ 3. 00

Lavativas.

Agua destilada grm. 500. 00

Creolina de 1 á..... „ 2. 00

Lavativas.

Agua destilada grm. 500. 00

Nitrato de plata cristalizado de

0. 50 á..... „ 1. 00

Lavativas.

El modo de proceder es el secreto del éxito.

Acostar al enfermo del lado izquierdo con la pélvis levantada por una almohada no muy gruesa, inyectar con suavidad toda ó la mayor parte de la lavativa ligeramente tibia; terminado ponerlo en el decúbito supino por dos ó tres minutos y luego sobre el lado derecho.

No se necesita que permanezca la lavativa más de diez minutos.

La eficacia de las fórmulas está por órden.

En los casos de ulceración intestinal un poco antigua recurrir desde luego al nitrato de plata.

Dr. Miguel Cordero.

México.

Clorato de potasa grm. 10. 00

Bicarbonato de sosa..... „ 10. 00

En 20 papeles.

• Disuélvase un papel en 40 gramos de cocimiento de linaza espeso que se aplicará en lavativa después de cada evacuación sin contar la que sigue á la lavativa.

Condilomas puntiagudos.

Dr. E. Lier.

México.

Polvos de sabina.....

Alumbre calcinado.....

Sulfato de fierro.....

} de c. c. grm. 10. 00

Uso externo.

Conjuntivitis.

Dr. Agustín Chacón.

México.

Agua destilada grm. 500. 00

Ácido bórico „ 15. 00

Lavatorio.

Otra.
 Agua destilada grm. 500. 00
 Biclورو de mercurio „ 0. 20
Lavatorio.

Otra.
 Agua destilada grm. 500. 00
 Ácido salicílico de 1 á „ 2. 00
 Ácido bórico „ 15. 00
Lavatorio.

Otra.
 Agua destilada grm. 500. 00
 Acido fénico de 2. 50 á „ 5. 00
Lavatorio.

Otra.
 Agua destilada..... grm. 10. 00
 Nitrato de plata de 0. 05 á „ 0. 10
Colirio.

Otra.
 Agua destilada..... grm. 10. 00
 Sulfato de cobre de 0. 05 á „ 0. 10
Colirio.

Otra.
 Agua destilada..... grm. 10. 00
 Sulfato de zinc..... de 0. 05 á „ 0. 10
Colirio.

Otra.
 Agua destilada..... grm. 300. 00
 Sulfato de zinc de 0. 50 á „ 1. 00
Fomentos.

Otra.
 Agua destilada..... grm. 300. 00

Sulfato de cobre..... de 0. 50 á „ 1. 00

Fomentos.

Los fomentos fríos sobre los ojos y se aplican tres veces al día por 20 ó 30 minutos cada vez. Se tendrá cuidado de reemplazarlos por otras compresas frías antes de que se calienten.

Conjuntivitis Catarral.

Dr. F. López. México

Agua destilada grm. 10. 00
 Zozoyodolato de zinc.. de 0. 01 á „ 0. 02
 Clorhidrato de cocaina..... „ 0. 05

Gotas para los ojos.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

Agua destilada de rosas grm. 20 00
 Acido bórico..... „ 1. 00
 Clorhidrato de morfina..... „ 0. 25
Colirio.

Dos gotas tres veces al día.

Agua destilada..... grm. 200. 00
 Bórax..... „ 2. 00
 Bicarbonato de sosa..... „ 1. 00

Lavatorio.

Para lavar los ojos después del colirio anterior.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Nitrato de potasa 2 partes.
 id. de plata criztalizada 1 parte.

Fúndase y hágase lápiz.

Tocar con el lápiz una vez al día la conjuntiva palpebral.

Dr. José M.^a Bandera.

México.

AGUA OFBÁLMICA

Agua destilada esterilizada.....	gram.	200.	00
Bórax.....	„	4.	00
Clorato de potasa.....	„	1.	00

Lavatorio.

Lavatorio caliente en los ojos, cuatro veces al día.

Dr. Fernando López.

México.

CONJUNTIVITIS CATARRALES LIJERAS.

Agua destilada.....	gram.	10.	00
Extracto fluido de amamelis virgínica de 5 á 10			
			<i>gotas.</i>

Filtrese y rotúlese:
Gotas para los ojos.

Conjuntivitis flictenular.Dr. José M.^a Irys. S. Juan Bautista. E. de Tabasco.

Agua endulzada.....	gram.	120.	00
Cloruro de bario.....	„	0.	10

Cucharadas

Para consumir la dosis en 24 horas.

Cuando la fotofobia es muy intensa, se hace uso del colirio de Mojón.

Cloruro de bario.....	gram.	0.	60
Agua destilada.....	„	30.	00
Múcilago.....	„	8.	00
Láudano de Rousseau.....	„	2.	00

*Colirio.***Conjuntivitis purulenta.**

Dr. Francisco M. Arroyo.—Irapuato. E. de Guanajuato.

Agua destilada.....	gram.	10.	00
Nitrato de plata cristalizado.....	„	0.	05

Colirio.

Calomel.....	gram.	1.	00
Polvo fino de azúcar candi.....	„	0.	50

*Colirio.***Conjuntivitis en los escrofulosos.**

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe. Zacatecas.

Aceite de olivo.....	gram.	30.	00
Id. de cade.....	„	1.	00
Iodoformo.....	„	0.	30

Colirio.

Dos gotas al día.

Dr. L. Castro.

México.

Agua destilada.....	gram.	15.	00
Nitrato de plata.....	„	0.	20

Uso indicado

Se empapa un pincel en esta solución para tocar las pústulas, con lo que se consigue hacerlas abortar ó cuando menos apresurar su curación.

Conjuntivitis y Keratitis ulcerosa.

Dr. L. Arroyo.

San Angel, Distrito Federal.

Pomada de la viuda Farnier, untada en el borde de los párpados, una ó dos veces al día.

POMADA DE LA VIUDA FARNIER.

Mantequilla fresca.....	gram.	18.	00
-------------------------	-------	-----	----

Alcantór.....	„	0. 10
— Precipitado rojo.....	„	1. 00
Acetato de plomo.....	„	1. 00

*Pomada.***Congestión cerebral.**

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.	Tehuacán.
Poción gomosa.....	gram. 180. 00
Licor amoniacal anizado.....	„ 2. 00
Alcohol alcanforado.....	„ 2. 00
Jarabe simple.....	„ 18. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Lázaro Ortega.	México.
Agua destilada... ..	gram. 180. 00
Tartrato doble de potasa y sosa ..	„ 30. 00
Tártaro emético... ..	„ 0. 10
Jarabe de azahar.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Se puede usar también en los padecimientos inflamatorios del cerebro.

Congestión hepática.

Dr. M. Mucél.	México.
Purgante drástico, revulsivo de tela de Albespayers sobre la región hepática, y algunos días después Sal de Carlsbad en cocimiento de simonillo.	

Dr. Francisco D. Maldonado.	Aguascalientes.
En individuos no debilitados.	

Calomel.....	gram. 2. 00
Ruibarbo.....	„ 3. 00

En 2 papeles.

Dar el 2º papel tres horas después de dar el primero, si éste no ha hecho efecto purgante, y alimentar al enfermo con alimentos sin sal.

Congestion hepática pasiva acompañada de constipación.

Dr. Antonio J. Carbajal.	México.
Podofilina.....	gram. 0. 10
Extracto de coloquintidas com- puesto.....	„ 0. 20

En 10 píldoras.

Una píldora en la noche al acostarse.

Congestión pulmonar.

Dr. Juan José R. de Arellano.	México.
Agua destilada.....	gram. 500. 00
Crémor.....	„ 30. 00
Tártaro emético.....	„ 0. 05
Jarabe simple c. b.	

Pozuelos. (Dr. M. Jiménez.)

Un pozuelo cada media hora.

En general, en todas las congestiones que tienen por causa una lesión orgánica del corazón, son aplicables con buen resultado los pozuelos tartarizados de D. Miguel Jiménez.

Congestión del útero y sus anexos.

(VULGARMENTE INFLAMACION).

Dr. M. Mucel.	México.
Además de combatir la causa:	

Inyecciones vaginales de sub-acetato de plomo líquido, dos cucharadas en grm. 500. 00 de agua. Lenzos húmedos (una toalla empapada en agua fría y esprimida después) cubiertos de una tela impermeable ó de franela seca y renovados cada dos horas. Reposo en cama si es posible, ó muy necesario, y al interior una poción opiada ó mejor la anticamnia.

Comoción cerebral.

Dr. D. Molinar. Parral.

Agua destilada.....	grm.	150 00
Bromuro de potasio.....	„	2. 00
Id. de sodio.....	„	2. 00
Valerianato de amoniaco.....	„	0. 50

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Constipacion.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Combatir la causa y

Podofilina ...	grm.	0. 10
Miel.....	c. b.	

Para 5 píldoras.

Una al acostarse.

Dr. M. Alfaro. México.

Ha encontrado como signo de la sífilis latente, la constipación habitual. Dato muy importante y que ha comprobado por 30 años de práctica médica.

Dr. Jesús Villagrán. México.

Sal de Vichy.....	grm.	6. 00
-------------------	------	-------

Polvo de hojas de belladona..... „ 0. 30

Para 12 papeles.

Tres ó cuatro papeles repartidos en el día.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato

Podofilina.....	grm	0. 50
Extracto de belladona.....	„	0. 05
Sulfato de estriquina.....	„	0. 02

En 10 píldoras.

Una píldora al acostarse todas las noches.

Se suspende su uso por algunos días cuando hayan producido su efecto.

Dr. Carlos Amezcua. Tehuacán.

Extracto blando de ruibarbo.....	grm.	4. 00
Polvo de hojas de belladona.....	„	0. 30
Podofilina.....	„	0. 10
Polvos de Dower.....	„	0. 50

En 20 píldoras.

De dos á cuatro píldoras á la hora de acostarse.

Después de usarlas algunos días basta tomar una ó dos para obtener una evacuación fácil á la mañana siguiente.

Constipación habitual.

Dr. Miguel Cordero. México.

Cuando tiene por causa una atonía de la mucosa intestinal:

Extracto fluido de cáscara sagrada..	grm.	10. 00
--------------------------------------	------	--------

Gotas.

Dos gotas el primer día; aumentar igual cantidad los días siguientes hasta obtener el efecto.

Dr. Guillermo R. Servín.	Triunfo. Baja California.
Podofilina.....	gram. 0. 20
Extracto de belladona.....	„ 0. 03
Jabon Medicinal.....	„ 1. 00

En 10 píldoras.

Una píldora al acostarse; si no produce el resultado se toman dos.

Dr. Lázaro Ortega.	México.
Acíbar.....	gram. 0. 50
Calomel.....	„ 0. 50
Goma guta.....	„ 0. 50
Extracto de coloquintidas.....	„ 0. 50

En 10 píldoras

De una á cuatro al acostarse.

Dr. Manuel Uribe.	México.
Podofilina.....	gram. 0. 12
Extracto de belladona.....	„ 0. 12

En 12 píldoras.

De una á tres píldoras todas las noches al acostarse.

Contusiones.

Dr. Manuel de Anaya.	Guanajuato.
Cocimiento de hojas de nogal... .	gram. 500. 00
Alcohol alcanforado.....	„ 60. 00
Tintura de árnica.....	„ 60. 00
Extracto de Saturno líquido.....	„ 30. 00

Defensivos.

Que se deben cambiar con frecuencia.

Se pueden también aplicar en las fracturas mojan-
do las vendas.

Corazón, sus lesiones.

1er. PERIODO

Dr. E. Gutiérrez	Guadalupe. E. de Zacatecas
POCION ANTIESPASMÓDICA.	

Infusión de tilia.....	gram. 100. 00
Bromuro de sodio de 4 á.....	„ 8. 00
Extracto fluido de convalaria... .	„ 2. 00
Jarabe de éter.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Gránulos de iodoformo de un centígramo, de 6 á diez diarios.

2.º PERIODO.

POCION CARDIOTÓNICA.

Infusión de hojas de digital, 2 para..	gram 120. 00
Bromuro de alcanfor.....	„ 2. 00
Sulfato de esparteina de 5 á.....	„ 0. 10
Acetato de amoniaco.....	„ 10. 00
Jarabe de cafeina.....	„ 20. 00

Cucharadas.

Una cada hora.

O bién, píldoras cardiacas.

Iodoformo.....	gram. 0. 20
Cafeína.....	„ 0. 80
Tintura de estrofantus.....	15 gotas.

Para 10 píldoras.

Una cada hora.

INYECCIÓN HIPODÉRMICA DE CAFEINA,

Agua destilada.....	gram. 6. 00
Cafeína.....	„ 1. 50
Salicilato de sosa.....	„ 0. 50

Una ó dos jeringas diarias

INYECCION HIPODÉRMICA DE PILOCARPINA.

Agua destilada..... : grm. 9, 85
 Clorhidrato de pilocarpina..... „ 0. 15

Una ó dos jeringas por la noche.

Laxantes más ó menos frecuentes, de preferencia el calomel de 0. 40 á 0. 60

Régimen lácteo más ó menos riguroso, según el estado del riñon.

Corea.

Dr. Juan José Ramírez de Arellano. México.

COREA REUMATISMAL.

Ioduro de potasio á dosis fuertes según la edad del enfermo.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Asafétida..... }
 Extracto de genciana.... } de c. c. partes iguales.
 Polvo de raíz de valeriana }

Para hacer píldoras de 15 centigramos cada una.
 De seis á quince píldoras repartidas en tres tomas.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

Hidrato de cloral..... grm. 4. 00
 Bromuro de potasio..... „ 8. 00
 Jarabe de azahar..... „ 180. 00

Cucharadas.

Una cucharada tres veces al día en medio vaso de agua endulzada, sobre los alimentos. Pulverizaciones de éter sulfúrico sobre la columna vertebral.

Corea sintomática del artritisismo.

Dr. E. Liceaga. México.

Usa la fórmula siguiente con exelentes resultados.

Infusión de epazote.. grm. 120. 00
 Propilamina.... 1, 2 ó „ 3. 00 según la edad.
 Jarabe de canela..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cada hora, continuadas por muchos días.

Usadas al principio del mal, impide su desarrollo. Empleadas un poco más tarde abrevia la duración de la enfermedad.

Dr. M. Mucél. México.

Pulverizaciones de éter sulfúrico en el trayecto de la columna vertebral.

Al interior.

Salicilato de sosa y ioduro de potasio sucesivamente y á dosis adecuadas á la edad del paciente, terminando por la hidroterapia.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Antipirina y bromuro de potasio mezclados en partes iguales y hacer papeles de 0. 30 cada uno; para dar un papel dos veces al día en infusion de hojas de naranjo.

Dr. Austasio Martínez. México.

Bromuro de potasio..... grm. 4. 00
 id. de alcanfor..... „ 0. 20
 Valerianato de zinc..... „ 0. 60

Para 24 papeles.

Para tomar de dos á tres papeles en el día.

Una cucharada de vino de Hidalgo Carpio al empezar á comer.

Baños de regadera. Ejercicio al aire libre.

Alimentación nutritiva.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.

Tehuacán.

COREA EN LOS NIÑOS.

Agua destilada.....	gram.	10. 00
Licor arcenical de Fowler.....	„	10. 00
Clorhidrato de narceina.....	„	0. 05

Gotas.

Cinco á la hora de acostarse. Aumentar hasta ocho.

Creosotina iodada.

Dr. Manuel S. Soriano.

México

Creosota.....	gram.	30. 00
Iodo sublimado.....	„	2. 50

Creosotina iodada.

Usos y dosis son conocidos de todo médico.

Crup.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.

Tehuacán.

EN LOS NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS.

Clorhidrato de apomorfina....	gram.	0. 02
Agua destilada.....	„	100. 00

Inyecciones.

Divídase en cinco partes para poner una cada dos horas.

Dr. Eduardo Liceaga.

México.

Agua destilada.....	gram.	100. 00
Clorhidrato de pilocarpina....	„	0. 02
Papaina.....	„	0. 50
Jarabe de corteza de naranja..	„	20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora. Retardarlas si hay muchos vómitos, salivación excesiva ó sudores muy profusos.

Si el niño está muy débil, alternar las cucharadas con cucharadas de un vino generoso.

Glicerina.....	gram.	10. 00
Iodoformo en polvo.....	„	1. 00

Toques.

Tocar frecuentemente hasta que caigan las falsas membranas.

Cuernecillo de centeno.

Dr. Antonio J. Carbajal.

México.

Prefiere á todas las formas en que se administra esta sustancia, el extracto fluido que es cómodo para administrar y se conserva muy bien: 20 gotas representan un gramo de cuernecillo fresco.

Chancro blando.

Dr. Miguel Cordero

México.

Sulfato de quinina.....	gram.	1. 00
Salicilato de bismuto.....	„	4. 00

Para la curación.

Cubrir la úlcera con el polvo después de haberla lavado con agua hervida.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

Agua.....	gram.	500. 00
Permanganato de potasa.....	„	5. 00

Lavatorio.

Lavatorio dos veces al día y en seguida aplicar iodoformo en polvo fino.

Dr. Benito Soriano F.

México.

CHANCRO BLANDO Y ULCERACIONES DE ASPECTO CHANCROSO.

Vacilina.....	gram.	20. 00
---------------	-------	--------

Iodoformo.....	„	2. 00
Ácido tánico.....	„	2. 00
Esencia de menta.....	„	0. 50

Pomada.

Este modo de emplear el iodoformo asociado con el tanino, tiene la ventaja de quitar por completo el mal olor del iodoformo. Si la cantidad de iodoformo se aumenta, se hará otro tanto con la de ácido tánico, poniendo siempre iguales cantidades, salvo en el caso de poner un solo gramo de iodoformo, pues entonces se necesita uno y medio de tanino.

Chancro fagedénico.

Dr. Manuel Carmona y Valle. México.

Vacelina blanca.....	gram.	30. 00
Ácido tánico.....	„	4. 00

Pomada.

Para curar el chancro dos veces al día después de un lavatorio antiséptico.

Dacriosisistitis.

Dr. Fernando López. México.

EN LA DACRIOSISTITIS CATARRAL Ó SUPURADA.

Glicerina neutra.....	gram.	5. 00
Agua destilada.....	„	5. 00
Cianuro de mercurio.. de 0. 02 á ..	„	0. 05

Para inyecciones en el saco lacrimal.

Deglución difícil.

Cuando la deglución se hace difícil ó imposible en los padecimientos inflamatorios de la garganta, el síntoma dolor, causa del espasmo, se suprime poniendo

en la raíz de la lengua del enfermo, un gránulo de un milígramo de aconitina, y que se repite cada diez minutos hasta que se obtenga el efecto, que se consigue á los tres ó cuatro gránulos. Si no es posible colocar el gránulo, se puede usar una solución para aplicar con pincel ó en pequeña cucharadita procurando que el líquido se ponga en contacto con las partes inflamadas.

Delirium tremens.

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad. E. de Michoacán

Clorhidrato de amoniaco..... gram. 2. 00

Para 3 papeles.

Uno cada cuatro horas.

Delirio alcohólico.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Valerianato de zinc..... gram. 1. 00

Alcanfor..... „ 0. 30

Morfina..... „ 0. 05

Para 8 píldoras.

Una en la mañana y otra en la tarde ó noche.

Dr. Miguel Cordero. México.

Jarabe de cloral de Foller..... gram. 60. 00

Bromuro de sodio..... „ 2. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta producir el sueño.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

Bromuro de potasio..... gram. 2. 00

Agua de azahar..... „ 150. 00