

Iodoformo.....	„	2. 00
Ácido tánico.....	„	2. 00
Esencia de menta.....	„	0. 50

Pomada.

Este modo de emplear el iodoformo asociado con el tanino, tiene la ventaja de quitar por completo el mal olor del iodoformo. Si la cantidad de iodoformo se aumenta, se hará otro tanto con la de ácido tánico, poniendo siempre iguales cantidades, salvo en el caso de poner un solo gramo de iodoformo, pues entonces se necesita uno y medio de tanino.

Chancro fagedénico.

Dr. Manuel Carmona y Valle.	México.
Vacelina blanca.....	gram. 30. 00
Ácido tánico.....	„ 4. 00

Pomada.

Para curar el chancro dos veces al día después de un lavatorio antiséptico.

Dacriosisistitis.

Dr. Fernando López.	México.
---------------------	---------

EN LA DACRIOSISTITIS CATARRAL Ó SUPURADA.

Glicerina neutra.....	gram. 5. 00
Agua destilada.....	„ 5. 00
Cianuro de mercurio.. de 0. 02 á ..	„ 0. 05

Para inyecciones en el saco lacrimal.

Deglución difícil.

Cuando la deglución se hace difícil ó imposible en los padecimientos inflamatorios de la garganta, el síntoma dolor, causa del espasmo, se suprime poniendo

en la raíz de la lengua del enfermo, un gránulo de un milígramo de aconitina, y que se repite cada diez minutos hasta que se obtenga el efecto, que se consigue á los tres ó cuatro gránulos. Si no es posible colocar el gránulo, se puede usar una solución para aplicar con pincel ó en pequeña cucharadita procurando que el líquido se ponga en contacto con las partes inflamadas.

Delirium tremens.

Dr. Aurelio Pérez.	La Piedad. E. de Michoacán
Clorhidrato de amoniaco.....	gram. 2. 00

Para 3 papeles.

Uno cada cuatro horas.

Delirio alcohólico.

Dr. J. López Tello.	Amecameca. E. de México.
Valerianato de zinc.....	gram. 1. 00
Alcanfor.....	„ 0. 30
Morfina.....	„ 0. 05

Para 8 píldoras.

Una en la mañana y otra en la tarde ó noche.

Dr. Miguel Cordero.	México.
---------------------	---------

Jarabe de cloral de Foller.....	gram. 60. 00
Bromuro de sodio.....	„ 2. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta producir el sueño.

Dr. Francisco de P. Crespo.	Huamantla.
Bromuro de potasio.....	gram. 2. 00
Agua de azahar.....	„ 150. 00

Jarabe de morfina..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Hidrato de cloral..... gm. 1. 00

Leche..... „ 180. 00

Una yema de huevo.

Lavativa.

Esta lavativa se repite á las 12 horas si hay necesidad.

Dentición en los niños, desórdenes nerviosos.

Dr. Ramón Martínez Carriedo. México.

Agua de yerba-buena..... gm. 30. 00

Bromuro de sodio..... „ 3. 00

Tintura de almizcle..... 6 gotas.

Gotas.

Diez gotas tres veces en el día en agua de azúcar.

DIABETIS AZUCARADA.

Dr. Juan N. Campos. Toluca.

Agua destilada..... gm. 10. 00

Clorhidrato de pilocarpina..... „ 0. 05

Gotas.

De diez á veinte gotas tres veces al día.

Diabetis.

Dr. E. Lier. México.

Codeina..... gm. 0. 03

Tres veces al día.

Despues de diez días..... gm. 0. 05

Tres veces al día.

Diabetis con accidentes cerebrales.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Cocimiento de lúpulo..... gm. 120. 00

Jarabe de azahar..... „ 16. 00

Carbonato de amoniaco de 1 á „ 3. 00

3 tomas.

Una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche.

Diabetis azucarada.

Dr. Manuel Villaseñor. Pénjamo.

En tres casos de diabetis azucarada que habian sido tratados sin éxito por los medios conocidos, se ha visto bajar y despues desaparecer la azúcar, disminuir la cantidad de orina hasta la normal, desaparecer la sed y demás síntomas hasta recobrar el bienestar: usando á pasto y casi por único alimento y medicina la calabaza cocida ó azada. La sed es uno de los primeros síntomas que desaparecen. Solamente en caso necesario se ocurrirá á la estricnina, morfina, alcoholes etc., etc.

Diarrea.

Dr. Lázaro Ortega. México.

CON DISPEPSIA EN LOS NIÑOS.

Infusión de yerba del ángel em-
patosium colini..... gm. 50. 00

Aguardiente catalán..... „ 50. 00

Jarabe de corteza de cidra..... „ 50. 00

Para tomar una copita, antes de las comidas.

Diarrea catarral de la dentición.

Cocimiento de arroz..... gm. 120. 00

Subnitrato de bismuto.....	„	4. 00
Jarabe de goma.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. I. Martínez del Villar. México.

DIARREA REBELDE.

Subnitrato de bismuto.....	gram.	6. 00
Carbonato de cal.....	„	6. 00
Ácido tánico.....	„	1. 00
Extracto tebaico.....	„	0. 10

En 6 papeles.

Uno ó dos papeles diarios.

Otra:

Bicarbonato de sosa.....	gram.	4. 00
Óxido de zinc.....	„	4. 00
Extracto alcohólico de nuez vó-		
mica.....	„	0. 06
Extracto tebaico.....	„	0. 06

En 6 papeles.

Dos papeles al día.

Diarrea.

Dr. Marcos Mazarí.—Mineral Huautla. E. de Morelos.

Infusión de crameria.....	gram.	125. 00
Subnitrato de bismuto.....	„	6. 00
Ácido tánico.....	„	1. 00
Láudano de Sydenham.....	„	2. 00
Jarabe simple.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Otra:

Subnitrato de bismuto.....	gram.	6. 00
Electuario de diascordio.....	„	3. 00
Extracto de opio.....	„	0. 10

En 12 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Cocimiento de lúpulo.....	gram.	120. 00
Jarabe de goma.....	„	20. 00
Tanino.....	„	0. 50
Láudano de Sydenham.....		8 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Otra:

Cocimiento blanco.....	gram.	150. 00
Jarabe de azahar.....	„	30. 00
Carbonato de cal.....	„	3. 00
Tintura de catecú.....	„	3. 00
Láudano de Rousseau.....		10 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Pedro Acosta. Guadalajara.

Óxido de zinc.....	gram.	0. 50
Carbonato de cal.....	„	8. 00
Agua de azahar.....	„	150. 00
Jarabe diacodion.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Diarrea.

Otra:

Extracto de crameria	gram.	4. 00
Acetato de plomo cristalizado	„	0. 20
Opio	„	0. 15

En 20 píldoras.

Una píldora cada hora ó cada dos horas.

Otra:

Óxido de zinc	gram.	2. 00
Bicarbonato de sosa	„	2. 00
Extracto de crameria	„	2. 00
Opio	„	0. 10

En 4 papeles.

Un papel cada tres horas.

Otra:

Tanato de quinina	gram.	2. 00
id. de bismuto	„	2. 00

En 12 papeles.

Un papel cada tres horas.

Dr. Alberto B. Orduña. Tehuacán.

Extracto de crameria	gram.	0. 50
Catecú	„	0. 50
Opio	„	0. 05

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora en los dos ó tres primeros días y en los siguientes se tomarán cada dos horas.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Subnitrate de bismuto	gram.	12. 00
---------------------------------	-------	--------

Salicilato de bismuto	gram.	2. 00
Salol	„	0. 35
Extracto de opio	„	0. 10

En 12 obleas.

Una oblea cada tres horas.

Otra:

Salicilato de bismuto	gram.	5. 00
Naftol (beta)	„	0. 30
Extracto de opio	„	0. 10

En 12 cápsulas.

Una cápsula cada dos horas.

DIARREA.

Dr. Gabriel J. Chávez. Tasco. E. de Guerrero.

Extracto de crameria	gram.	2. 00
Polvo de ipecacuana	„	1. 00
Id. de catecú	„	1. 00
Extracto de opio	„	0. 20

Para 40 píldoras.

Una cada tres horas.

Dr. C. Santander. Salamanca. E. de Guanajuato.

Agua de Canela	gram.	60. 00
Subnitrate de bismuto	„	10. 00
Jarabe de crameria	„	30. 00
Láudano de Sydenham...de 0.50 á	„	1. 00

Una toma.

Dr. Enrique Herrera Moreno.—Córdoba. E. de Veracruz.

Infusión de raíz de colombo 1%	gram.	120. 00
--	-------	---------

Salicilato de bismuto.....	„	10. 00
Salol..... de 3 á	„	5. 00
Extracto de opio.....	„	0. 05
Jarabe simple.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Constancio Mota,	Puruándiro,
Vino rojo.....	gram. 30. 00
Bol de armenia.....	„ 1. 50
Fosfato de cal puro.....	„ 15. 00
Jarabe de opio.....	„ 30. 00
Agua.....	„ 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Lacto-fosfato de cal.....	gram. 30. 00
Extracto de crameria.....	„ 1. 50

Para 15 papeles.

Cuatro papeles en el día.

Dr. Salvador F. Alcalá,	Tecolotlán.
-------------------------	-------------

EN LA PRIMERA INFANCIA.

Calomel.....	gram. 0. 10
Polvo de ruibarbo.....	„ 0. 05
Id. de Dower..... de 0. 05 á	„ 0. 10
Carbonato de cal precipitado....	„ 0. 60

En 6 papeles.

Empezar por un vomitivo de ipecacuana, y al día siguiente un papel cada tres horas. Regularizar los alimentos.

Dr. Antonio C. Guzmán,	H. Matamoros,
Subnitrato de bismuto.....	gram. 6. 00
Polvos de Dower.....	„ 1. 00

En 12 papeles.

Un papel cada hora.

Dr. José María Benitez,	Guadalajara,
Calomel.....	gram. 0. 05
Ipecacuana.....	„ 0. 05
Extracto de opio.....	„ 0. 20

En 10 píldoras.

Una píldora cada dos horas. Usadas con muy buen éxito.

Dr. Severo L. Guerrero,	Matamoros.
Óxido de zinc.....	gram. 5. 00
Polvos de Dower.....	„ 0. 50
Bicarbonato de sosa.....	„ 0. 60

En 6 papeles.

Tres papeles repartidos en el día.

Diarrea.

Dr. Eufemio Gutiérrez,	Guadalupe. Zacatecas.
------------------------	-----------------------

EN LOS NIÑOS.

Agua destilada.....	gram. 80. 00
Ácido láctico.....	„ 1. 00
Elixir de M.º Mun.... 1 á 2 gotas.	
Lactopeprina.....	„ 0. 30
Jarabe simple.....	„ 20. 00

Cucharaditas.

Dosis: una cucharadita cada hora.

Dr. Federico Abrego. México.

DIARREA VERDE EN LOS NIÑOS.

Azúcar de leche.....	gram.	4. 00
Papaina.....	„	0. 50
Naftol (beta).....	„	0. 05

En 8 papeles.

Dosis: cuatro papeles repartidos en el día.

Dr. G. Parra. Tacubaya.

DIARREA DE LA DENTICIÓN.

Agua.....	gram.	100. 00
Elíxir paregórico <i>de 3 á 5 gotas.</i>		
Lisol puro <i>3 gotas.</i>		
Jarabe de canela.....	„	15. 00

Cucharaditas.

Dosis: una cucharadita cafetera cada hora.

Dr. M. Medal. Tacámbaro. E. de Michoacán.

Ácido tánico.....	gram.	0. 30
Extracto tebaico.....	„	0. 10

En 10 píldoras

Dosis: de cuatro á seis píldoras repartidas en el día.

EN LA FORMA CRÓNICA.

Subnitrato de bismuto.....	gram.	4. 00
Bolo de armenia.....	„	8. 00
Agua de lechuga.....	„	30. 00
Agua gomosa.....	„	160. 00

6 lavativas repartidas en el día.

Dr. M. Pérez Redondo. México.

DIARREA VERDE EN LOS NIÑOS.

Agua destilada.....	gram.	100. 00
---------------------	-------	---------

Ácido láctico.....	„	2. 00
--------------------	---	-------

Cucharaditas.

Dosis: una después de cada mamada.

Diarrea atónica.

Dr. A. J. Carbajal. México.

Extracto de monesia.....	gram.	2. 00
„ de nuez vómica.....	„	0. 10
„ tebaico.....	„	0. 05

Para 12 píldoras.

Tres ó cuatro píldoras al día.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid. México.

Polvo de goma de Sonora.....	gram.	2. 00
Id. de azúcar.....	„	2. 00

En 12 papeles.

Un papel cada dos horas.

Otra.

Salicilato de bismuto.....	gram.	0. 50
Naftol.....	„	0. 50

En 6 obleas.

Dos ó tres obleas en el día.

Óxido de zinc puro.....	gram.	1. 20
-------------------------	-------	-------

En 12 píldoras.

Una píldora cada dos horas alternadas con las obleas.

Inyección hipodérmica diaria de estricnina, empezando por medio milígramo y llegando á tres miligramos y teniendo como rehículo cognac.

Por único alimento leche de burra.

Dr. José Luna. Autlán.
 Alumbre..... grm. 0. 20
 Extracto de colombo..... „ 0. 30
 Opio..... de 0. 05 á „ 0. 10
En 8 píldoras.

Una píldora cada hora.

Diarrea crónica.

Dr. C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias. E. de Coahuila.
 Salicilato de bismuto..... grm. 10. 00
 Naftol beta..... „ 10. 00
Para 20 obleas.

Una oblea cada dos ó tres horas.

Otra.
 Salicilato de bismuto..... grm. 5. 00
 Extracto de crameria..... „ 1. 00
 Tanino..... „ 1. 00
 Extracto de opio..... „ 0. 10
Para 10 papeles.

Cuatro papeles en el día.

Dr. Pablo Gama. México.
 Sulfato de alumina y potasa..... grm. 0. 30
 Extracto tebaico..... „ 0. 05
 Catecú..... „ 0. 60
En 12 papeles.

Tres papeles repartidos en el día.

Dr. Manuel Gutierrez Zavala. México.
 Extracto de crameria..... grm. 1. 00

Extracto de colombo grm. 1. 00
 Id. tebaico..... „ 0. 10
 Id. de nuez vómica..... „ 0. 10
En 10 píldoras.

Una píldora tres veces al día lejos de los alimentos.

Otra.

Óxido de zinc puro grm. 4. 00
 Bicarbonato de sosa..... „ 4. 00
 Extracto de opio... .. „ 0. 05
 Id. nuez vómica..... „ 0. 05
En 8 papeles.

Uno, dos ó tres papeles al día.

Diarrea coleriforme.

Dr. J. M. Arroyo. Irapuato. E. de Guanajuato.
 Infusión de manzanilla romana, grm. 120. 00
 Bicarbonato de sosa..... „ 4. 00
 Tintura de nuez vómica..... „ 2. 00
 Láudano de Sydenham... .. „ 1. 20
 Jarabe simple..... „ 30. 00
Cucharadas.

Dos cada media hora.

Dr. Erasmo O. Romero. Ozuloama.
 ENTERITIS COLERIFORME DE ORIGEN PALUSTRE.
 Sulfato de sosa grm. 1. 00
 id. de quinina..... „ 1. 00
 Subnitrate de bismuto..... „ 2. 00
 Extracto de opio..... „ 0. 05
En 8 obleas.

Una oblea cada media hora.

Diarrea fétida.

Dr. E. Gutierrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

Infusión de raíz de colombo...	grm.	100. 00
Tanato de bismuto.....	"	8. 00
Naftol beta.....	"	2. 00
Creolina.....	"	0. 10
Jarabe de menta.....	"	50. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. J. López Tello. Amecameca.

Salicilato de bismuto.....	grm.	2. 00
Naftol (beta).....	"	2. 00

En 10 papeles.

Un papel despues de cada alimento.

Dr. R. Ortega. Ciudad Porfirio Díaz.

EN LA DENTICIÓN DE LOS NIÑOS.

Solución de goma.....	grm.	120. 00
Acido láctico.....	"	2. 00
Papaina.....	"	0. 50
Jarabe balsámico.....	"	30. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Diarreas palustres.

Dr. Angel Nieto. Palmarejo. E. de Chihuahua.

Usa con buen resultado el salol y recomienda igualmente la fórmula siguiente:

Subnitrato de bismuto.....	grm.	10. 00
----------------------------	------	--------

Salicilato de sosa..... " 5. 00

Para 10 papeles.

Tomar tres ó cuatro papeles al día.

Diarrea verde en los niños.

Dr. I. Martinez del Villar. México.

Mercurio con creta.....	grm.	0. 12
Salicilato de sosa.....	"	0. 12

En 12 papeles.

Un papel cada hora.

En dos casos en que había fallado el ácido láctico y el calomel, el resultado con esta medicina ha sido favorable.

Dr. Antonio J. Carbajal. México.

Agua destilada.....	grm.	60. 00
Pancreatina.....	"	2. 00
Acido láctico.....	"	0. 50

Cucharaditas.

Una cucharadita antes del alimento, En poco tiempo se modifica y queda diarrea simple.

Si hay tenesmo sectal:

Agua destilada.....	grm.	60. 00
Creolina.....		3 gotas.

2 Lavativas.

La mitad en la mañana y la otra en la tarde.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Solución gomosa.....	grm.	80. 00
Ácido láctico.....	"	2. 00

Jarabe simple..... „ 20. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita después de cada mamada.

Dr. D. Molinar.

Parral.

Polvos de ruibarbo..... grm. 0. 30

Calomel..... „ 0. 15

Una toma.

Dr. José María Benítez.

Guadalajara.

Calomel..... grm. 0. 05

Polvos de Dower..... de 0. 05 á „ 0. 10

Azúcar de leche..... „ 2. 00

En 20 papeles.

Un papel cada dos horas.

Otra:

Ácido láctico..... grm. 1. 00

Agua destilada de lechuga..... „ 100. 00

Jarabe..... „ 20. 00

Esencia de menta..... *Una gota.*

Cucharaditas.

Una cucharadita después de cada mamada.

Dr. Erasmo O. Romero.

Ozuloama.

Calomel al vapor..... grm. 0. 15

Azúcar de leche..... „ 0. 50

En 2 papeles

Un papel cada dos horas, una hora después de haber tomado el pecho.

Al día siguiente:

Subnitrato de bismuto..... grm. 2. 00

Extracto de crameria..... „ 0. 50

En 8 papeles.

Un papel cada dos horas,

ó bien

Agua destilada..... grm. 90. 00

Ácido láctico..... „ 2. 00

Jarabe de crameria..... „ 15. 00

Cucharadas.

Una cada hora.

Dr. Juan C. Villaseñor.

Morelia.

Hidrolado de azahar..... grm. de 6. 00 á 20. 00

Ácido láctico puro..... „ de 0. 40 á 1. 00

Extracto de crameria..... „ de 0. 50 á 2. 00

Salicilato de bismuto..... „ de 0. 50 á 2. 00

Jarabe de membrillo..... „ de 30. 00 á 80. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada media hora, haciéndolas preceder de una ó dos tomas de aceite de ricino de 4 ó 6 gramos. Reglamentar la alimentación.

Subnitrato de bismuto..... grm. 1. 30

Salicilato de id..... „ 1. 30

Solución de goma..... „ 25. 00

Agua de lechuga..... „ 25. 00

Jarabe de crameria..... „ 20. 20

Id. de membrillo..... „ 15. 00

Cucharadas

Una cucharada cada hora.

Si hay moco en las deposiciones y tenesmo sectal se usarán las siguientes lavativas:

Cloruro de sodio gm. 1. 00
 Agua sulfocarbonada..... „ 100. 00

Lavativas.

Dos lavativas diarias cada una de 15 gramos.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Acido láctico..... gm. 2. 00
 Agua..... „ 120. 00
 Jarabe de grosella..... „ 35. 00

[Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Diarrea infantil.

Dr. Antonio Butron. Acapulco.

Salicilato de bismuto..... gm. 1. 00
 Azúcar de leche..... „ 1. 50

En 10 papeles.

Un papel cada media hora, en leche.

Agua de cal..... gm. 100. 00
 Id. natural..... „ 100. 00

Cucharadas.

Dos cucharadas después de cada papel.

Dr. Benjamin Rosano. Mineral del Monte, (Hidalgo).

Mercurio con creta..... gm. 0. 20
 Salicilato de bismuto..... „ 0. 20

En 10 papeles.

Un papel cada hora, sobre todo cuando hay vómitos.

EN LA DIARREA CRÓNICA.

Solución de goma..... gm. 100. 00

Ácido sulfúrico diluido 4 gotas.

Jarabe simple..... „ 15. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada dos horas.

Dr. Carlos Amezcua. Tehuacán.

Jarabe simple..... gm. 75. 00
 Polvo de ruibarbo..... „ 1. 00
 Bicarbonato de sosa..... „ 8. 00

Cucharaditas.

Tres ó cuatro cucharaditas por día, durante seis ú ocho días.

Por alimento, leche, té con leche ó atole.

Cada tres horas una taza con pan.

Dr. Benjamín Treviño. S. Miguel Allende.

Agua hervida..... gm. 100. 00
 Ácido láctico..... de 1 á „ 2. 00
 Papaina..... „ 0. 15
 Jarabe simple..... „ 20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora y antes del alimento.

Diarrea de la dentición.

Dr. Pedro Acosta. Guadalajara.

Elíxir digestivo del Profesor A. Herrera, una cucharadita con cada alimento.

En las diarreas que han agotado á los niños:

Corteza de nuez lisa..... gm. 60. 00
 Vino tinto..... „ 300. 00

Dejarla macerar por algunos días.

Cucharaditas.

Una cucharadita en agua de azúcar cada media hora.

Otra.

Óxido de zinc grm. 0. 30

Bicarbonato de sosa „ 0. 30

En 4 papeles.

Un papel cada tres horas.

Proporcionar la dosis á la edad.

Otra.

Extracto de crameria grm. de 2 á 4. 00

Jarabe de genciana „ 60. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Lavativas con 200 gramos de agua y 10, 15 ó 20 centígramos de acetato de plomo.

En la diarrea producida por la ingestión de alimentos impropios; empezar por un purgante.

Indigo grm. 1. 00

Magnesia calcinada „ 2. 00

En 3 papeles.

Un papel cada ocho horas en chocolate hasta obtener cuatro ó cinco deposiciones. Esta dosis es para niños de 3 á 5 meses. Para niños menores de 7 años Indigo 3. y magnesia 5 gramos.

Se puede usar tambien el aceite de ricino proporcionando la dosis á la edad.

Diarrea serosa.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Tanino grm. 1. 00

Extracto de colombo..... „ 0. 50

Id. de opio..... „ 0. 20

En 20 píldoras.

Tres ó cuatro píldoras por día.

Dr. D. Molinar.

Parral.

Agua destilada..... grm. 200. 00

Subnitrate de bismuto..... „ 15. 00

Cotoina vera..... „ 0. 50

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Diarrea de los tuberculosos.

Dr. Ciro M. Santelices

Querétaro.

Crema de fosfato de cal gelatinoso..... grm. 120. 00

Subnitrate de bismuto..... „ 6. 00

Salicilato de bismuto..... „ 2. 00

Jarabe de opio..... „ 16. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr. Juan C. Villaseñor.

Morelia.

Sulfato de zinc..... grm. 0. 15

Extracto tebaico..... „ 0. 15

En 15 píldoras.

Una píldora cada hora ó cada dos horas.

Otra.

Vino rojo superior..... grm. 45. 00

id. de tres quinas..... „ 45. 00

Extracto de crameria..... „ 1. 00