

*Acido tánico.....	„	1. 00
Fosfato de cal precipitado.....	„	6. 00
Carbonato de cal precipitado..	„	6. 00
Jarabe de quina.....	„	40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Disenteria.

Dr. Leonides E. Jonguitud. Tenango.

DISENTERIA REBELDE DE LOS NIÑOS.

Fosfato de cal precipitado.....	gram.	3. 00
Extracto de crameria.....	„	6. 50
Láudano de Sydenham.....	2 gotas.	

En 12 papeles.

Un papel cada dos horas ó cada hora en cucharaditas de cocimiento de canela endulzado.

Dr. M. Pérez Redondo. México.

Nattol.....	gram.	4. 00
Salicilato de bismuto.....	„	4. 00

En 6 ú 8 obleas para consumirse en el día.

Lavativas pequeñas astringentes y laudanizadas despues de cada deposición. |

Dieta láctea.

Dr. Vicente Sierra. Apam.

Polvos de ipecacuana.....	gram.	0. 40
Calomel.....	„	0. 20
Extracto de opio.....	„	0. 05

En 8 píldoras.

Una cada dos horas.

Dr. Melesio Medál. Tacámbaro.

Polvos de ipecacuana.....	gram.	1. 00
Protocloruro de mercurio.....	„	0. 12
Extracto de opio.....	„	0. 10

En 10 píldoras

Cinco repartidas en el día.

Alimentos sin sal.

Dr. Pedro Peña. Zamora.

Polvos de almidón.....	gram.	4. 00
Salicilato de sosa.....	„	4. 00
Polvos de goma arábiga.....	„	8. 00

En 12 papeles.

Uno cada dos horas.

Dr. Leandro Arroyo. San Angel.

En las disenterias con deposiciones sanguineo-purulentas, lavativas pequeñas de cocimiento de quina y un poco de cloruro de sodio.

Disenteria.

Dr. José M. Robredo. Topia, E. de Durango.

FORMA BENIGNA.

Agua destilada azucarada....	gram.	120. 00
Magnesia calcinada.....	„	8. 00

Para tomar.

Para tomarla de una sola vez.

En seguida se hace uso de las fórmulas siguientes:

Agua hirviendo.....	gram.	120. 00
Ruibarbo.....	„	4. 00

Subnitrato de bismuto.....	„	3. 00
Múcilago.....	„	120. 00
Tintura de opio.....	„	1. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada tres ó cada seis horas.

Calomel.....	gram.	1. 00
Polvo de ipecacuana.....	„	0. 50
Polvo de Dower.....	„	1. 50

Para 10 papeles.

Uno cada tres ó seis horas.

Jarabe simple.....	gram.	120. 00
Ácido tánico.....	„	1. 00
Tintura de opio.....		25 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada tres ó seis horas.

En la disenteria aguda añade á este tratamiento.

Bálsamo tranquilo y		
Pomada de belladona de c. c....	gram.	15. 00

Friega.

Al vientre tres veces al día.

Con los alimentos una cucharadita de carbón de Belloc.

EN LA DISENTERIA CRÓNICA.

Extracto de opio.....	gram.	0. 30
Ácido pirogálico.....	„	0. 50
Id. salicílico.....	„	0. 25
Calomel.....	„	1. 00
Sulfato de zinc.....	„	0. 20

Para 12 papeles.

Uno cada tres ó cada seis horas.

Agua hervida.....	gram.	120. 00
Tintura de asafétida.....	„	3. 00
Id. de aloes.....	„	1. 00
Id. de opio.....		15 gotas.

Lavativa.

Para ponerla en una sola vez.

Vino de quina.....	gram.	120. 00
Tintura de catecú.....	} de c. c. „	5. 00
Id. de crameria.....		
Id. de colombo.....		
Sal de Epson.....		

Cucharadas.

Una cucharada tres veces al día.

En las ulceraciones intestinales que deja la disenteria crónica.

Nitrato de plata cristalizado....	gram.	1. 00
Harina de trigo.....	} de c. c. c. b.	
Goma arábica.....		
Jarabe simple.....		

Para hacer 50 píldoras.

Una cada tercer día aumentando progresivamente hasta cuatro cada tercer día.

Lavativas con nitrato de plata de 0. 50 á 1. 00, agua destilada 120. 00 cada cinco días.

Alimentos: leche con agua de cal, jaletina, jugo de carne, carne asada y por agua de uso, agua albuminosa.

Dr. Santos Medina.		Juchipila.
Agua destilada.....	gram.	150. 00
Cloral hidratado.....	„	2. 00
Ácido fénico alcoholizado.....	„	1. 00

Jarabe simple..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Dr. R. Ortega.

Ciudad Porfirio Diaz.

Salicilato de bismuto. . grm. de 2 00 á 5. 00

Naftol (alfa)..... „ de 2 00 á 5. 00

Extracto de opio..... „ de 0 01 á 0. 20

En 20 obleas.

Dos obleas cada media hora.

Despues disminuir y retirar paulatinamente.

Si pasan dos días sin evacuar, usar lavativas de agua fría para conseguirlo.

Dr. M. Samaniego.

Ciudad Juarez.

Inmediatamente despues de una deposición se aplicará una lavativa de agua tibia con dos gotas de ácido fénico y al devolverse esto se aplicará la siguiente:

Agua de malvas..... grm. 120. 00

Almidón..... „ 20. 00

Extracto fluido de belladona... 3 gotas.

Lavativa.

Salicilato de bismuto..... grm. 2. 00

Polvos de ipeca..... „ 0. 30

Extracto alcohólico de opio..... „ 0. 20

En 10 cápsulas.

Una cada tres horas.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

Subnitrato de bismuto..... grm. 12. 00

Ipecacuana..... „ 2. 00

Cocaina..... „ 0. 15

Extracto de opio..... „ 0. 06

En 12 papeles.

Un papel cada hora en agua carbónica.

Agua de linaza..... grm. 500. 00

Almidón..... „ 8. 00

Extracto de crameria..... „ 8. 00

Láudano de Sydenham..... „ 5. 00

Lavativas.

Tres lavativas al día, cada una de un pozuelo, precedidas de una grande de agua caliente.

Dr. Alberto B. Orduña.

Tehuacán.

Raíz de ipecacuana machacada grm. 4. 00

Agua hirviendo para infundir.. „ 150. 00

Jarabe de morfina..... „ 20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora ó cada dos horas.

En 48 horas es casi seguro que se han mejorado la mayor parte de los síntomas.

Dr. Manuel de Anaya.

Guanajuato.

CONTRA EL TENESMO RECTAL.

Borato de sosa..... grm. 2. 00

Iodoformo..... „ 0. 10

Clorhidrato de morfina..... „ 0. 05

Manteca de cacao c. b.

Para 6 supositorios.

Un supositorio en la mañana y otro en la tarde.

Dr. Manuel F. Ocampo.	Pinos.
Calomel.....	gram. 0. 10
Polvos de ipecacuana.....	„ 0. 05
Extracto de opio.....	„ 0. 05
Azúcar.....	„ 2. 00

En 12 papeles.

Método: un papel cada hora. Dieta láctea.

Dr. L. Arroyo. San Angel, Distrito Federal.
Una píldora pacífica (1) en la mañana, y cuando el tenesmo es muy fuerte otra en la noche.

Dr. E. Gutiérrez.	Guadalupe. E. de Zacatecas.
Agua de hinojo.....	gram. 100. 00
Sulfato de sosa.....	„ 50. 00
Cloroformo.....	„ 1. 00
Jarabe tártrico.....	„ 50. 00

Purgante.

Después	
Calomel.....	gram. 1. 00
Azúcar.....	„ 2. 00

En 12 papeles.

Uno cada dos horas.

(1) PÍLDORAS PACÍFICAS DE LA FARMACIA MEXICANA.

Polvo de opio, 30 gramos.
Acido benzoico, 4 gramos.
Nuez moscada, 6 gramos.
Azafrán, 6 gramos.
Esencia de hinojo, 60 centigramos.
Esencia de nuez moscada, 60 centigramos.
Miel, 20 gramos.

Para hacer píldoras de 5 centigramos cada una.

Agua albuminosa.....	gram. 100. 00
Nitrato de sosa.....	„ 8. 00
Emetina.....	„ 0. 02
Extracto de opio.....	de 5 á „ 0. 10
Jarabe simple.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cada dos horas alternando con los papeles.

Infusión de raíz de colombo....	gram. 80. 00
Salicilato de bismuto.....	„ 8. 00
Timol.....	„ 0. 50
Cloroformo.....	„ 1. 00
Jarabe diacodión.....	„ 40. 00

Cucharadas.

Una cada dos horas.

Dr. R. López.	México.
Infusion de ipecacuana....8 para	gram. 150. 00
Clorato de potasa.....	„ 3. 00
Tintura de opio.....	„ 1. 00
Jarabe de altea.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cada dos horas.

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes.
EN LA DISENTERIA REBELDE.

Dos lavativas al día de infusión fuerte de ipecacuana.

Dr. Manuel Valdéz y Díaz. Paso de Ovejas. E. de Veracruz.

Subnitrato de bismuto.....	gram. 6. 00
----------------------------	-------------

Goma tragacanto.....	„	2. 00
Infusión de colombo.....	„	120. 00
Láudano de Sydenham.....	30 gotas,	

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Subnitrato de bismuto.....	gram.	2. 00
Agua.....	„	240. 00
Láudano de Sydenham.....	10 gotas.	
Esencia de trementina.....	10 gotas.	
Almidón.....	c. b.	

Una lavativa.

Tres en el día.

Dr. Juan Pérez Espinola. Campeche.

Calomel al vapor.....	gram.	0. 10
Polvo de ipeca.....	„	0. 20
Extracto de opio.....	„	0. 10

En 12 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Esta fórmula la consideró su autor como un específico.

Disnea.

Dr. Francisco M. Arroyo.—Irapuato, E. de Guanajuato

Agua destilada de lechuga....	gram.	120. 00
Id. de laurel cerezo.....	„	5. 00
Jarabe de morfina.....	„	15. 00

Cucharaditas.

Una cada media hora.

Disenteria aguda.

Dr. A. Martínez. México.

Aceite de ricino.....	gram.	30. 00
Jarabe de limón.....	„	30. 00

Purgante.

Pomada de belladona.....	gram.	30. 00
Láudano de Sydenham.....	„	8. 00

Pomada al vientre.

Carbonato de cal.....	gram.	6. 00
Calomel.....	„	0. 10
Polvo de ipecacuana.....	„	0. 30
Extracto de opio.....	„	0. 05

Para 12 papeles.

Uno cada hora, al día siguiente de la purga.

DISENTERIA EN LOS NIÑOS.

Dr. Pedro Acosta. Guadalajara.

Polvos de ipecacuana.....	gram. de	0. 50 á 1. 00
Nitrato de sosa.....	„ de	1. 00 á 5. 00
Jarabe.....	„	60. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cafetera cada hora.

Dr. Miguel Cordero México.

Creolina.....	gram.	0. 12
---------------	-------	-------

En 12 píldoras.

Una píldora cada hora.

Cocimiento de raíz de escobilla	gram.	500. 00
Ácido láctico.....	„	8. 00

4 Lavativas.

En los niños:

Cocimiento ligero de escobilla.... grm. 125. 00

Ácido láctico..... „ 1. 00

Azúcar c. b.

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Agua..... grm. 200. 00

Creolina..... „ 2. 00

Lavativas.

Cada lavativa de 60 gramos. Baños tibios cuando no haya calentura.

Disenteria crónica.

Dr. F. D. Maldonado. Aguascalientes.

Cuando el nitrato de plata no da resultado:

Agua..... grm. 200. 00

Tintura de iodo..... „ 3. 00

Ioduro de potasio..... „ 0. 25

Lavativa.

Dr. Antonio J. Carbajal. México.

En los casos rebeldes.

Infusión de cuasia simarruba.. grm. 500. 00

Subnitrato de bismuto... de 4 á „ 6. 00

Láudano de Sydenham..... 8 gotas.

Jarabe de corteza de naranja.. c. b.

Bebida.

Disenteria en los niños.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

Infusión concentrada de ipeca

del Brasil..... grm. 100. 00

Clorato de potasa..... „ 1. 00

Jarabe de ipeca..... „ 10. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora ó cada media hora para sostener el estado nauseoso.

Infusión de ipeca..... grm. 500. 00

Clorato de potasa..... „ 5. 00

Lavativas.

Este método puede aplicarse á los adultos aumentando la dosis y asociando preparaciones de opio.

Dr. Alberto B. Orduña. Tehuacán.

Raíz de ipeca..... grm. 2. 00

Agua para infundirse..... „ 100. 00

Jarabe simple..... „ 16. 00

Cucharaditas.

Una cada hora ó cada dos horas.

Difteria.

Dr. M. Samaniego. Ciudad Juárez.

Infusión de polígala..... grm. 120. 00

Sulfato de cobre..... „ 0. 20

Emético..... „ 0. 05

Jarabe de ipeca..... „ 30. 00

Vomitivo

Una cucharada grande cada 10 minutos para un adulto, cafetera para un niño.

Cocimiento de raíz de genciana grm. 150. 00

Glicerina..... „ 10. 00

Extracto alcohólico de quina.. „ 4. 00

Ácido bórico..... „ 2. 00

Jarabe de limón..... „ 50. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas. Cucharaditas para niño.

Cocimiento de cáscara sagrada grm. 700. 00

Glicerina..... „ 30. 00

Alcohol alcanforado..... „ 10. 00

Ácido bórico..... „ 15. 00

Miel de rosas..... „ 60. 00

Gárgaras repetidas

Ácido fénico..... grm. 0. 20

Alcohol á 80°..... „ 10. 00

Jugo de limón..... „ 10. 00

Toques.

Tocar las falsas membranas repetidas veces en el día.

Friccionar exteriormente la región afectada con unguento doble y pomada de belladona.

Difteria en los niños.

Dr. Juan Collantes y Buenrostro. México.

Glicerina neutra..... grm. 30. 00

Salol alcanforado..... „ 4. 00

Toques.

Sobre las superficies afectadas tres ó cuatro veces al día.

Dr. J. López Tello. Amecameca.

Cocimiento de quina..... grm. 200. 00

Ácido fénico..... „ 2. 00

Lavatorio.

Lavatorio cada dos horas en la garganta y nariz.

Glicerina..... grm. 25. 00

Ácido fénico..... „ 5. 00

Toques.

Tocar las falsas membranas cada 4 horas.

Infusión de quina..... grm. 125. 00

Extracto de quina..... „ 4. 00

Jarabe de azahar..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Eduardo Liceaga. México.

Agua destilada..... grm. 100. 00

Clorhidrato de pilocarpina.... „ 0. 02

Papaina..... „ 0. 50

Jarabe de corteza de naranja.. „ 20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora, retardándolas si hay muchos vómitos, salivación excesiva ó sudores muy profusos. Si hay mucha debilidad en el niño se alternarán las cucharadas con otras de un vino generoso.

Glicerina..... grm. 10. 00

Iodoformo pulverizado..... „ 1. 00

Toques.

Tocar frecuentemente hasta que caigan las falsas membranas.

Dismenorrea.

Dr. M. Mucél. México.

DISMENORREA DOLOROSA.

Hacer la medicina causal y para el dolor usar.

Agua de menta..... grm. 90. 00

Antipirina	„	1. 00
Jarabe simple.....	„	40. 00

2 tomas con 2 ó 3 horas de distancia.

Para favorecer la bajada del periodo de 6 á 10 cápsulas de apio repartidas en el día.

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad. E. de Michoacán.

Analguina.....	gram.	1. 00
Hidrato de cloral.....	„	1. 00
Agua.....	„	150. 00

Lavativa.

Para aplicarla en el momento en que aparece el dolor.

Dr. Miguel Cordero. México.

Tintura alcohólica de azafrán...	gram.	4. 00
Id. id. de canela....	„	4. 00
Id. id. de opio.....	„	4. 00

Gotas.

Seis gotas cada hora hasta calmar el dolor.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

Tintura de gelcemium.....	10 gotas
Id. de bibumium prunifolium..	10 gotas.
Agua.....	gram. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. José M^a Dávila. Mazatlán.

DISMENORREA DOLOROSA.

Tintura de ruda.....	gram.	4. 00
----------------------	-------	-------

Id. de azafrán.....	„	4. 00
Cocimiento de canela.....	„	150. 00
Jarabe de opio.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

DISMENORREA.

Dr. José M^a Irys. S. Juan Bautista. E. de Tabasco.

EN LAS CLORO-ANÉMICAS.

Extracto de aloes.....	gram.	0. 50
Id. de ruibarbo.....	„	2. 00

En 20 píldoras.

Una en la mañana y otra en la noche.

Dr. E. Liceaga. México.

En las dismenorreas que no reconocen una causa mecánica por lesiones uterinas.

En las que acompañan á la clorosis.

En las que preceden á la menopausa.

Infusión de epazote chenopodii ambrosiodes.....	gram.	100. 00
Propilamina.....	„	3. 00
Jarabe de canela.....	„	20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora. Repetirlas muchos días

Dr. Guillermo R. Servín. Triunfo. Baja California

DISMENORREA DOLOROSA.

Exalgina.....	gram.	0. 20
Bromuro de potasio.....	„	2. 00

Láudano de Rousseau...10 gotas	
Alcohol.....c. b.	
Acetato de amoniaco.....	„ 4. 00
Hidrolado de azahar.....	„ 120. 00
Jarabe.....	„ 30. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Extracto de valeriana.....	„ gm. 1. 00
Id. de asafétida.....	„ 1. 00
Polvo de castor.....	„ 0. 15

En 10 cápsulas.

Una cápsula cada hora alternando con las cucharaditas.

Dismenorrea nerviosa.

Dr. A. J. Carbajal. México.

Antipirina.....	„ gm. 4. 00
-----------------	-------------

En 8 papeles.

Uno cada media hora hasta quitar el dolor.

Gránulos dosimétricos de codeina... núm. 4	
Id. id. de hyosciamina „ 1	

Una toma.

Repítase cada media hora: con tres ó cuatro se puede calmar el dolor.

Es útil poner al vientre una embrocación de aceite caliente y lienzos también calientes.

Dr. I. Martínez del Villar. México.

En las niñas cuya dismenorrea había sido rebelde á los tratamientos usuales, se ha encontrado por el exámen un trabajo ulcerativo del cuello de la matriz

que tratado localmente ha traído la curación de la dismenorrea.

La curación ha sido lavar ampliamente con solución bórica y tocar el cuello con una solución de nitrato de plata tan concentrado como lo exija el caso y como la tolerancia de la enferma lo permita; secando luego con algodón salicilado y dejando un pequeño tapón del mismo algodón para extraerlo al día siguiente.

Las curaciones se hacen cada ocho días.

Más tarde con tintura de iodo puro ó mezclada con glicerina.

Disodinia.

Dr. José M^a Dávila. Mazatlán. E. de Sinaloa.

Un gránulo de sulfato de estriquina al milígramo, cada hora, hasta diez. He encontrado éste tratamiento muy superior á la ergotina.

Dr. D. Molinar. Hidalgo del Parral.

Infusión de toronjil.....	„ gm. 120. 00
Tintura de canela.....	„ 5. 00
Polvo de cuernecillo de centeno „ 0. 10	
Jarabe de yerbabuena.....	„ 30. 00

*Bebida.***Dispepsia.**

Dr. A. Aceves. Guadalajara.

Siendo la dispepsia un síntoma y nó una enfermedad, hay que atacar preferentemente la causa que la origina. Las dos fórmulas de píldoras digestivas y doble digestivas se elegiran según los casos.

Sin olvidar el régimen dietético y la buena higiene, deben preferirse las píldoras digestivas en los casos que predomina la diarrea y las dobles digestivas en los que predomina el estreñimiento

PÍLDORAS DIGESTIVAS.

Carbonato de bismuto.....	gram.	1. 00
Diascordio.....	„	1. 00
Pepsina pura.....	„	1. 00
Lactato de sosa.....	„	1. 00

Para 25 píldoras.

Usando polvo de canela como excipiente.

PÍLDORAS DOBLE DIGESTIVAS.

Pepsina.....	gram.	1. 00
Pancreatina.....	„	1. 00
Lactato de sosa.....	„	1. 00
Extracto de nuez vómica.....	„	0. 05

Para 25 píldoras.

Se toma una píldora antes y otra después de cada una de las tres comidas usuales, ó solo una después de cada comida según la intensidad del mal.

Cuando hay dolor y flatulencia se usará el muriato de morfina á la dosis de medio centígramo una hora antes de cada comida, prefiriendo la vía hipodérmica.

Si predomina la acidez, se usará el agua de Vichy y los alcalinos y unas cinco ó más gotas de ácido láctico ó muriático en el agua que se toma al fin de la comida, que debe ser una infusión caliente y ligeramente aromática, como té limón, hojas de naranjo, azahar, etc. etc. En el intermedio de la comida no se

debe tomar ningún alimento ni líquido alguno. Durante la digestión debe guardarse reposo completo.

Cuando la dispepsia es neutra, el exceso de dulce da buen efecto, sin dejar las píldoras digestivas ó dobles digestivas según el estado y carácter de la enfermedad.

Deben usarse también los amargos puros sin olvidar la estricnina.

Cuando hay insomnio, cansancio neuromuscular y cretismo cerebral, indicando la desnutrición y la neucrotencia, se debe usar la nuez Kola granulada de Astier.

La hidroterapia exagera el neurosismo y solo deben aconsejarse los baños de esponja violentos cuando la depresión nerviosa se marca.

(Dispepsia.

Dr. C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias. E. de Coahuila.

Pepsina.....	gram.	2. 00
Pancreatina.....	„	1. 00
Maltina.....	„	0. 20
Ácido láctico ó clorhídrico.....		4 gotas.
Lactosa.....	gram.	2. 00

Para 20 cápsulas.

Una cápsula antes ó después de los alimentos.

Dispepsia flatulenta.

Dr. Ciro M. Santelices, Querétaro.

Carbón de Belloc.....	gram.	4. 00
Pepsina.....	„	2. 00
Maltina.....	„	2. 00