

Bicarbonato de sosa.....	„	12, 00
Extracto de nuez vómica.....	„	0, 05

En 12 obleas.

Una oblea después de cada comida.

Dispepsia ácida.

Carbonato de cal precipitado...	gram.	10, 00
Bicarbonato de sosa.....	„	10, 00
Cuasina.....	„	0, 04
Salol.....	„	0, 20

En 12 obleas.

Una en medio de cada comida.

Dispepsia pútrida.

Subnitrato de bismuto.....	gram.	10, 00
Carbonato de cal precipitado...	„	10, 00
Salol.....	„	0, 35
Extracto tebaico.....	„	0, 06
Cocaina.....	„	0, 06

En 12 obleas.

Una oblea cada dos horas.

Dispepsia ácida.

Dr. Francisco D. Maldonado.	Aguascalientes.
Subnitrato de bismuto.....	gram. 10, 00
Magnesia calcinada.....	„ 10, 00
Bicarbonato de sosa.....	„ 10, 00

Para 30 papeles.

Un papel en cada comida.

Dispepsia atónica.

Dr. J. López Tello.	Amecameca. E. de México.
Extracto de nuez vómica.....	gram. 0, 10

Polvo de raíz de genciana.....	„	0, 40
--------------------------------	---	-------

En 10 píldoras.

Una píldora minutos antes de comer.

Dispepsia flatulenta.

Pepsina neutra.....	gram.	3, 00
---------------------	-------	-------

Ácido clorhídrico medicinal.....	10 gotas.
----------------------------------	-----------

En 6 papeles.

Un papel en la comida.

Dispepsia atónica.

Dr. Benjamin Cervantes.	Rincon de Romos.
-------------------------	------------------

Tintura de ruibarbo.....	gram.	4, 00
--------------------------	-------	-------

Id. de genciana.....	„	4, 00
----------------------	---	-------

Id. de cuasia.....	„	4, 00
--------------------	---	-------

Id. de quina.....	„	4, 00
-------------------	---	-------

Id. de colombo.....	„	4, 00
---------------------	---	-------

Gotas de Baumé.....	„	4, 00
---------------------	---	-------

Ácido clorhídrico.....	„	4, 00
------------------------	---	-------

Gotas.

De 10 á 12 gotas antes de comer y de cenar, en una copita de cognac.

Dispepsia ácida flatulenta.

Dr. Guillermo R. Servin.	Triunfo. Baja California.
--------------------------	---------------------------

Bicarbonato de sosa.....	gram.	10, 00
--------------------------	-------	--------

Óxido de magnesia.....	„	5, 00
------------------------	---	-------

Polvo de quina.....	„	1, 00
---------------------	---	-------

Id. de nuez vómica.....	„	0, 30
-------------------------	---	-------

Id. de ruibarbo.....	„	0, 50
----------------------	---	-------

En 12 papeles.

Un papel despues de cada alimento.

Dispepsia atónica.

Dr. Desiderio G. Rosado. Comalcalco. Tabasco.

Bilis de buey 28 gramos para ponerse en digestivo en un litro de vino de Málaga y filtrarse despues.

Una cucharadita antes de los alimentos.

Dispepsia flatulenta dolorosa.

Dr. R. López. México

Asafétida grm. 1. 00

Extracto de valeriana „ 0. 50

Id. de belladona „ 0. 20

Para 20 cápsulas.

Una cápsula una hora despues de cada comida.

Dr. Desiderio G. Rosado. Comalcalco. Tabasco.

Tintura de cocobá (Aristoliquia) que no es el condurango ó Huaco, 28 gramos en un litro de Jeréz ó Málaga para tomar una cucharada antes de las comidas.

Dispepsia gastrálgica.

Dr. J. Ma Dávila. Mazatlán.

Pepsina grm. 1. 00

Pancreatina „ 0. 50

Ácido clorhídrico 2 gotas.

Para 10 píldoras.

Una píldora en cada comida.

Dispepsia pútrida y ácida.

Dr. Salvador F. Alcalá. Tecolotlán.

Naftol grm. 0. 30

Salicilato de bismuto „ 0. 30

En una oblea.

Una oblea antes y otra despues de cada alimento acompañada esta última de una ó dos perlas de pepsina.

Dispepsia en los niños.

Dr. Ernesto Chavez. Córdoba.

Pancreatina grm. 5. 00

Fosfato de cal „ 5. 00

Bicarbonato de sosa „ 3. 00

En 12 papeles.

Un papel despues de cada mamada.

Dispepsia ácida.

Dr. Manuel S. Soriano. México.

Bicarbonato de sosa grm. 15. 00

Subnitrato de bismuto „ 2. 00

Pepsina amilacea „ 2. 00

Magnesia calcinada „ 0. 50

Extracto tebaico „ 0. 05

Azucar en polvo „ 10. 00

Mésclese y aromatícese con esencia de limón.

En 10 papeles.

Un papel despues de cada comida.

Dispepsia gastro-intestinal.

Dr. Jesús Villagrán. México.

Papaina grm. 2. 00

Cuasina „ 0. 02

Arseniato de estriquina „ 0. 01

Para 20 cápsulas.

Una cápsula diez minutos antes de cada alimento.

Dispepsia intestinal.

Extracto fluido de bilis de buey . . . grm. 1. 00
 Salicilato de fierro „ 1. 20

En 14 píldoras.

Una píldora por la mañana y otra en la tarde con los alimentos. Tomadas por largo tiempo.

Dispepsia pútrida.

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad, E. de Michoacán.

Salol	} de c. c. grm. 4. 00
Salicilato de bismuto	
Magnesia inglesa	

Para 12 papeles.

Un papel sobre cada comida.

Eclamsia.

Dr. M. Valdéz y Díaz.—Paso de Ovejas, E. de Veracruz.

Infusión de raíz de valeriana . . . grm. 120. 00
 Bromuro de potasio „ 4. 00
 Jarabe de éter sulfúrico „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. J. Páramo Rangel. México.

Agua de goma grm. 200. 00
 Tintura de belladona 2 gotas.

Cucharaditas.

Una cucharadita cada media hora en los niños de dos años.

Dr. Federico Cota.

La Paz, Baja California.

En los últimos meses del embarazo y con edemas en los miembros inferiores y albúmina en la orina; ha tratado los casos que se le han presentado en su práctica, provocando el parto prematuro por la irrigación continua de agua tibia como la emplea el eminente tocólogo Dr. Juan M^a Rodríguez, y provocando abundantes sudores por el jaborandi á la dosis de cuatro gramos en infusion.

Eclamsia de los niños.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.

Tehuacán.

Calomel	grm. 0. 15
Óxido de zinc	„ 0. 30
Almizcle	„ 0. 30
Polvo de altea	„ 2. 00

En 10 papeles.

Un papel cada hora.

Otra:

Atropina	grm. 0. 01
Polvo de azúcar	„ 5. 00

En 20 papeles.

Dos papeles diarios.

Dr. D. Molinar.

Parral.

Infusión de valeriana	grm. 100. 00
Tintura de almizcle	20 gotas.
Id. de castor	„ 2. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.