

Dispepsia intestinal.

Extracto fluido de bilis de buey . . . grm. 1. 00
 Salicilato de fierro „ 1. 20

En 14 píldoras.

Una píldora por la mañana y otra en la tarde con los alimentos. Tomadas por largo tiempo.

Dispepsia pútrida.

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad, E. de Michoacán.

Salol	} de c. c. grm. 4. 00
Salicilato de bismuto	
Magnesia inglesa	

Para 12 papeles.

Un papel sobre cada comida.

Eclamsia.

Dr. M. Valdéz y Díaz.—Paso de Ovejas, E. de Veracruz.

Infusión de raíz de valeriana . . . grm. 120. 00
 Bromuro de potasio „ 4. 00
 Jarabe de éter sulfúrico „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. J. Páramo Rangel. México.

Agua de goma grm. 200. 00
 Tintura de belladona 2 gotas.

Cucharaditas.

Una cucharadita cada media hora en los niños de dos años.

Dr. Federico Cota. La Paz, Baja California.

En los últimos meses del embarazo y con edemas en los miembros inferiores y albúmina en la orina; ha tratado los casos que se le han presentado en su práctica, provocando el parto prematuro por la irrigación continua de agua tibia como la emplea el eminente tocólogo Dr. Juan M^a Rodríguez, y provocando abundantes sudores por el jaborandi á la dosis de cuatro gramos en infusion.

Eclamsia de los niños.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

Calomel grm. 0. 15
 Óxido de zinc „ 0. 30
 Almizcle „ 0. 30
 Polvo de altea „ 2. 00

En 10 papeles.

Un papel cada hora.

Otra:

Atropina grm. 0. 01
 Polvo de azúcar „ 5. 00

En 20 papeles.

Dos papeles diarios.

Dr. D. Molinar. Parral.

Infusión de valeriana grm. 100. 00
 Tintura de almizcle 20 gotas.
 Id. de castor „ 2. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Infusión de valeriana..... grm. 30. 00
 Tintura de almizcle..... 20 gotas.
 Una yema de huevo.

Lavativa.

Fricciones con tintura de valeriana.

Dr. Emilio Polo.

Puebla.

Agua destilada..... grm. 120. 00
 Tintura de beleño..... 20 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada diez minutos.
 Vaciar el intestino con lavativa purgante.

Dr. Lázaro Ortega.

México.

ECLAMSIÁ, TENIENDO POR CAUSA LA INDIGESTIÓN.

Agua destilada..... grá. 120. 00
 Tartaro emético..... " 0. 05
 Jarabe de goma..... " 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Eclamsia puerperal.

Dr. Manuel Gutierrez Zavala.

México

Siendo múltiples las causas de la eclamsia, múltiples deben ser los medios para combatirla. La desocupación de la matriz como medio sistemático, no se puede aceptar. Hay observaciones en que la eclamsia ha venido durante el embarazo, y se ha combatido con resultado llegando el embarazo á feliz térmi-

no sin repetición de ataque alguno. En los casos en que viene la eclamsia durante el puerperio, no hay desocupación que hacer.

Se debe comenzar por hacer el diagnóstico entre la forma urémica y la no urémica.

Indicación patológica: Vaciar el estómago, el intestino, la vejiga, quitar los coágulos de tenidos en la vagina; y si es posible evitar las emociones morales.

Indicación sintomática: moderar la excitabilidad medular por medio de los bromuros y el cloroformo en inhalaciones, cloral, etc.; si el reflejo parte del útero, hay contracciones y lo anterior fracasa, hay indicaciones de provocar el trabajo.

Indicación patológica: Disminuir la tensión aórtica por los purgantes drásticos, los diuréticos; en caso de plétora, sangría. Mientras estos medios obran, la indicación sintomática como en el caso anterior y solo en caso de no poder abatir la tensión arterial, desocupar el útero.

Las mismas indicaciones que en la forma no urémica, prefiriendo los drásticos a los diuréticos, por temor de aumentar con éstos la congestión renal.

Indicación patológica: Expulsar los materiales tóxicos por los diaforéticos, purgantes, baños repetidos á 33° según el método de P. Bar.

Indicación sintomática: Inhalaciones de cloroformo, bromuros, cloral, etc., etc.

Reflejo por excitación de los vasos encefálicos ó de la protuberancia.

Mecánica, por edema y anemia cerebral debida á la hidrohemia y la compresión del útero.

Mecánica: Edema y anemia cerebral por hidrohemia, oliguria ó anuria, desperdicio de albúmina y aumento de la tensión vascular por plétora ociosa, compresión aórtica, lesiones renales é hipertrofia cardíaca.

Forma tóxica: Amoníemia y creatinemia etc.

FORMA NO URÉMICA.

FORMA URÉMICA.

Exema.

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad. Michoacán.

- Óxido de zinc..... grm. 8. 00
- Aceite de cade verdadero..... „ 30. 00

Para untar dos veces al día en las partes afectadas.

Exema simple.

Dr. José M. Dávila Mazatlan.

Lavar con agua hervida las partes enfermas y poner el siguiente polvo.

- Albayalde finamente pulverizado.... grm. 30. 00
- Almidón en polvo fino..... „ 30. 00
- Ácido salicílico..... „ 4. 00

Mézclese. Uso externo.

Poniendo después algodón y un bendaje lijeramente compresivo (1).

Dr. E. Lier México.

EXEMA AGUDO.

- Óxido de Zinc grm. 10. 00
- Almidón. „ 10. 00
- Acido salicílico. „ 0. 50
- Dermatol. „ 2. 50
- Vaselina } de c. c. „ 12. 50
- Lanolina }

Pasta.

(1) Ha notado el Dr. Dávila que el tratamiento por el ácido fénico y bicloruro de mercurio prolongan la duración de esta enfermedad.

Exema crónico.

Resorsina.....	gram.	2. 50
Ácido salicílico	„	1. 00
Cloruro de calcio.....	„	0. 50
Vaselina.....	„	46. 00

Ungüento.

Dr. Antonio Carreon. S. Andres Chalchicomula.

EXEMA CRÓNICO EN LOS NIÑOS.

Lanolina purísima.....	gram.	20. 00
Creolina.....	„	1. 00

Pomada.

Aplicarse dos veces al día en las partes enfermas.

Dr. Jesús G. Ibarra. Etzatlan. E. de Jalisco.

Exema húmedo.

Manteca.....	gram.	30. 00
Aceite de cade.....	„	3. 00
Óxido de zinc.....	„	4. 00
Láudano de Sydenham.....	„	1. 00

Pomada.

Lavar antes de poner la pomada con cocimientos emolientes.

Dr. Eduardo Lamicq. México.

Vaselina.....	gram.	30 00
---------------	-------	-------

Bórax.....	„	15. 00
------------	---	--------

Pomada.

Dos veces al día.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Exema del cuero cabelludo.

Vaselina alcanforada.....	gram.	32. 00
Calomel.....	„	1. 00
Precipitado rojo.....	„	0. 50

Pomada.

Una curación diaria.

Dr. Juan C. Villaseñor. Morelia

Bórax.....	gram.	4. 00
Agua de colonia.....	„	30 00
Agua destilada.....	„	30. 00

Lavatorio.

Dos veces al día (tibio).

Acido crisofánico.....	gram.	0. 30
Coldcream.....	„	10. 00
Biborato de sosa..... de 0. 30 á „	„	0. 50

Pomada.

Después del lavatorio.

Al interior arcenicales ó sulfurosos según la constitución del enfermo.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

Agua.....	gram.	300. 0 0
-----------	-------	----------

Salol.....	„	6. 00
Alcoholatura de acónito.....	„	15. 00

Lociones.

Lanolina.....	gram.	15. 00
Aceite alcanforado.....	„	15. 00
Sulfoictiolato de amoniaco.....	„	3. 00

Pomada.

Glicerolado de almidón.....	gram.	30. 00
Iodoformo.....	„	3. 00
Creolina.....	„	0. 60

Uso externo.

Cubrir con tela las partes afectadas

Dr. F. M. Arroyo. Irapuato, E. de Guanajuato.

Agua de Saturno.....	gram.	250. 00
Id. „ laurel cereso.....	„	15. 00
Bicloruro de mercurio.....	„	0. 15

Fomentos.

Dr. C. M. Garza. S. Pedro de las Colonias, E. de Coahuila.

Glicerina y agua de rosas de c. c....	gram.	40. 00
Ácido bórico y		
Óxido de zinc de c. c.....	„	4. 00
Clorhidrato de morfina.....	„	0. 10

Uso externo.

Untar con un pincel después de haber lavado con licor de Van-Swicton.

Dr. Juan N. Campos. Toluca.

Glicerolado de almidón.....	gram.	15. 00
Óxido de zinc.....	„	2. 00
Bicloruro de mercurio.....	„	0. 05

Pomada.

Después de lavar con jabon aplicar la pomada sobre los lugares enfermos.

Otra:

Alcohol á 80°.....	gram.	20. 00
Bicloruro de mercurio.....	„	0. 05
Solución fenicada al 10 por ciento	„	0. 50

Uso externo.

Para ponerla con pincel sobre las partes enfermas.

Dr. Antonio Butron. Acapulco.

EXEMA MARGINAL.

Ácido crisofánico.....	gram.	1. 00
Lanolina.....	„	30. 00

Pomada.

Dos veces al día untar la pomada.

Dr. Federico Cota. La Paz, Baja California.

EXEMA REBELDE.

Vaselina.....	gram	30. 00
Subnitrate de bismuto.....	„	3. 00
Óxido de zinc.....	„	2. 00
Fécula ó polvo de almidón.....	„	2. 00
Clorhidrato de cocaina.....	„	0. 05

Pomada.

Para aplicarla en los lugares afectados.

Efelides.

Dr. Francisco M. Arroyo.—Irapuato. E. de Guanajuato

Coldcream.....	gm.	15. 00
Bicloruro de mercurio.....	„	0. 05
Agua de laurel cereso.....	„	15. 00

*Uso externo.***Embriaguez.**

Dr. Adrian de Garay. México.

Método para combatirla.

Suspender desde luego el uso de los alcoholes y permitir tomar en las comidas un poco de vino tinto ó de cerveza.

Poner diariamente una inyección subcutanea de dos miligramos ó mas si fuere preciso de sulfato de estricina durante 20 días más ó menos y tomando durante el mismo tiempo una cucharada cada dos horas de la siguiente fórmula:

Bromuro de potasio.....	gm.	3. 00
Bromuro de sodio.....	„	3. 00
Cognac.....	„	40. 00
Jarabe de quina c. b.		

Cucharadas.

Pasados los 20 días tomar durante ocho ó diez días tres cucharadas al día de la fórmula siguiente:

Cafeina.....	gm.	2. 00
Cognac.....	„	20. 00
Agua destilada.....	„	100. 00

Cucharadas.

Despues del tiempo señalado hacer tomar al enfermo diariamente y según la tolere por varios días una copita chica de cognac ó del alcohol ó bebida que use de preferencia. Para 500 gramos de bebida agréguese extracto alcohólico de ipeca (seco) 2 gramos 50 centígramos y 5 centígramos de cuasina.

Agréguese á este método baños frios de regadera y ducha, ejercicio, distracciones y el tratamiento moral correspondiente.

Endometritis.

Dr. Lier. México.

Electricidad galvánica; Baños con 5 lbs. de sal y 1 lb. de cloruro de calcio.

Endometritis crónica.

Dr. M. Mucél. México.

Modificaciones locales enérgicas con exclusión del nitrato de plata por los estrechamientos que provoca: Ácido piroleñoso, ácido crómico ó ictiolado de amoniaco principalmente.

Inyecciones diarias: primero ácidas, (tanino ó ácido bórico) y después alcalinas (bórax, subcarbonato de sosa etc.) todas ellas corrigen muy bien los flujos leucorreicos.

EN LAS CURACIONES TÓPICAS

Tapones hechos con algodón hidrófilo ó salicilado, embebido de glicerina y untado cuando es preciso del medicamento (polvos ó líquido) que se juzgue oportuno aplicar.

Cuando hay en él fragmentos, restos de antigua inflamación, como exudados, y adherencias no reabsorbidas, buscar destruirlos además de los medios locales, con los baños generales estimulantes de agua salada ($\frac{1}{2}$ lb. á 1 lb. de sal común para un baño) y también con los baños del Peñón.

Mientras no se modifica favorablemente *toda* la parte de mucosa enferma (sea del cuello ó del cuerpo del útero) la curación no es radical.

Endopericarditis.

Dr. R. Ruiz. Salvatierra, E. de Guanajuato.

Infusión de quina.....	gram.	120. 00
Ioduro de potasio.....	„	1. 00
Tintura de estrofantus.....	„	2. 00
Jarabe de morfina.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Enfermedades oculares de origen estrumoso.

Dr. Manuel Carmona y Valle. México.

Como tratamiento general:

Jarabe de goma.....	gram.	120. 00
Solución de ioduro de fierro de Dupasquier.....	„	4. 00
Protoioduro de arcénico de 0. 01 á... 0. 02		

Cucharadas.

Una cucharada dos veces al día.

Enfisema pulmonar.

Dr. F. Páramo Rangel. México.

Para los accesos de tos:

Agua de laurel cereso.....	gram.	16. 00
Bromuro de amonio.....	„	1. 00
Id. de sodio.....	„	2. 00
Acetato de morfina.....	„	0. 05

Gotas.

Diez gotas tres veces al día.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Como espectorante:

Goma amoniaco.....	gram.	1. 00
Carbonato de amoniaco.....	„	1. 00
Ipecacuana.....	„	0. 20
Acetato de morfina.....	„	0. 10

En 20 píldoras.

De dos á seis píldoras por día.

Enteritis catarral.

Dr. J. López Tello. Amecameca, E. de México.

Subnitrate de bismuto y

Fosfato de cal de c. c.....	gram.	5. 00
Extracto de opio.....	„	0. 05

Para 15 papeles.

Un papel cada hora en una cucharada de cocimiento de lechuga.

Dr. Ernesto Chavez. Córdoba.

ENTERITIS CRÓNICA.

Polvos de Dower.....	gram.	1. 00
----------------------	-------	-------