

Nitrato de plata „ 0. 10

En 20 píldoras.

Otra.

Tanino..... grm. 1. 00

Catecú..... „ 1. 00

Extracto de opio..... „ 0. 05

En 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Otra.

Cocimiento blanco..... grm. 700. 00

Subnitrato de bismuto..... „ 20. 00

Tintura de opio..... „ 4. 00

Ácido láctico..... „ 4. 00

Pozuelos.

Un pozuelo cada dos horas.

Dr. F. Blazquez. Mexico.

En los niños:

Calomel..... grm. 0. 20

Azúcar blanca..... „ 2. 00

En 2 papeles

Un papel cada hora.

Enteritis atónica.

Dr. Jesús Villagrán. México.

Infusión de colombo..... grm. 120. 00

Tintura de nuez vómica..... „ 2. 00

Jarabe de meconio..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharadita cada dos horas.

Enteritis epidémica.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

De carácter miasmático:

Medias cucharaditas de aceite de ricino y uno ó dos centigramos de calomel, tres ó cuatro veces en el día.

Enteritis coleriforme.

En los adultos:

Dr. F. Blazquez. México.

Láudano de Sydenham y

Tintura de nuez vómica; de c. c. grm. 15. 00

Gotas.

Cinco gotas cada hora hasta modificar los síntomas alarmantes.

Enteritis y enterocolitis.

En los niños,

Dr. M. Mucél. México.

Cuando es provocada por vicios en la alimentación se empezará por un purgante de aceite de ricino, con ó sin calomel. Despues calomel en gránulos de un milígramo, uno cada dos horas.

Si predomina la colitis, una lavativa cada cuatro horas, de una cucharada cafetera de la siguiente mezcla:

Cocimiento de raíz de ipeca ó

de corazones de membrillo.. grm. 100. 00

Láudano de Sydenham de 0.05 á „ 0. 10

Extracto de crameria..... „ 0. 25

Clorato de potasa de 0. 50 á „ 1. 00

Lavativa.

Exteriormente la siguiente untura con un redañó.

Aceite de manzanilla grm. 20. 00

Id. de extramonio compuesto „ 20. 00

Pomada de belladona „ 20. 00

Láudano de Rousseau „ 2. 00

Para unar.

En los adultos para dominar el tenismo, usa:

Agua grm. 120. 00

Chal de colmena (1) „ 2. 00

Jarabe de opio „ 40. 00

Cucharadas.

Una cada dos horas.

Enterocolitis.

Dr. R. Martínez Carriedo. México.

ENTEROCOLITIS AGUDA.

Solución de goma grm. 120. 00

Láudano de Sydenham „ 2. 00

Jarabe de éter „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Mr. Marcos Mazarí.—Mineral de Huautla, Morelos.

ENTEROCOLITIS HEMORRÁGICA.

Calomel grm. 0. 20

(1) El Chal de colmena es un producto parecido á la crameria, se extrae del palo de campeche por incisiones en su corteza.

Polvos de ipecacuana „ 0. 20

Extracto de opio „ 0. 10

Polvos de azucar „ 2. 00

En 20 papeles.

Un papel cada media hora vigilando los efectos del calomel.

Una lavativa por la mañana y otra por la noche, cada una de un pozuelo de agua tibia y 8 ó 10 gotas de láudano.

Dr. Ernesto Chavez. Córdoba.

ENTEROCOLITIS EN LOS NIÑOS.

Subnitrato de bismuto grm. 16. 00

Electuario de diascordio „ 4. 00

Polvos de Dower „ 0. 20

En 20 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. A. Díaz. S. Antonio Tejas.

ENTEROCOLITIS DE ORIGEN MELÁNICO.

Extracto tebaico grm. 0. 05

Calomel „ 0. 20

Polvo de ipecacuana „ 0. 10

Sulfato de quinina „ 1. 25

En 5 cápsulas.

Una cápsula cada hora.

Enterocolitis crónica

DE ORIGEN SÉPTICO.

Dr. M. Mucél.

México.

Naftol Beta.....	} de c. c.....	} grm. 0. 12
Calomel.....		
Extracto de opio }		

Para 12 píldoras.

De tres á seis píldoras diarias.

Agua.....	grm. 500. 00
Permanganato de potasa.....	" 2. 50

Lavativas.

Dos lavativas al día cada una de un pozuelo.

Envenenamiento

POR EL OPIO Y LA MORFINA.

Dr. M. Medal.

Tacámbaro. E. de Michoacán.

Infusión de raíz de valeriana (delgada).....	grm. 175. 00
Citrato de cafeína.....	" 0. 20
Quinino.....	" 0. 30
Jarabe simple.....	" 15. 00

Cucharadas.

Dos cucharadas cada 15 minutos.

Epilepsia.

Dr. Manuel F. Ocampo.

Pinos. E. de Zacatecas.

Bromuro de potasio }	} de c. c....	} grm. 10. 00
Id. de sodio..		
Id. de amonio }		

Mézclese.

Para tomar de 1 á 8 gramos de esta mezcla, según las indicaciones, ya sea en agua de azahar endulzada ó en una poca de leche.

Se debe añadir la Picrotoxina en gránulos de medio milígramo, para tomar de uno á cuatro diarios.

Para obtener buenos resultados hay que usarlo algún tiempo.

Dr. M. Mucél.

México.

(1) Extracto acuoso de taray.....	grm. 10. 00
Añil.....	" 2. 50
Extracto de belladona.....	" 0. 10
Picrotoxina.....	" 0. 01
Bromuro de arsénico.....	" 0. 10

Para 100 píldoras.

De una á cinco diarias.

Aumentar lenta y progresivamente hasta tomar cinco diarias.

Epitilismo.

Dr. A. Gaviño Iglesias.

México.

Ácido nítrico monohidratado....	grm. 10. 00
Bicloruro de mercurio pulveri- zado.....	" 4. 00

Papel Berselius c. b. para formar una papilla.

Se aplica con la extremidad de un palito tal como los limpiadientes.

(1) El extracto acuoso de taray lo prepara, usando la cortaza y leño, agotando en agua y al fuego dichas partes y evaporando después en B. de M. hasta la consistencia de extracto blando.

Dr. Guillermo Senisson. México.

(1) Elixir de tumba-vaquero.....	gram.	300.	00
Bromuro de estroncio.....	„	4.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada tres horas.
Para menores de 12 años, cucharadita cafetera.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

Bromuro de sodio.....	gram.	6.	00
Id. de potasio.....	„	2.	00
Id. de amonio.....	„	1.	00
Agua de nafé.....	„	80.	00
Jarabe de morfina.....	„	20.	00

Cucharadas.

Una cucharada el primer día, dos el segundo, tres el tercero y así se va aumentando hasta tomar la dosis en un solo día.

Dr. Demetrio Molinar. Parral.

Extracto de haba de calabar...	gram.	0.	50
Licor de Hoffman.....	„	1.	00
Agua de menta piperita.....	„	20.	00

Gotas.

Cuatro gotas dos veces al día.

Agua destilada.....	gram.	200.	00
Bromuro de potasio.....	„	10.	00

(1) En la Farmacopea el Tumba-vaquero, tiene también el nombre de Tripa de Judas, pero no es esa la yerba á que se refiere el Sr. Senisson. El Tumba-vaquero es una yerba que se cosecha por Toluca en gran abundancia.

Id. de sodio.....	„	10.	00
Id. de amonio.....	„	10.	00

Cucharadas.

Una cucharada tres veces al día

Epilepsia.

Dr. Manuel Carmona y Valle. México.

Para calmar la frecuencia de los ataques.			
Agua destilada.....	gram.	30.	00
Sulfato de atropina.....	„	0.	02

Gotas.

Para tomar diez ó más gotas con los polibromuros dos veces al día.

No debe elevarse la dosis cuando se produzca la sequedad de boca.

Epistaxis.

Dr. M. Mucél. México.

Algodón absorbente embebido en agua de Mentel.
Al interior, agua de limón á pasto y preparados de ergotina de Ivon ó de Bonjéan.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid. México.

Maceración de goma de Sonora			
30×1000.....	gram.	500.	00
Solución hemostática de Mentel	„	500.	00
Antipirina.....	„	4.	00

Geringatorios

y aplicar tapones de algodón empapados en el líquido del geringatorio.

Epitelioma superficial.

Dr. Miguel Cordero México.

Agua alcoholizada..... grm. 200. 00

Finol absoluto „ 2. 00

Pulverizaciones.

Con pulverizador de vapor aplicarlas cada 24 horas por espacio de 15 minutos en el lugar enfermo.

Erisipela.

Dr. M. F. Ocampo. Pinos, E. de Zacatecas.

Sublimado..... grm. 1. 00

Alcohol á 95° „ 200. 00

Agua destilada „ 300. 00

Lociones.

Para ponerlas sobre la placa erisipelatosa.

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad, E. de Michoacán.

Pinceladas cada cuarto de hora con percloruro de fierro de Praváz.

Dr. Jesús Villagrán. México.

Vaselina blanca..... grm. 30. 00

Bicloruro de mercurio..... „ 1. 00

Pomada.

Úntese con un pincel dos ó tres veces al día en el lugar enfermo. Cura rápidamente. Es cáustico.

Dr. M. F. Ocampo. Pinos, E. de Zacatecas.

Glicerina..... grm. 60. 00

Ácido fénico..... „ 2. 00

Toques.

Toques en la placa erisipelatosa.

Otra.

Glicerina..... grm. 60. 00

Sulfoictiolato de amoniaco..... „ 10. 00

Toques.

Cuando la erisipela está en la cara, debe hacerse la antisepsia local usando los buches siguientes.

Cocimiento de coca..... grm. 500. 00

Clorato de potasa..... „ 10. 00

Láudano de Sydenham..... „ 2. 00

Buches.

Dr. E. Lier. México.

Ictiol..... } de c. c..... grm. 25. 00

Lanolina..... }

Pomada.

Otra.

Ictiol..... } de c. c..... grm. 25. 00

Éter sulfúrico... }

Colodión..... „ 30. 00

Uso externo.

Dr. Juan Collantes y Buenrostro. México.

Vaselina neutra..... grm. 30. 00

Biioduro de mercurio..... „ 0. 05

Pomada

Para aplicarla con un pincel dos ó tres veces al día sobre la erisipela.

Dr. Eufemio Gutiérrez. Guadalupe, Zacatecas.

Infusión de té..... grm. 120. 00

Salol.....	de 4. 00 á „	6. 00
Nitrato de sosa.....	„	8. 00
Tintura de cinamomo.....	„	10. 00
Jarabe grosella.....	„	40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Limonada tártrica.....	gram. 200. 00
Vino quina.....	„ 60. 00

Medio pocillo cada hora.

Colodión elástico.....	gram. 100. 00
Tintura de iodo.....	„ 20. 00

Para cubrir las partes afectadas.

Dr. M. Mucél.

México.

Colodión con bicloruro de mercurio al 1%

Otra.

Láudano y vaselina de c. c.....	gram. 20. 00
Bicloruro de mercurio.....	„ 0. 20

Pomada.

En los niños: lociones con éter sulfúrico, con tanico y alcanfor, y al interior antipirina si la temperatura es muy alta, ó bien el ferrocitrato de quinina.

Erispelis.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

Vaselina.....	gram. 15. 00
Percloruro de fierro.....	„ 15. 00

Pomada.

Aplicar la pomada sobre la erisipela cada dos horas, y en las partes sanas y vecinas esencia de trementina rectificada.

Dr. Miguel Cordero.

México.

ERISIPELA QUIRÚRGICA.

Agua esterilizada.....	gram. 200. 00
Percloruro de zinc.....	„ 16. 00

Para curación.

Con un pincel sobre la superficie de las heridas operatorias, después de haber lavado antes con agua hervida.

Dr. D. Molinar.

Hidalgo del Parral.

ERISIPELA DE LA CARA.

Vino de Hidalgo Carpio, una cucharada cada hora.
Colodión elástico con un pincel sobre los lugares afectados.

En la erisipela del cuerpo: el mismo vino y exteriormente percloruro de fierro.

Dr. Salvador F. Alcalá.

Tecolotlán.

Ácido fénico y alcohol de c. c.....	gram. 1. 00
Esencia de trementina.....	„ 2. 00
Tintura de iodo.....	„ 1. 00
Glicerina.....	„ 5. 00

Uso externo.

Aplíquese cada dos horas con un pincel sobre las partes afectadas.

Antipirina.....	gram. 5. 00
Agua de corteza de naranja agria.....	„ 100. 00
Jarabe simple.....	„ 10. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada tres ó cuatro horas.

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes.

ERISIPELA DE LA CARA.

Éter sulfúrico.....	gram.	40. 00
Alcanfor.....	"	8. 00
Acido [tánico.....	"	5. 00

Uso externo.

Ponerlo con un pincel sobre los lugares enfermos dos veces al día.

Dr. Manuel Carmona y Valle. México.

Manteca lavada.....	gram.	30. 00
Bicloruro de mercurio de 0, 30 á ..	"	0. 60

Pomada.

Untar dos ó tres veces al día la placa erisipelatosa, pasando un poco sus límites de manera que el tejido sano que la circunda sea también untado de la pomada.

Picar las vesículas si se forman.

Dr. Lucas Castro. México.

ERISIPELA DE LA CARA.

Ferrocitrato de quinina.....	gram.	1. 00
Extracto tebaico.....	"	0. 02

En 10 pildoras.

Una píldora cada dos horas.

Embrocaciones con percloruro de fierro de Praváz.

Escarlatina.

Dr. Lázaro Ortega. México.

ESCARLATINA CON FARINGITIS MEMBRANOSA.

Agua destilada.....	gram.	150. 00
---------------------	-------	---------

Bromuro de potasio..... " 6. 00

Colutorios é inyecciones

por las fosas nasales.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

ESCARLATINA GRAVE.

Tintura de ailanthus glandulosa 6 gotas.

Agua destilada..... gram 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. D. Molinar. Parral.

Cocimiento de quina..... gram. 120. 00

Carbonato de amoniaco..... " 1. 00

Jarabe de guayacan..... " 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Vaselina..... gram. 30. 00

Clorhidrato de amoniaco..... " 4. 00

Alcanfor..... " 1. 00

Ioduro de potasio..... " 4. 00

Pomada.

La pomada en los ganglios enfartados y baselina en todo el cuerpo.

Dr. Constancio Mota. Puruándiro.

Ácido salicílico..... gram. 1. 00

Agua destilada..... " 70. 00

Jarabe simple..... " 30. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr. E. Gutierrez. Guadalupe, E. de Zacatecas.

Infusión pectoral..	gram. 100.	00
Acetato de amoniaco de 4 á...	„	8. 00
Carbonato de amoniaco de 2 á.	„	4. 00
Nitrato de pilocarpina de 0.01 á	„	0. 05
Jarabe de diacodion y		
Jarabe balsámico de c. c.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Friegas estimulantes.

Poción salicilada.

Infusión de corteza de quina...	gram. 120.	00
Ácido salicílico.....	„	2. 00
Tintura de quina de 10 á.....	„	20. 00
Id. de toliú.....	„	8. 00
Jarabe alcalino.....	„	40. 00

Cucharadas.

Una cada hora.

Escasez de leche en las nodrizas.

Dr. M. F. Ocampo. Pinos, E. de Zacatecas.

Usa con buen éxito el extracto de Capomo á la dosis de gram. 4. 00; pero puede elevarse hasta 6 ú 8. 00 por día.

En su práctica ha observado que no solamente aumenta la cantidad sino que tambien mejora la calidad despues de quince días de usarlo.

Dr. J. M^a Dávila. Mazatlán.

(1) Extracto fluido de Capomo..... gram. 30. 00

Gotas.

20 gotas tres veces al día.

(1) El capomo es un árbol que vejeta en las costas del Pacífico y de cuyo fruto se extrae un extracto fluido, que es el que se usa en Medicina.—N. del A.

Escrofulosis.

Dr. M. Mucél. México.

Iodoformo.....	gram. 1.	00
Extracto de cicuta.....	„	0. 25
Id. de nogal.....	„	3. 00

Para 50 píldoras.

Cinco píldoras al día.

Preparaciones ferruginosas adecuadas.

Dr. Cárlos Amezcua. Tehuacán.

Jarabe de zarzaparrilla.....	gram. 600.	00
Tartrato de potasa y fierro....	„	25. 00
Tintura de zazafrás.....	„	10. 00

Cucharaditas núm. 1.

Jarabe con menta.....	gram. 600.	00
Bicloruro de mercurio.....	„	0. 60
Ioduro de potasio.....	„	20. 00

Cucharaditas núm. 2.

Una cucharadita del núm. 1 al medio día y una del núm. 2 en la noche al acostarse. Se continúa este tratamiento por 20 días. Se suspende por 10 días y se vuelve á empezar. Continuando de la misma manera hasta la curación.

Ejercicio á pie. Baños tibios cada cinco días.

Buena alimentación. Abrigo y evitar enfriamientos.

Dr. Desiderio G. Rosado. Comalcalco. Tabasco.

Bicromato de potasa.....	gram. 0.	10
Percloruro de fierro líquido....	„	14. 00

Tintura de iodo..... 28. 00
Gotas.

De cinco á diez gotas cuatro veces en el día en agua gomosa

Espasmos.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre, Tehuacán.

ESPASMO DE LA GLOTIS EN LOS NIÑOS.

Tintura de castor..... grm. 2. 00
 Id. de almizcle..... „ 2. 00
 Id. de valeriana..... „ 2. 00
 Id. de ipecacuana..... „ 10. 00

Gotas.

Cuatro gotas cada tres horas.

Almizcle..... grm. 0. 05
 Polvo de azúcar..... „ 1. 00

En 5 papeles núm. 1.

Óxido de zinc..... grm. 0. 25
 Polvo de azúcar..... „ 1. 00

En 5 papeles núm. 2.

Un papel cada tres horas alternando el núm. 1 con el núm. 2, de modo que cada hora y media debe tomar papel.

Dr. Miguel Cordero, México.

ESPASMO DOLOROSO DEL RECTO.

Subnitrato de bismuto puro..... grm. 4. 00
 Polvo fino de iodoformo..... „ 0. 15
 Esencia de menta..... 3 gotas.
 Manteca de cacao c. b.

Para 6 supositorios.

Un supositorio cada 12 horas antes de evacuar.

Dr. Emilio Polo.

Puebla

ESPASMO DEL CUELLO DE LA VEJIGA.

Tintura de gelcemiun..... 10 gotas.
 Id. de viburniun prunifolia... 10 gotas.
 Agua destilada..... grm. 120. 00
Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Estomatitis.

Dr. M. Mucel,

México.

Para combatir el dolor, pastillas de cocaina de Hou-dé ó una solución al 4% de clorhidrato de cocaina.

Para la mercurial.

Tintura de iodo..... grm. 5. 00
 Id. de mirto..... „ 10. 00

Toques.

Y como polvo dentrífico:

Carbón de Belloc..... grm. 10. 00
 Polvo de quina..... „ 8. 00
 Clorato de potasa..... „ 2. 00

Dentrífico.

Dr. Lázaro Ortega.

México.

Agua destilada..... grm. 120. 00
 Extracto acuoso de opio..... „ 0. 50
 Múcilago de goma..... „ 2. 00

Colutorios.

ESTOMATITIS MERCURIAL.

Agua rosada..... grm. 250. 00

Tanino.....	„	5. 00
Alumbre.....	„	10. 00

Buches.

Dr. A. Aceves. Guadalajara.

Contra toda clase de dolor bucal.

Maceración en frío de ruibarbo grm. 500. 00

Alcohol á 60°..... „ 30. 00

Éter sulfúrico..... „ 4. 00

Esencia de menta.... 5 gotas.

Buches.

Estrecheses.

Dr. E. Lier. México.

Tratamiento electrolytico.

Eupéptico.

Dr. Francisco Álvarez. México.

Sulfato de estriquina grm. 0. 04

Cuasina..... „ 0. 08

Papaina..... „ 2. 00

Para 20 píldoras.

Una píldora con cada alimento.

Faringitis.

Dr. Pedro Peña. Zamora.

Ioduro de potasio..... grm. 1. 50

Para 3 papeles.

Dosis: uno cada ocho horas en un pozuelo de agua azucarada, tan caliente como se pueda tolerar.

Sus resultados son inmediatos.

Fiebres.

Dr. José B. López.

Campeche.

FIEBRE CATARRAL.

Cocimiento de flores pectorales. grm. 300 00

Acetato de amoniaco líquido... „ 6. 00

Alcoholaduro de acónito..... „ 2. 00

Jarabe c. b.

Cucharadas.

Tres cucharadas cada hora.

Dr. Arcadio F. Ojeda.

Veracruz.

FIEBRE AMARILLA.

Agua..... grm. 1000. 00

Licor de Van Swieter..... „ 20. 00

Bicarbonato de sosa..... „ 10. 00

Cucharadas.

Tres cucharadas cada hora.

Agua..... grm. 150. 00

Antifebrina..... „ 1. 00

Jarabe de codeina..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Reyes G. Flores.

Guadalajara.

FIEBRE TIFOIDEA.

Vino rojo doble..... grm. 500. 00

Jarabe corteza de naranja..... „ 30. 00

Infusión (en frío) de quina..... „ 720. 00

Pozuelos.

Un pozuelo cada hora.